



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

9897 7740 54 2



LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN



LANE

MEDICAL



LIBRARY

Seidel

Collection

HISTORY OF MEDICINE
AND NATURAL SCIENCES

AMERICAN BOOK HOUSE 7-13 17110

H141
c

LANE

MEDICAL



LIBRARY

Seidel

Collection

HISTORY OF MEDICINE
AND NATURAL SCIENCES

AMERICAN BOOK NOTE CO. LITHO

H141
c

Dello stesso Autore:

BOTANIQUE ET PHILOGIE. (*Feuille des jeunes Naturalistes*, XV^e année, n.^o 170 et 171. — Paris, 1885).

ETUDE DE LEXICOLOGIE BOTANIQUE. Additions au Dictionnaire de Littré. (*Revue de la Société française de Botanique*, tome III, n.^o 28 et 29).

STUDIO DI LESSICOGRAFIA BOTANICA sopra alcune note manoscritte del secolo XVI in vernacolo veneto. (*Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, tomo II, serie VI. — Venezia, 1884).

TÉRATOLOGIE DU PALIURUS ACULEATUS LAM. ET DU GLEDITSCHIA TRIACANTHOS L. (*Feuille des j. Nat.* XIV année, n.^o 167).

L' HAPLOPHYLLUM PATAVINUM JUSS. ET SON HABITAT EN ITALIE. « Quelques mots sur la Flore des monts Euganéens. » *Feuille des j. Nat.* XIII^e année, n.^o 153).

ANOMALIE E VARIETÀ NELLA FLORA DEL MODENESE. (*Atti della Società dei Naturalisti di Modena*, Serie III, vol. II).

SULL' ORIGINE DI ALCUNI TERMINI DI BACOLOGIA. (*Bollettino di Bachicoltura*, ann. I, num. 2 e 3. — Padova, 1883).

LA STENOGRAFIA FRANCESE ED IL SISTEMA DI GABELSBERGER. (*Lo Stenografo*, num. 9, 10 e 11. — Padova, 1881).

L' INFLUENZA DELLA DONNA SUL LINGUAGGIO. (*Euganeo*, num. 145. — Padova, 1883).

CHANT DE MAI. « Mailied de Goethe. » (*Revue internationale*. — Florence, mai 1884).

RICERCA GEOMETRICA della lunghezza di un arco di ellisse. (*Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, tomo I, serie VI).

In collaborazione col Prof. O. Penzig:

ILLUSTRAZIONE DEL DUCALE ERBARIO ESTENSE, raccolto nel secolo XVI e conservato nel R. Archivio di Stato in Modena. (*Atti della Società dei Naturalisti di Modena*, Serie III, vol. IV).

ANOMALIES DU RHINANTHUS ALECTOROLOPHUS LOIS. (*Feuille des jeunes Naturalistes*, XVI^e année, n.^o 182. — Paris, 1885).

L'OPERA SALERNITANA
« CIRCA INSTANS »

ED IL TESTO PRIMITIVO DEL

« GRANT HERBIER EN FRANCOYS »

SECONDO DUE CODICI DEL SECOLO XV,
CONSERVATI NELLA REGIA BIBLIOTECA ESTENSE

PER

GIULIO CAMUS

PROFESSORE NELLA R. SCUOLA MILITARE

SOCIO DELLA R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA

MEMBRO ORDINARIO DELLA « SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BOTANIQUE »



IN MODENA
COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1886.

THE LIBRARY

Estratto dal Vol. IV, Serie II,
delle *Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena*,
Sezione di Lettere, pag. 49 e seguenti.

1898

151
C21
1556

L' OPERA SALERNITANA
« CIRCA INSTANS »

ED IL TESTO PRIMITIVO DEL

« GRANT HERBIER EN FRANCOYS »

SECONDO DUE CODICI DEL SECOLO XV,

CONSERVATI NELLA REGIA BIBLIOTECA ESTENSE

Nel 1488 fu stampato a Ferrara, assieme alla " Practica „ di Giov. Serapione, (1) un libro di materia medica, il quale principiava con queste parole: " *Incipit liber de simplicibus medicina secundum Platearium dictus Circa instans* „ e terminava con " *Explicit liber de simplicibus medicinis excellentissimi viri Iohannis Platearii*. „

Il suddetto strano titolo era stato derivato, come in alcuni altri scritti del medio evo, dalle prime parole del prologo: " *Circa instans negocium in simplicibus medicinis nostrum versatur propositum*, „ ecc. (2).

(1) Vedi Choulant, *Handbuch der Bücherkunde der älteren Medicin*, 2.^a ediz. 1841, p. 298, e seg.

(2) Così per esempio si chiamava « Alphita » l'interessantissimo vocabolario salernitano di cui il primo articolo era « *Alphita et farina hordei idem*. » Intorno a tale glossario che avremo spesso da citare in questa memoria, vedi Salvatore De Renzi, *Collectio Salernitana*, vol. III, p. 271.

Questa opera divisa in 276 brevi capitoli, nei quali si tratta quasi esclusivamente dell'uso di piante medicinali, sembra aver goduto un certo successo dopo la sua prima pubblicazione, poichè la vediamo ristamparsi più volte, ora di nuovo colla " *Practica* " di Serapione (*Venezia, 1497, 1499, 1530; Lione, 1525*), ora col " *Dispensarium* " di Nicolai (*Lione 1512, 1536; Parigi 1582*) (1). Ma in conseguenza dei progressi fatti dalla medicina e dalla botanica nella seconda metà del cinquecento, non solo il *Circa instans* non fu più ristampato, ma esso venne anzi dimenticato a tal segno che nelle prime storie importanti della medicina, pubblicate al principio del secolo scorso da Leclerc (2) e da Freind (3), non se ne fece neppure menzione.

Nel 1771, Alberto di Haller citò quel trattato, dicendolo di Giovanni Plateario di S. Paolo, ed aggiungendo che ne esistevano diversi manoscritti (4). Tuttavia Haller non fece gran caso dell'opera, nonchè del suo autore, che egli chiamava " *ignotus homo medicus Salernitanus.* " Bisogna giungere al secolo nostro per vedere il *Circa instans* preso in maggior considerazione da Sprengel, il quale osservò che per la prima volta vi si teneva discorso di certe piante ignote agli antichi, come *Galeopsis Tetrahit, Clematis Flammula, Spiraea Filipendula* (5).

(1) Riguardo a queste varie edizioni dice Ernesto Meyer (*Geschichte der Botanik*, vol. III, p. 510): « Es leidet wohl keinen Zweifel, dass alle diese Ausgaben als Nachdrücke der ersten Ausgabe von Ferrara zu betrachten sind. Die beiden mit einem Sternchen (* *Ferrariis 1488, * Venetiis 1530*) bezeichneten Ausgaben habe ich genau verglichen; sie stimmen völlig überein. » Ora l'edizione « princeps » del *Circa instans* essendo stata irreperibile per me, tutte le mie citazioni di quel libro si riferiscono all'edizione di Venezia, 1530, nella quale detto trattato comprende i fogli 186- 211.

(2) Daniel Le Clerc, *Histoire de la Médecine*, Amsterdam, 1723.

(3) I. Freind, *Historia medicinae*, Venetiis, 1735.

(4) A. di Haller (*Bibliotheca botanica*, vol. I, p. 221) parlando di manoscritti, può aver confuso col *Circa instans* altre opere attribuite ai Plateari, quali le *Glosse* di Matteo, la *Practica* di Giovanni, ecc.

(5) Sprengel, *Historia rei herbariae*, vol. I, p. 276.

Dopo lo Sprengel poco di più forse si sarebbe detto intorno al suddetto trattato, se una celebre scoperta di manoscritti salernitani non fosse venuta a provocare nel mondo scientifico quelle ricerche sulla medicina medievale, che resero celebri i nomi di Henschel, Daremberg, Hæser, De Renzi, Littré, Puccinotti, ecc. Infatti nel 1837, G. T. Henschel, professore all' Università di Breslavia, rinvenne nella biblioteca Maddalena di cotesta città un prezioso codice del secolo XII, che porgeva un compendio della medicina salernitana, costituito di 35 trattati, fra i quali il primo, col titolo *Liber simplicium medicinarum*, fu tosto riconosciuto essere di origine comune col *Circa instans*.

Ma sebbene i prologhi delle due opere cominciassero nell'istesso modo, il confronto dei testi mostrò che dei 276 capitoli dello stampato, quattordici (*De Avena, Assaro, Aaron, Anagalidos, Apio, Cerfolio, Celtica, Cicorea, Emblicis, Eupatoria, Sambuco, Sumac, Sandala, Savina*) non erano compresi nel manoscritto, mentre quest'ultimo ne rinchiudeva almeno 185 di più. D'altra parte vari capitoli colla stessa rubrica nelle due opere, essendo stati trovati differenti, sia per la sostanza, sia per la dizione, Henschel concluse la dissertazione (1) fatta in proposito dicendo: " Noi teniamo il presente Trattato del Codice per un prodotto incognito della letteratura salernitana, e lo consideriamo come il vero ed inalterato *Circa instans*: il quale ci è stato finora incognito, e pensiamo che il libro che porta il titolo di *Circa instans* abbia attinto gran parte dei materiali contenuti nell'edizione del *Circa instans* senza però che sia la stessa cosa, e che è opera di autore più recente. „

(1) Janus, *Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin, herausgegeben von Henschel* (vol. II, p. 65 e seg.)

Questa dissertazione venne tradotta in italiano, e stampata da Salvatore de Renzi nella sua *Collectio Salernitana*, (vol. II, p. 18 e seg.). Ma devo avvertire che la versione contiene alcune inesattezze e qualche errore di stampa, e che quindi cito generalmente il Codice della Maddalena secondo il testo del periodico « Janus » che il chiar.mo prof. E. Junger di Breslavia ebbe la gentilezza di comunicarmi, assieme a varie informazioni sugli scritti di Henschel.

Gli altri storici della Scuola salernitana aggiunsero poco a quello studio di Henschel. È vero che F. Puccinotti (1) avvertì l'esistenza nella biblioteca Barberina in Roma di un trattatello di soli cinque fogli, manoscritto del sec. XIV, chiamato anche *Circa instans*; ma da quel frammento anonimo non emerse alcuna luce per chiarire le questioni che si erano sollevate in seguito alla scoperta del Codice di Breslavia. Quanto al De Renzi, egli si dichiarava convinto che nei vari codici salernitani ove si citano titoli quali *De virtutibus herbarum*, *De virtutibus simplicium*, ecc, si alludesse precisamente al *Circa instans*; (2) e riguardo all'autore dell'opera stampata, egli dimostrò che non poteva essere Giovanni Plateario, medico a Salerno nel secolo XI, come l'avevano creduto taluni sulla fede delle edizioni, ma probabilmente un altro Giovanni posteriore, vissuto circa gli anni 1130-1160 (3).

Prima di lui, Sprengel era stato più vicino al vero, non ammettendo nè Matteo nè Giovanni come autore dello stampato, ma bensì un Plateario pisano del secolo XV, (4) il quale potrebbe essere poi identico a quel Crisostomo Plateario citato da A. di Haller, come autore di un libro sulle virtù delle erbe (5). Però gli storici più moderni non hanno confermato l'esistenza di quel Plateario del quattrocento.

(1) Fr. Puccinotti, *Storia della Medicina*, vol. II, p. 371.

(2) S. De Renzi, *Storia documentata della Scuola medica di Salerno*, p. 308.

(3) Oltre a questo Plateario di dubbia esistenza, che egli chiama Giovanni Plateario III, S. De Renzi ne ammetteva altri quattro, cioè Giovanni I, che avrebbe vissuto intorno al 1050, Giovanni II e Matteo I dal 1070 al 1190, e Matteo II dal 1130 al 1160. (Vedi *Collectio Salernitana*, vol. I, p. 180).

(4) Sprengel, (*op. cit.* vol. I, p. 276): « Io. seu Matth. Platearius senior, a juniori Pisano, saeculi XV scriptore, bene distinguendus. »

(5) A. di Haller, *Bibliotheca botanica* t. II, p. 658:

« Liber Platearii Chrysostomi, opus pro quo fuit intoxicatus ab invidis. Is liber tractat de variis simplicibus praesertim de herbis. In B. Coll. Caj. Gonvil. Cantab. n. 996. »

Verso la metà del secolo nostro, E. Meyer, il dotto storico della Botanica, fece fare un gran passo alla quistione. Avendo scoperto nella R. Biblioteca di Königsberga, un manoscritto dell'opera francese stampata alla fine del sec. XV, col titolo, prima di " *Arbolayre*, „ poi di " *Grant Herbier*, „ egli s'accese che tal trattato porgeva la traduzione di tuttò ciò che era contenuto nel *Circa instans* stampato. Tuttavia non sapeva spiegarsi l'origine di oltre 200 capitoli di questo manoscritto, mancanti al *Circa instans* e non corrispondenti a quelli del Codice di Breslavia, sebbene egli osservasse che i più brevi fra questi capitoli avessero una notevole somiglianza con quelli dell'Erbario attribuito ad Apuleio Platonico. (1) Non sembra essergli venuto in mente che il *Circa instans* potesse essere soltanto un frammento di un'opera latina più estesa, di cui il manoscritto che egli aveva scoperto, dava per intero la traduzione. Eppure bastava per accorgersene leggere in fine dell' " *Arbolayre* „ (2) prima edizione del " *Grant Herbier*: „ *Ce est fin de ce liure ou quel sont contenus les secretes des herbes et communes medicines et drogues a vray translater de latin en francoys et bien corrigees selon plusieurs docteurs de medicine* „ ecc.

Ma un altro merito verso la scienza ebbe il Meyer col rivendicare per il *Circa instans* il posto che gli spetta fra tutti i documenti medievali relativi alla botanica medicinale. Lungi dal considerare questa opera quale " nudo catalogo di medicinali semplici „ come lo fece De Renzi (3), E. Meyer affermò che essa era stata assieme ai libri di Dioscoride e di Plinio, il più importante trattato che avesse avuto l'Occidente nei tempi di mezzo per lo studio dei medicinali vegetali, e che oggi

(1) E Meyer, *op. cit.* vol. IV, p. 188.

(2) Qui mi è grato esprimere la mia riconoscenza all'ill.mo sig. L. Delisle, direttore della Biblioteca nazionale di Parigi, per le informazioni che mi diede intorno a quel rarissimo incunabile.

(3) S. De Renzi, *Storia della Medicina in Italia*, p. 123.

ancora potrebbe rendere buoni servigi a chi volesse rintracciare la storia di certe piante (1). Quindi il dotto storico tedesco deploreava che il *Liber simplicium medicinarum* di Breslavia non fosse stato pubblicato nella "Collectio Salernitana", come la maggior parte degli altri trattati del codice scoperto da Henschel. Ma a questo rimprovero rispose De Renzi dicendo: "Non lo pubblicai, perchè l'ill. Henschel non lo aveva ricopiato; e perchè quando io lo richiesi, il codice era stato ritirato dall'istituto che lo possiede, nè più volevasi concedere per essere portato in casa di quel dotto uomo. D'altronde egli assicurava che, salvo alcune varianti, era uniforme al *Circa instans* stampato" (2).

Le ricerche sul trattato attribuite ad uno dei Platearii erano rimaste a questo punto, allorquando ebbi l'anno scorso la fortuna di incontrare fra i codici della R. Biblioteca Estense di Modena due manoscritti del secolo XV, con piante dipinte, dei quali uno dava il testo primitivo del "Grant Herber", l'altro il testo completo del *Circa instans*.

Per far giudicare bene del valore di tale scoperta, e comprendere i motivi che mi mossero a darne comunicazione a questa Illustre Accademia, fa uopo notare anzi tutto che di simili trattati medievali con miniature di piante, altri non si conoscono fuori del "Liber de simplicibus Benedicti Rini", composto nel 1415, ora conservato nella Marciana di Venezia, e del famoso "Dioscoride" di Vienna, manoscritto eseguito nell'anno 505 per l'imperatrice Iulia Anicia. Inoltre avvertiamo che il codice francese dell'Estense è tanto più importante che per ora è copia unica, poichè l'altra, scoperta dal Meyer, è scomparsa

(1) E. Meyer, *op. cit.* vol. III, p. 509:

« Kommt es darauf an die Kunde von einer Pflanze aus früherer in spätere Zeit zu verfolgen, so leistet das *Circa instans* oft gute Dienste. » E più innanzi: « Es ist bis auf seine Zeit nächst Plinius und Dioscorides die reichste und botanisch wichtigste Heilmittellehre des Abendlandes. »

(2) S. De Renzi, *Storia documentata della Scuola medica di Salerno*, p. 307.

dalla R. Biblioteca di Königsberga, sin dall'anno 1858, senza lasciare traccia di sè (1).

Nel catalogo dei codici della R. Biblioteca Estense, redatto alla fine dell'ultimo secolo, il nostro manoscritto latino vien indicato sotto il num. 993 (XII. K. 19) colla rubrica "*Dioscorides Tractatus de herbis, cum Platonis, Galieni et Macri hujusmodi a Barth.: Mundsens. Cod. membr. cum figuris coloribus depictis in fol.º saeculi XV; „* ed il manoscritto francese è menzionato sotto il num. 28 (XII. K. 16), con

" *De Urfé. Dictionarium Gallicum herbarium cum herbis elegantissime expressis, litterisque versicoloribus, auroque ut plurimum intextis. In quo herbarum virtutes, atque ut in extremo opere dicitur Secreta Salernitana continentur. Codex membr. in fol.º saec. XIV „* (2). ✓

Come si vedrà più innanzi, le suddette indicazioni racchiudono alcune inesattezze, che forse costituiscono una delle cause per le quali i due codici hanno potuto sfuggire alle pazienti e minute indagini fatte dal De Renzi, dal Puccinotti e da altri nelle biblioteche d'Italia.

Il codice latino comprende 167 fogli, ed è scritto su due colonne, in caratteri gotici, con numerosi segni d'abbreviazione. Sul primo foglio, senza titolo alcuno, comincia il prologo: "*Circa instans negocium in simplicibus medicinis nostrum versatur propositum. Simplex autem medicina est que talis et qualis est a natura producta. ecc. „* Vengono poi 480 capitoli ripartiti secondo la lettera iniziale in gruppi che si seguono in ordine alfabetico, senza però che tal ordine sia conservato per i singoli capitoli. Salvo poche eccezioni, ogni gruppo è preceduto

(1) Ricevetti questa notizia dall'egregio sig. Dott. R. Caspary, professore di Botanica all'Università di Königsberga, il quale ebbe inoltre la cortesia di trasmettermi una nota scritta in proposito dall'attuale Direttore della suddetta biblioteca.

(2) In un altro catalogo della stessa Biblioteca (*Conspectus codicum Linguarum exterarum*) composto nel 1833, fu aggiunto con ragione « vel XV. »

da un indice, e ciascun capitolo è accompagnato di una miniatura. Al foglio 142 leggesi: " *Explicit tractatus herbarum Dioscorides et Platonis atque Galieno et Macrone translata manu et intellectu Bartholomei minid' senis in arte speciarie semper infusus.* "

*Explicit cest herbollaire
 Auquel a heu asses affaire
 Abourg. (1) Il a este escript
 Mil CCCC cinquante et huit
 Et la escript cest tout certain
 Le patron de sa propre main
 Pries pour luy Je vous en pryé
 Pour amour De la compaignye.
 Le petit pelous
 1458*

Sotto, nel margine del medesimo foglio, è scritto in corsivo: " *Numerus herbarum designatarum In presenti libro est C.iiii. lxx per verum Computum.* "

Dopo havvi una lunga Sinonimia di termini greci, latini e soprattutto arabi, che finisce con " *Hoc scripsi totum pro pena date michi potum. Nomen scriptoris Le petit pelous plenus amoris 1458* "

Il codice francese è scritto ugualmente in caratteri gotici, ma un poco diversi da quelli del ms. latino. Anche qui manca il titolo: soltanto sul primo riguardo, leggesi in carattere corsivo del sec. XVI " *Liure des simples A Mons.^r Durfe,* " cioè una nota scritta evidentemente da uno dei possessori del libro.

Il prologo comincia con " *En ceste presente besoingne cest nostre propos et entencion de traitier des simples medicines. ecc.* " Poi i capitoli, gli indici e le miniature sono, con poche differenze,

(1) Questo nome che si riferisce probabilmente ad un miniatore, venne scritto *Abourt*, nei cataloghi dell' Estense, dietro ad una falsa lettura.

ripartiti come nell' originale latino. Le ultime parole sono " *Et pour couter prolixite cy est la fin de ce liure ou quel sont contenus les secres de Salerne. Explicit.* „. Sotto, nel margine, trovasi scritto da mano meno antica, un altro nome di possessore " *Jehan Duboys.* „ Sfortunatamente questo codice manca di una diecina di fogli, i quali furono strappati isolatamente in diversi luoghi, prima della legatura.

Dal confronto del nostro ms. latino col *Circa instans* stampato, apparisce evidente che quest' ultimo venne composto estraendo dal *Tractatus herbarum* i soli primi articoli in ogni gruppo; furono così tralasciati oltre a 180 capitoli, e spesso il testo degli altri fu ridotto in modo da non porgere che circa il quinto del trattato originale. Però, nel fare questo estratto, lo stampatore ebbe certamente sott' occhio un manoscritto diverso della copia posseduta dall' Estense, e lo prova anzitutto l' aggiunta nel *Circa instans* di alcuni brevi capitoli, *Abrotanum*, *Anagalidos*, *Arnoglossa*, *Aaron*, *Celtica*, *Malabratum*, *Nitrum*, *Siseleos* e *Stafisagria*, dei quali i cinque primi si ritrovano sotto un' altra rubrica sinonima nel Trattato di Bartolomeo, mentre gli altri sono menzionati soltanto negli indici, ora nell' uno, ora nell' altro dei nostri due codici. Inoltre si può dimostrare la pluralità di copie dell' opera originale, col rilevare alcune varianti nella dizione o nella sostanza, che passano fra lo stampato, il ms. latino e la sua traduzione. Così al cap. " *Ambra* „ dopo un rimedio *contra suffocationem matricis* abbiamo nel " *Circa instans*: „ *solummodo licinio tali madefacto in oleo et extincto et naribus appposito mater Joannis Platearij liberavit quendam nobilem*, „ ma nel codice dell' Estense " *solum modo licinio tali oleo intincto accensum et extinctum et naribus appositum m. purgavit et liberavit quendam nobilem*, „ e nel ms. francese " *le maistre dit que par la fumees de ce limegnon devant dit il garist une noble dame du cas.* „

Al cap. " *Strucium* „ dopo una ricetta contro la dissuria, vien detto nello stampato " *hoc rimedio Platearius fuit liberatus*, „ mentre nel manoscritto trovasi soltanto " *ut aruculus inducet* „ e nella traduzione " *en ceste maniere fut gary le maistre qui fist ce liure* „.

Di più i capitoli " Ameos „ e " Serpillum „ del *Circa instans* differiscono del tutto da quelli che portano lo stesso titolo nei nostri codici, ed in questi ultimi non si rinviene nè il nome di *Virgilio* (cap. Serpillum), nè quello di *Macrobio* (1) (cap. Absinthium), nè la citazione di *Compendium salernitanum* (cap. Acetum), titolo di un' opera che Henschel riteneva essere precisamente l'insieme dei 35 trattati del codice di Breslavia (2).

Se ora, prendendo per base l'analisi fatta da Henschel sul " *Liber simplicium medicinarum* „, paragoniamo al vecchio scritto salernitano il nostro *Tractatus herbarum*, riconosciamo in quest'ultimo una compilazione, ove si ritrovano, dell'opera attribuita a Plateario, quasi tutti i capitoli che trattano di piante, mentre manca la maggior parte degli altri che sono suppliti invece da numerosi rimedi vegetali tolti da altre opere. Cosicchè si vede che Bartolomeo, pur ammettendo ancora alcuni rimedi di origine minerale od animale, tendeva già a comporre un vero Erbario, nel senso che ebbe allora la parola, cioè un puro trattato di erbe medicinali, come per esempio il *Tractatus de Herbis* che forma la prima parte dell'*Ortus sanitatis*, opera stampata nel 1491, la quale ha molta analogia col trattato dell'Estense.

Quindi non fa meraviglia il vedere il nostro autore eliminare tali capitoli contenuti nel codice di Breslavia: *Aqua vitis*, *Amurca*, *Axungia*, *Caballi marini*, *Cameleon*, *Cantarides*, *Cerebellum leporis*, *Caseus viridis*, *Coagula*, *Cristallus*, *Condisi*, *Cimices*, *Coclee terrene*, *Caro leonis*, *Caro bovina*, *cervina*, *Cerebrum*, *Cor*, *Cancro*, *Fermentum*, *Guttur*, *Gallina*, *Gallus*, *Gallus castratus*, *Hircus*, *Limatura eboris*, *Lingua*, *Lac*, *Musceteleum*, *Medulla spondili*, *Nares*, *Nix*, *Oleum*, *Obsoniogarum*, *Oculi*, *Ova*, *Panis*, *Pulmo pulli columbini*, *Pisces*, *Ptisana*, *Renes*, *Romei*, *Splen*,

(1) Il ms. lat. dell'Estense invece ha *Macro*, e quello di Breslavia *Mac'*, abbreviazione di *Macro* (*Macer*), come lo provò De Renzi nella sua storia *Storia documentata*, p. 281.

(2) Janus, *loc. cit.* p. 74 — *Collectio Salernitana*, vol. II, p. 24.

Sericum, Volatilia, Uzif, Venter mergule, Vinum, ed altri consimili (1).

Malgrado questa trasformazione, il libro di Bartolomeo rimase fedele nel fondo ai principii della Scuola salernitana dei secoli XI e XII, e se si fa eccezione per due citazioni isolate di Rhazi e di Avicenna al cap. "Cepa, „ si può dire che l'arabismo vi si manifesta soltanto con estratti dell'opera di Isaac, già fatta conoscere ai medici di Salerno da Costantino. Quasi si crederebbe che il compilatore non avesse ancora conosciuto le traduzioni di Albucasi, di Serapione, ecc. colle quali Gerardo da Cremona esercitò una sì notevole influenza sull'indirizzo della medicina nel medio evo. Eppure il nostro Bartolomeo è certamente posteriore al suddetto traduttore, poichè egli cita Pietro Spano, (2) autore del "Libro degli occhi, „ morto nel 1277, e ricordato da Dante nel Paradiso (XII, 134).

L'ordinamento delle materie nel *Tractatus herbarum* è presso a poco quello che vien seguito nelle opere coetanee del medesimo genere. Ogni capitolo principia col nome del medicamento accompagnato dall'indicazione di uno dei quattro gradi: freddo, caldo, secco, umido. Spesso quando si tratta di una droga vegetale, vengono ad aggiungersi descrizioni di piante, e vari sinonimi coi nomi dei popoli presso ai quali essi erano in uso, quali *Greci, Latini, Lucani, Romani, Itali, Ytaliani, Tusci, Siculi, Siciliani, Affricani, Sarraceni, Punici, Egipcii, Corinti, Dacii, Ostani, Gallii, Spanii, Profeti, Domiani*. Dopo

(1) L'importanza data a queste materie dall'autore del *Liber simplicium medicinarum* vien dimostrata dall'estensione del testo consacrato a certi capitoli; per esempio il cap. « Lac » ha quattro colonne, il cap. « Vinum » ne ha otto! ecc. (Vedi *Janus*, loc. cit. p. 67).

(2) Al cap. « Eufrasia »: « *Incipit secreta magistri Petri hispani De egritudinibus oculorum, et inter alias egritudines inquit Petrus hispanus...* ». Con questo passo impariamo il titolo di un'opera latina perduta, della quale rimane soltanto il volgarizzamento che fu pubblicato con una dotta prefazione dal comm. Fr. Zambrini nella « *Scelta di curiosità letterarie*, » disp. 130.

sono enumerate le proprietà del medicamento, per lo più con citazioni di autori in appoggio, fra i quali i più frequentemente citati sono *Dioscoride*, *Galeno*, *Isaac*, *Macro*, *Costantino*, *Matteo Plateario*, le mediche salernitane (*mulieres salernitanae*). Più di rado s'incontrano i nomi di *Plinio*, *Ipocrate*, *Appollonio*, *Platone*, *Aristotele*, *Asclepio*, *Pitagora*, *Olimpia Tebana*, ecc. Rarissimo poi è di vedere l'autore esprimersi, come al cap. " *Diagridium* ", per " *hoc autem dico* ". Al cap. " *Esula* " vien raccomandata la polvere di quel medico Petricello, intorno al quale si è tanto discusso (1); ed è da supporre che Bartolomeo alluda all' *Antidotario* di Nicolò, dicendo " *ut dictum est in antidotario* " (cap. *Herba S. Marie*), ed al *Passionario* di Garioponto con " *ut in passionario invenitur* " (cap. *Radix*). Inoltre il nostro codice contiene alcuni versi del famoso poema salernitano " *Flos Medicinae*; " così:

- « *Camphora per nares castrat odore nares* » (cap. *Camphora*).
- « *Enula campana reddit precordia sana* » (cap. *Enula*).
- « *Ysopus est herba purgans de pectore fleuma* »
- « *Ad pulmonis opus prestat medicamen Ysopus* » (cap. *Ysopus*) (2).

Naturalmente le ricette del trattato di Bartolomeo sono senza valore per la medicina moderna, essendone la maggior parte delle droghe cadute in disuso da molto tempo. Nondimeno è interessante rilevare nel vecchio libro alcuni rimedi preconizzati ai nostri giorni come nuovi: per esempio, contro l'idrofobia l'aglio; contro la febbre, la tela di ragno, proposta ultimamente in sostituzione della china.

(1) Vedi F. Puccinotti, *op. cit.* vol. II, p. 361.

(2) Nell' « *Alphita* » il primo di questi versi suona invece:

« *Issopus est herba tumidis pulmonibus apta* »

e per il secondo abbiamo nel « *Regimen Sanitatis* » di Villanova (ediz. di 1491):

« *Ad pulmonis opus cum melle coquatur hyssopus* »

Ma la vera importanza dell' opera sta nella parte botanica. Infatti vi si discorre di circa 500 piante, fra le quali troviamo molte specie che sono per la prima volta chiaramente descritte, ed anzi alcune, come *Aloe vulgaris*, *Oxalis corniculata*, *Xanthium strumarium*, ecc., le quali furono ritenute da botanici moderni come oriunde dall' America. D' altronde l' autore offre una nomenclatura binaria talmente ricca che si potrebbe considerarlo come l' inventore di tal sistema di denominazione, se non fosse stato dimostrato da un valente erudito (1) che questa invenzione non appartiene esclusivamente a nessuno, e che vari esempi di simile nomenclatura si rilevano già negli autori greci e latini. Ad ogni modo mi pare fuor di dubbio che il nostro codice sia il primo ove si possa notare un uso così frequente di denominazioni binarie per distinguere le specie. I principali aggettivi adoperati a tal scopo nel Trattato di Bartolomeo sono: *maior*, *minor*, *medius*, *communis*, *masculus*, *femininus*, *silvestris*, *domesticus*, *hortensis*, *hortulanus*, *rusticus*, *agrestis*, *campana*, *aquaticus*, *marinus*, *montanus*, *hiemalis*, *aestivus*, *mortalis*, *inversus*, *vomica*, *benedictus*, *regia*, *foetidus*, *muscat*, *dulcis*, *amarus*, *gariofilatus*, *sagitalis*, *acutus*, *rotundus*, *longus*, *grassa*, *albus*, *niger*, *rubeus*, *citrinus*, *purpureus*, *croceus*, *glaucus*, *caninus*, *asininus*, *porcinus*, *cervinus*, *raninus*, *creticus*, *orientalis*, *indicus*, *illiricus*, *alexandrinus*, *arabicus*, *sarracenicus*, *graecus*, *ponticus*, ecc.; e se ne potrebbero aggiunger parecchi altri interessanti, rilevando nella "Sinonimia", che sta in fine del codice, numerose denominazioni quali: *Caulus imperialis*, *Calamentum fluviale*, *Urtica mortua*, *Crocus affricanus*, *Cassia siringa*, *Raphanus gallicus*, *Triticum romanum*, *Edera arborea*, *Edera terrestris*, *Avena sterilis*, *Cinamomy subtilis*, *Cicer erraticus*, *Taxus barbatus*, *Faba lupina*, *Faba egipciana*, *Lappa caprina*, *Mala siriaca*, *Lilium celeste*, *Nux Pharaonis*, *Nux miristica*, *Solatrium medianum*, So-

(1) Vedi l' interessante memoria del Dott. Saint-Lager, *Quel est l' inventeur de la Nomenclature binaire*. — Paris, 1883.

latrum mortiferum, Uva luppina, Basilicum minutum, Cardus bene olens, Cardus coagulatus, Juncus triangularis, Viscus quercinus, ecc.

Il *Petit Pelous* che, nel 1458, trascrisse il nostro *Circa instans*, altro probabilmente non era che uno di quei tanti forestieri, che allora venivano a studiare medicina nelle Università italiane. Questa mia ipotesi non deve recar meraviglia, poichè come dice il Puccinotti (1) « in que' secoli di tali copiatori di codici e inghilesi e franchi e germani molti ve n' erano in Italia, alcuni de' quali trovansi segnati in fondo ai codici medesimi, altri restarono anonimi, altri si rassegnavano per scolari, e compivano i loro studj universitarj mentre che scrivevano Codici sotto la direzione de' loro maestri ».

Ma chi era colui che vien nominato in fondo del nostro codice quale autore del *Circa instans*? Era contemporaneo del copista? Sono quesiti ai quali non saprei rispondere con precisione per ora, non avendo potuto riscontrare alcun documento in proposito. Però nulla impedisce di credere che egli abbia vissuto nel trecento, giacchè l'autore più moderno citato nell'opera attribuita a Bartolomeo è quel Pietro Spano morto nella seconda metà del tredicesimo secolo.

Stando alla lettura *mundsens* data per quella del suo cognome nei cataloghi dell'Estense, si sarebbe potuto pensare che anche lui fosse forestiere; ma così non è. La suddetta lettura è erronea, come lo è pure, almeno in parte, quella di *Mund' senis*, riferita dall'autore anonimo di un opuscolo sulla medesima Biblioteca (2). Infatti il nostro manoscritto porge,

(1) *Op. cit.* vol. II, parte I, documenti, p. LXXXIV. — Il Puccinotti osserva che la Biblioteca comunale di Siena conserva tuttora oltre a vari codici del secolo XV scritti per *Conradum de Alemania*, una copia del *Nicolai florentini Sermo quartus de membris spiritualibus* terminata da « *Scripti ego Joannes de Guerrandia in Britania* »; come anche un *Jacobi Foroliviensis Expositio in Hipp.* colla menzione finale « *Scripti ego Daniel De insulis (Delisle?) natione Picardus medicine auditor*; ecc.

(2) *Cenni storici della R. Biblioteca Estense*, p. 51. Modena, 1873.

dopo il nome *Bartolomei*, e prima del *d* apostrofato, sette asti consimili, sormontati da due accenti, i quali servono evidentemente quì, come spessissimo nel codice, a distinguere la vocale *i* in mezzo alle lettere *m*, *n*, *u*. Quindi leggo *Mini de senis*, e suppongo che si tratti di un *Bartolomeo Mino da Siena*, forse parente di quel poeta del secolo XIV, *Andrea Mino da Siena*, della celebre famiglia *de' Piccolomini* e soprannominato il *Cis-cranna* (1).

In mancanza di altre copie del *Circa instans*, posteriori al *Liber simplicium* di Breslavia, è assai difficile determinare la parte che spetta a questo Bartolomeo Mino nella compilazione del testo conservato all'Estense, ma non sarei lungi dal credere che con alcune aggiunte, tolte forse in gran parte dalle *Pandectae medicinae* di Matteo Silvatico, il nostro Senese abbia semplicemente riprodotto un antico testo del *Circa instans* scritto certamente da un autore la cui patria era una delle contrade meridionali dell'Italia. Anzitutto è da notare che nell'indicare l'abitazione di piante europee, si nominano nel testo quasi esclusivamente la Puglia, la Sicilia, la Lucania. D'altra parte, in mezzo ad un latino barbaro, affatto somigliante a quei degli scritti salernitani pubblicati da De Renzi, Puccinotti, ed altri, troviamo alcune parole che accennano chiaramente ad un dialetto italiano influito da elementi arabi e greci. Così trovando al capitolo "Gumma Elemmi „: *Sarraceni vocant elemmi, nos autem vocamus lome*, vediamo nel nome di questa droga, una corruzione dell'arabo *el-luban* (resina) dovuta alla nota pronunzia greca per l'articolazione *b* delle altre lingue (2). Ma caratteristico soprattutto è il sinonimo di *aloe* che dà l'autore dicendo " *Nos autem vocamus eam cimbar* „, passo che non si

(1) Vedi F. S. Quadrio, *Della Storia d'ogni poesia*, vol. II, p. 188. Milano, 1741.

(2) Altri invece riguardano la voce *elemi* come proveniente da *ἐλαιον*, per mezzo dell'*Enhoemon* di Plinio (Vedi Fluckiger et Hanbury, *Histoire des drogues d'origine végétale*, vol. I, p. 279 — Trad. par J. L. De Lanessan. — Paris, 1878).

ritrova nè nel codice di Breslavia, nè nel *Circa instans* stampato, nè nell' *Ortus sanitatis*, ove però viene citata la prima parte del cap. *Aloe*, secondo Plateario. Di fatti questa voce *cimbar*, corruzione dell' arabo *sabar* (aloe), è rimasta nei vernacoli della Calabria e della Sicilia sotto forme poco differenti (*zambaron*, *zabbara*) per designare l' *Agave americana* (1).

Inoltre sospetterei che l' autore, copiato dal nostro Bartolomeo, intenda parlare dei suoi connazionali colla frequente menzione dei *Domiani*, *Domani* (forse derivati da *domus*, casa, patria), in mezzo a nomi di popoli; così al cap. " *Altea* „: *Domiani vocant eam moloche agrie* (2); al cap. " *Artemisia* „: *Domani vocant grisantemis* (3); ecc.

Se ora consideriamo le 470 miniature contenute nel codice latino, vediamo che esse differiscono assai fra loro sotto il rapporto artistico. Quelle che rappresentano soltanto piante sembrano dovute per la maggior parte alla mano di un miniatore principiante, il quale ci offre spesso disegni di mera fantasia. Le altre invece, una cinquantina circa, dimostrano il pennello di un artista molto più esperto, al quale sono da attribuirsi alcuni fiori e frutti ritratti abbastanza bene dal vero, quali: la viola, la pervinca, la borragine, la cicoria selvatica, il croco, il fiordaliso, il gittone, le fragole, i fichi, il riso, ecc; come anche un elegante vaso per coltivare la maiorana; un cofano con serratura ed ornamenti di ferro per conservare il mastice; varie ricche scatole contenenti pietre, gomme, ecc. Il medesimo miniatore dipinge ugualmente animali; così: un cervo (*cap. Os de corde*), un elefante (*cap. Spodium*), una rana (*Lenticule aquaticae*), il ramarro (*Serpentaria*), due salamandre (*Stinci*),

(1) Vedi J. Danielli, *Studi sull' Agave americana L.* — Nuovo Giorn. bot. ital. XVII, 2, p. 72.

(2) Nel Teofraste *Μαλάχη ἀγρία*.

(3) Corruzione del greco *Χρυσάνθεμον*, adoperato da Dioscoride per l' *Helichrysum Stoechas*.

un serpente (*Camomilla, Gentiana, ecc.*), uno scarabeo (*Plantago*), ragni e mosche (*Tela aranea*), due graziosi cardellini sul tetto di una casa (*Contiledon*), ecc. Ma i suoi capolavori sono parecchi quadretti interessantissimi nei quali fa entrare personaggi; per esempio: un venditore di noci di cocco con una bilancia; — un chierico col turibolo che compra l'incenso; — un uomo che raccoglie pagliuzze d'oro; — un altro che estrae lo zolfo da un terreno vulcanico in eruzione; — una monaca rubiconda che colla padella fa friggere delle paste (*zibulle*); un povero castoreo raggiunto dai cacciatori il quale fa coi denti il sacrificio del prezioso *Castoreum* (1); dei barbari dal viso nero, con cani, davanti ai quali fugge il capriuolo che dà il muschio; uno spaventevole diavolo cornuto che minaccia colle unghie una lepre nascosta dietro a sparagi selvatici (*Palacium leporis*); ecc.

Nel codice francese le miniature presentano meno varietà di composizione, ma questo difetto vien compensato da una maggior finezza d'esecuzione e da un colorito più vivo. Soltanto dobbiamo dire che l'artista in questo codice non è sempre fedele al testo, e che anzi gli accade talvolta, come ai capitoli "*Indacus*", "*Incensaria*", di rappresentare delle piante affatto diverse da quelle che vengono descritte dall'autore.

Riguardo alla traduzione francese, sebbene essa riproduca tutto il contenuto del *Tractatus herbarum*, ad eccezione dei capitoli *De braxillo*, *Pes leporinus*, *Spongia*, *Terre stelle*, *Tri*, (2) e di pochi passi in altri, nondimeno è facile ad accorgersi che non fu eseguita sulla copia latina posseduta dall'Estense, giacchè vi troviamo diversi capitoli (*Fuligo*, *Lacca*, *Siseleos*, *Stafisagria*, *Lepidos calcis*, *Sistra*, *Saliunca*, *Trifolium*) i quali furono omessi

(1) Vedi in proposito L. F. Valdrighi, *Il Cynegeticon di Nemesiano*, p. 51 — Modena, 1876.

(2) Però troviamo negli indici di detto codice: « *De bresil*, » « *De pié de lievre*, » « *De sponges*, » « *De terre estoille*, ».

nel testo di Bartolomeo, benchè menzionati all'indice. Abbiamo quindi un'altra prova della pluralità di copie dell'opera originale; ed in tal modo si spiega come il manoscritto francese dà, per intero, certi capitoli di cui il copista del codice latino riportò soltanto la prima parte, fermandosi poi con un *eccetera*. Forse anche per la medesima ragione, mentre Plateario non è nemmeno nominato al cap. *Appium risus* del trattato latino, abbiamo nel testo francese: (cap. *Apium, Ache*) "*Et si trouve en aucuns livres que qui la prent dedans elle tue l'omme. Et je Plentaire ay veu par experience que a aucuns qui la prenoient elle faisoit grant lesion. Et pour ce je approuve plus que l'on la preigne par dehors en guise d'emplaistre que par dedans* „.

Tuttavia è probabile che il nostro traduttore, il quale ha una certa tendenza alla prolissità (1), ed aggiunge talvolta delle osservazioni sue, abbia voluto fare, anche lui, di tempo in tempo la parte di compilatore. Così riterrei come aggiunte sue proprie la citazione fatta al capitolo "*Soldanea* „ di "*un nouvel acteur appelé Gentil* „ (probabilmente Gentile da Fuligno), e quell'altra al cap. "*Spinaca* „ di "*un auteur appelé Tacuin* „, ove prese per nome di autore il titolo di un libro, il *Tacuinus sanitutis*, versione dell'opera araba *Taqwīm azzzihhadt*, attribuita a Elluchasem Elimithar (2).

(1) Per esempio avendo da tradurre al cap. « *Titimallus* » « *Panis ex eo et farina et aqua confectus optime purgat* », egli scrive: « *L'acteur qui fist ce livre en mist ou pain quant l'en le pestroit, en la quantité dessus dicte, et corrigé comme dit est, et ce pain decevoit moult de gens, car il les lachoit et purgeoit tres bien sans qu'ils s'en donnassent garde* ».

(2) Però oltre a questa opera, riprodotta per la stampa nel cinquecento (*Argentorati, 1531*), ve n'è un'altra del medesimo genere, col titolo « *Tacuinus de curis morborum corporum* », attribuita a Abu Ali Jahia Ben Gezlāh, la quale non vedo citata da alcuno storico della medicina, se non da J. Freind (*Hist. de la Méd.*, p. 221) che la credeva composta da un medico ebreo sull'ordine di Carlomagno. — Ho trovato alla R. Biblioteca Estense questi due *Tacuin*i riuniti in un medesimo codice (num. 175 — V, C, 22), scritto nell'anno 1290, in parte a Aversa, in parte a Roma.

Quanto ai capitoli *Crisomiles*, *Culcasia*, *Robellie*, *Grain froissié*, *Saponaria*, *Senechon*, *Herbe d'ancens*, i quali mancano totalmente al codice latino dell'Estense, i tre primi potevano benissimo trovarsi nella copia originale che servì per la compilazione del trattato di Bartolomeo, poichè essi sono compresi nel manoscritto di Breslavia; ma è difficile a pronunziarsi sull'origine dei quattro rimanenti.

Come la scrittura del copista, così la lingua del traduttore presenta i caratteri incontestabili del secolo XV. Vi si manifesta, è vero, la vicinanza del cinquecento colla formazione di alcune voci quali *aquosité*, *aromaticité*, *experimentateur* (1) ecc., ma la maggior parte del testo appartiene al vocabolario arcaico. Una estesa analisi filologica essendo qui fuor di luogo, mi limiterò a citare in appoggio della mia asserzione: *Adelier*, assottigliare, *affaitier*, preparare, *aguier*, dar del piccante, *attenurir*, rendere tenero, *entomir*, sopire, *flamer*, salassare, *gringner*, scrosciare, *jarser*, applicare le ventose, *puir*, puzzare, *raier*, radiare, *resconser*, scomparire, *suevir*, seguire, *brui*, bruciato, *feru*, battuto, *marré*, manipolato, *onni*, liscio, *plaié*, ferito, *greigneur* più grande, *laie*, *lé*, larga, *ausseuse*, aquosa, *boe*, muco, *bouel*, budello, *brahaigneté*, sterilità, *bran*, *bren*, crusca, *caverolles*, vesichette, *casse fistre*, cassia fistula, *cheue*, cicuta, *desverie*, *forsenerie*, mania, pazzia, *eprainson* tenesmo, *es*, api, *esdre*, edera, *griesve*, oppressione, *glieuseté*, viscosità, *haterel*, nuca, *leu*, lupo, *maalle*, peso

(1) Per varie parole di questo genere rimaste nella lingua moderna, Littré non porge esempi così antichi; anzi alcune sono date da lui come neologismi, e fra queste ultime è il vocabolo *experimentateur* di cui riporterò a titolo di curiosità un esempio tolto dal nostro manoscritto:

Cap. « Coronaria » (*Contre obtalmie, c'est l'apostume de l'eul*): « Ce prouva ung *experimentateur* ainsi. Il print ung coq et ung petit chien et poigny leurs yeulx d'ung greffe ou une aiguille en telle maniere qu'il sembloit qu'ils eussent les yeulx crevés, et puis il print ceste herbe et la broya, et mist sus ces yeulx, et la lya sus a une bande et luy laissa par ung jour entier. Et au second jour, il osta la bende et descouvrit les yeulx et il les trouva tres beaux et nets comme devant, de la quell chose il fut moult esmerveillé et depuis le prouva il en plusieurs ».

piccolo, *mangeue*, prurito, *piz*, petto, *meseaux*, leprosi, *poulz*, polenta, *saiete*, freccia, *sieu*, sego, *tieule*, tegola, *troquelet*, ammasso, *vesime* (1), vento, ecc. E da notare che il nostro traduttore scrive senza aferesi *amourouque*, *emigraine*, parole divenute nel francese moderno *la maroute*, cotula fetida, *la migraine*, emicrania; e senza agglutinazione dell'articolo *la uveite*, ugola, oggidì *la lulette*. Inoltre egli ci offre esempi dell'antica formazione di parole composte, secondo la costruzione latina, in *chevaunqueue*, coda di cavallo, e *cerlangue*, lingua cervina, nomi di piante. In fine fra altre denominazioni interessanti adoperate da lui, rileviamo: *haye du dos*, spina dorsale; *chievre masle*, becco; *moeteur de l'aage*, tenerezza di età; *ré de miel*, favo; *aubin d'euf*, albume; *moyaux d'eufs*, torli; *membres ors*, traduzione di *pu-denda*; *lit a l'enfant*, *siege a l'enfant*, secondina, ecc.

Una particolarità della notazione ortografica in questo codice, consiste nell'aver generalmente *len* (*l'en*), invece di *lon* (*l'on*), e *ou* invece di *au* (al), il che indicherebbe un dialetto del centro della Francia (2), se si potesse ancora parlare di dialetto speciale per un testo come il nostro, ove la fusione dei vari vernacoli si manifesta ad ogni momento con forme grafiche quali: *esrai-chier*, svellere, *taiche*, macchia, *trieffle*, trifoglio, *mesleure*, mescolanza, *nercir*, annerire, *estraiture*, strettezza, *roisine*, resina, *voirre*, vetro, *oile*, olio, *oudeur*, odore, *rousée*, rugiada, *nous*, nodi, *ung pou*, un poco, *peulz*, peli, *pooire*, pera, *pououx*, pidocchi, *piarre*, pietra, *merché*, segnato, *il perche*, perfora, *yrengne*, ragno, *fouchiere*, felce, *Anfreque*, Africa, *frangille*, fragile, ecc.

D'altra parte la grafia del codice può fornire alcuni documenti per la storia della pronunzia francese. Per esempio

(1) Questo vocabolo che può leggersi anche *vesune*, corrisponde certamente per l'origine a *vesne*, adoperato da Rabelais (*Pantagruel* II, 27) con un significato analogo, ed anche a *vesine* che Littré accolse nel suo Dizionario, senza darne la storia.

(2) La notazione *en* per la vocale nasale *on* è comune negli scritti della Normandia, mentre quella di *ou* per il suono *o* appartiene ai dialetti meridionali.

trovandoci *fy* (ficus), *souée* (suavis), *digestis*, (digestivi), ecc., abbiamo una nuova prova che nel secolo XV, le consonanti *c*, *v*, *f*, non si pronunziavano in fine di parola. Per conseguenza si capisce come il traduttore scriva *soif* e *soit* (sete), *cost* e *cog* (herba costa), ecc, o come si abbia nel " *Grant Herhier* „ al cap. " *Agnus castus* „ *arbre sec* invece di *arbressel* (1).

Al pari di altri manoscritti contemporanei, quello dell' Estense offre molte varianti ortografiche; ed oltre a qualche *lapsus calami* del copista, vi si rilevano parecchi errori di traduzione, dei quali alcuni sono risultati da una falsa lettura di parole abbreviate nel testo latino; per esempio: *en haut pais* dove l' altro codice ha *marinis* (*m̄nis* letto *montanis*); *nombril du ventre*, per *umbilicus Veneris* (*v̄ris* letto *ventris*), ecc. Nondimeno esso è lungi dall' essere scorretto come il testo stampato dell' " *Arbolayre* „ e quello delle varie edizioni del " *Grant Herhier* „ (2). Infatti in questi libri gli errori si moltiplicano ad ogni pagina, ed è probabilmente la ragione per la quale Littré non li spogliò sistematicamente per la parte storica del suo Dizionario della lingua francese. Eppure detti errori sono facili da correggere, perchè risultano il più spesso dalla confusione delle lettere *m*, *n*, *i*, *u* (*v*) — *c*, *t*, ecc., nella scrittura gotica del manoscritto originale. Eccone alcuni esempi, accanto ai quali metto fra parentesi il vocabolo corrispondente rilevato nel codice dell' Estense: *alcanie* (alcanne), *carni* (carvi), *pauons* (pououx), *canne* (eaune), *limesche* (liviesche), *obcalime* (obtalmie),

(1) Così, secondo F. Genin, (*Des variations du langage français*, p. 44) si ebbe a Parigi il cambiamento di *Rue de l' Arbre-Sel* (corruzione di *arbrissel*) in *Rue de l' Arbre-Sec*.

(2) Oltre all' edizione comunemente citata del « *Grant Herhier* » stampata da Guillaume Nyverd, ho potuto consultare due altre, non menzionate dal Brunet, le quali si conservano nella R. Biblioteca Brera di Milano. Tutte e due sono state pubblicate senza data a Parigi, l' una da Jaques Nyverd, l' altra da Pierre le Caron. — Osservo che A. di Haller (*Bibl. bot.* vol. I, p. 242) dice a proposito di quest' ultimo stampato: « *Editio mea nullum habet annum, sed lego praefixum nomen urbis Parisiorum et annum 1499 fol. annum 1521, fol. Rast.* »

estoupe a rost (escope a roy, scopa regia), *pauoye* (panaie), *manne*, (manie), *cuisse d'aul* (coulse d'ail), *presses* (peches), *indaica* (judaica), *stalogium* (scalognum), ecc.

Però fra il manoscritto e le edizioni esistono differenze di maggior importanza per le nostre ricerche. Infatti il "Grant Herhier" racchiude sei capitoli (*Aqua, Lingua anseris, Behin, De limacis rubeis, Nistre, Sal*) che non sono nel codice francese, e questo all'incontro ne porge dodici (*Crocus hortensis, Cameleunta alba, Fusago, Faciens vidua, Faba grassa, Herbe Sainte Marie, Paritaire, Poulieul, Poires, Passules, Pomme citrine, Trinité*) che non furono stampati.

Da quel che fu detto innanzi, si vede che i testi dei quali abbiamo discorso si completano l'uno con l'altro; e quindi non sarebbe impossibile ricavarne la sostanza del "Circa instans", completo. A dir vero questa ricostituzione sarebbe forse cosa più fastidiosa che utile; ma ho pensato che potesse essere di un certo vantaggio per lo studio storico delle scienze, e specialmente per quello della botanica medicinale nel medio evo, il rilevare dai codici dell'Estense la parte descrittiva dei vari capitoli, unendovi l'identificazione dei vegetali che vi sono menzionati.

Nel compire quest'ultimo lavoro, le indicazioni fornite dai due manoscritti, nonchè dalle opere consimili della stessa epoca, mi bastarono, nella maggior parte dei casi, per riconoscere la specie, od almeno il genere delle singole piante; soltanto in alcuni capitoli, i dati essendo affatto insufficienti per giungere a questo risultato, ho dovuto limitarmi a indicare unicamente la famiglia, oppure tralasciare ogni identificazione. Devo avvertire che spesso, facendo seguire il nome scientifico moderno di una pianta da "o specie vicine (sp. vic.)", intendo naturalmentè con questa aggiunta, non specie vicine nel senso della botanica dei nostri giorni, ma bensì piante con tali caratteri esterni da essere state facilmente confuse dai nostri antichi erboristi.

Riguardo al testo degli estratti che ora sto presentando, premetto le seguenti osservazioni:

Per comodità delle ricerche, tutti i capitoli sono riferiti alfabeticamente ed accompagnati da un numero d'ordine.

Seguendo l'uso, oggidì generalmente ammesso per la riproduzione dei testi antichi, scrivo *v, j*, invece di *u, i*, consonanti, ed aggiungo qualche segno di punteggiatura o di accentuazione, dove la chiarezza del testo lo possa richiedere; ma non faccio alcun'altra correzione ai testi, se non quella di risolvere le abbreviazioni secondo l'ortografia più ordinaria di ognuno dei due codici.

Le rubriche precedute da una stelletta sono quelle che vengono menzionate all'indice dell'uno o dell'altro dei codici, senza che se ne ritrovino i capitoli corrispondenti nel testo, sia per negligenza dei copisti, sia per mancanza dei fogli strappati dal manoscritto francese. In quest'ultimo caso, riferisco, quando è possibile, il testo stampato del "*Grant Herhier* „ (G.H), secondo l'edizione di Pierre Le Caron, che mi è sembrata meno scorretta delle altre.

ESTRATTI

DEI DUE MANOSCRITTI DELLA REGIA BIBLIOTECA ESTENSE

TRACTATUS HERBARUM & SECRÈS DE SALERNE

1. — (fol. X). Absinchium... Absinchii duo sunt genera; unum (1) quod dicitur ponticum... habet saporem amarissimum et colorem in viridem. Aliud (2) reperitur sub albidum et minus amarum.

Absinchium, c' est aluine (aluisne, aluyne) (3)... Il est deux manieres d'aluine; l'une est appelee aluine pontique... Ceste a couleur verte et a la saveur tres amere. L'autre maniere trait sus le blanc et est moins amere.

2. — (fol. VII). Acacia... (4) Est autem acacia succus prunellarum immaturarum agrestium.

Acacia (acace, achace, achacie)... c' est le jus de prunelles non meures sauvages.

(1) *Artemisia pontica* L.

(2) *Artemisia Absinthium* L. — Nel testo di questo capitolo, il nostro autore raccomanda l'assenzio per conservare i libri ed i panni « *Item libros et pannos cunctos amoribus custodit, teste Dioscorides et Macro.* » — La medesima pianta, a cagione delle sue proprietà vermifughe, prese dai Tedeschi, il nome di *Wermuth*, donde deriva la parola *vermut*, vino noto. (Cfr. ingl. *wormwood*, assenzio).

(3) Metto fra parentesi le varianti ortografiche che si rilevano in altri passi del ms. francese. — In detto codice la peginazione non è notata.

(4) Succo dei frutti del *Prunus spinosa* L, il quale si chiamò più tardi nelle Farmacopee *Acacia di Germania*. — Littré, nel suo *Dict. de la langue française*, dà una strana etimologia della parola greca *ἀκασία*, acacia, col porre che essa sia stata formata da α privativo e $\kappa α σ ὶ ς$, cattivo, « *parce que ce végétal, bien que couvert d'épines, fournit de bonnes choses.* » Mi

3. — (fol. XV). *Acantum* herba quam alii vocant *melanphilon*, alii *pederon*. Nascitur locis delectabilibus et in aquosis, et habet folia parum mag' latuce, fixe sicut erucam et viridem multum quasi sub nigre, et braxiaca eius est levior et lingua duobus cubitis et grossa admodum digiti (1).

Acantum, c' est une herbe que aucuns appellent melantiflon et les autres pederon. Elle croist en lieu caveux, et a les feuilles moindres que feuilles de laictue, et sont fendues comme feuilles de chesne, et sont moult fort vertes en tant qu'elles sont aucunement noires, et la branche et l'erbe est longue de deux coudees, et est grosse de la grosseur d'un doy.

4. — (fol. XIX). *Acetosa* herba est sive *acedula* (2); similatur spinache et melius assimilatur *lapacium* rotundum, et habet saporem acetosum; semen eius est simile *lapacium* acutum.

Acetosa sive acetodula, c' est oseille. Et est une herbe dont la feuille ressemble a espinocche. Mais encoire ressemble elle mieulx a lapacium rotundum. Elle a saveur aigre, et la semence ressemble a semence de lapacium acutum, c' est doque.

5. — (fol. XIV). *Acetum* — *Vin aigre*.

6. — (fol. IX). *Acorus*... Est autem radix gladioli qui non tamen in aquosis locis verum etiam in siccis reperitur, et marinis partibus crescitur (3).

parr.bbe molto più verosimile di spiegare l'origine di detto vocabolo colla derivazione del radicale *ax* (idea di acutezza) che si ritrova in *ἄκων*, dardo; *ἄκωρη*, punta; *ἄκαζω*, aguzzare,... in *acuere*, *acumen*, *acus*, *acanthus* come anche in *aquifolius* (con foglie spinose), forma ortografica adoperata da Plinio (*Ilex aquifolia*), e conservata dai botanici moderni (*Mahonia Aquifolium* Nutt.).

(1) Sembrerebbe che questa descrizione fosse il risultato di una confusione fra l'*Acanthus* (*A. mollis* L. o *A. spinosus* Ten.), dalle foglie scure, e l'*Heracleum* (*H. Sphondylium* L. o sp. vic.) che nasce lungo l'acqua. Diffatti piante appartenenti a questi due generi si indicavano, ora col nome di *Acantum*, ora con quello di *Branca ursina*. Però nelle miniature relative al presente capitolo dei due manoscritti, si è voluto rappresentare evidentemente un'ombrellifera, quindi un *Heracleum*. — La parola *Acantum* aveva inoltre un altro senso, poichè leggiamo al cap. « *Anetum* » « *Acantum* i. semen urticae. »

(2) *Rumex Acetosa* L.

(3) Le miniature dei due manoscritti rappresentano l'*Iris pseudo-Acorus* L. o l'*I. foetidissima* L. — Nelle Glosse di Plateario sull'Antidotario di Niccolò (ediz. delle opere di Mesue, Venetia, 1508, fol. 288, r.) vien detto ugualmente: « *Acorus* est herba que alio nomine gladiolus vocatur » (Cfr. cap. « *Exiflon* » e « *Iris* »).

Acorus est racine de glay de eau, et toutesfois il ne croist pas seulement en eau, mais aussi l'en le treuve en hault pais.

7. — (fol. XV). Adianthos... (1) habens folia similia colliandro... Habet fusticulum sub nigrum et radix parva. Nascitur obscuris locis, et maxime in sepibus.

Adyanthos... Ceste herbe adianthos a les feuilles semblables a coriandre et a ung tronc qui trait sus le noir en couleur, et a petite racine, et croist es lieux obscurs, et mesmement en hayes.

8. — (fol. VIII). Affodillum (2), centum capita, albutium, eadem herba est; quidam dicunt porrus cerbinus. Radices eius inveniuntur quasi quedam capita in modum testiculorum. ✓

Affrodille (affodille)... Elle a feuilles semblables a feuilles de poriaux... En sa racine a unes testes en manieres de couillons.

9. — (fol. VIII). Agaricus est fungus crescens circa radicem abietis, et maxime in Lumbardia. Sunt autem due species, s. masculinum et femininum, sed femininum melius, et habet rotundam formam. Dessicatur et fit albiissimum. Masculinum (3) habet substantiam oblongam, et non adeo album. Femininum (4) est album et frangibile, et leve, et habet quasdam tuberositates intus et quadam frustrula quasi divisa. Masculinum non habet et non est adeo frangibile, sed est continuum, nec est ita album.

Agaric (5) est une excrescence qui croist vers la racine du sappin, et est ainsi comme en maniere de champignon et par especial croist en Lombardie. Et en sont deux manieres: c'est assavoir le masle et la femelle; mais la femelle est la meilleur et a la figure ronde et est tres blanc. Le masle a figure beslongue et n'est pas si blanc. L'agaric femelle est blanc et legier a froissier, et a dedens creux ainsi que pieces divisees; le masle ne les a pas, et est plus pesant.

10. — (fol. IV). Agnus castus (6) frutex est similis arbor.
Agnus castus est ung abrecel.

(1) *Asplenium Adiantum nigrum* L.

(2) *Asphodelus albus* Will. o sp. vic.

(3) *Polyporus* sp.

(4) *Agaricus* sp.

(5) *Bolet* nel cap. « Reubarbarum », e nel « Grant herbier » *boult*, al cap. « Fraxinus. »

(6) *Vitex Agnus-castus* L.

11. — (fol. XVI). Agrimonia (1). Domiani vero vocant eam vuone.

Agrimonia. Cest une herbe que l'en appelle agrimoine. Les Domiciens l'appellent vuone.

12. — * Alabastro (De) — * De alabastre.

13. — (fol. XIV). Alcanna (2) est herba que in transmaris partibus invenitur (3). Quia vero non ubique invenitur, qui eam habent pulverisant... Si vis tingere ungues vel capillos vel alias partes rubeo colore, distempera alcanna cum aceto vel aqua.

Alcanna, alcanne (4). Ceste herbe est trouvee es parties d'oultre mer, et si en trouve l'on grant quantité en Egipte et en Cecile. Et pource que l'on ne trouve mye en tous pays, ceulx qui l'ont la mettent en pouldre et la pourtent ainsi en diverses regions... Se tu veulx taindre les ongles ou les cheveux en rouge couleur, ou en autre partie, destrempe alcanne avec vin aigre ou eau.

14. — (fol. XIX). Alleluya herba est que alio nomine dicitur pane de cuccho; hec herba nascitur omnibus locis et circa viam, et ad pedem parietum, et similatur trifolium sed habet saporem acetosum; florem habet croceum (5).

Alleluya c'est vng herbe que l'on appelle pain a coqu. Ceste herbe croist en tous lieux, et par especial en hayes et en boys et au pie des paroiz. Et a telle fueille comme trieffle; mais elle a la saveur aigre comme oseille, et a la fleur jaune.

(1) *Agrimonia Eupatoria* L.

(2) *Lawsonia inermis* Lmk.

(3) Nel « Circa instans » stampato, si aggiunge: « et in Sicilia reperitur copiose », ma forse intendevasi l'*Anchusa tinctoria* Desf.

(4) *Alcamie* del « Gr. Herbier » risulta da una falsa lettura del manoscritto. Infatti *alcanna*, *alcanne* erano le trascrizioni di *alkenna*, *al-hinna*, nomi arabi per la radice della suddetta *Lawsonia*. Alla stessa origine devesi nel francese il diminutivo *orcandte* (*Anchusa tinctoria* Desf.), corrispondente dell'inglese *alkanet*, come anche il vocabolo *arcanne* (specie di terra rossa), registrato dal Littré, ma senza etimologia.

(5) Qui si tratta evidentemente della *Oxalis corniculata* L., e quindi questa specie non é oriunda dall'America, come lo ritiene, con molti altri autori, il Nyman nel suo « *Conspectus Florae europaeae* » a pag. 141.

15. — (fol. IX). Allium; aliud domesticum (1), aliud silvestre (2), quod scorderon appellatur... Succus eciam interius ore receptus excutit venenum, unde dicitur tiriaca rusticorum... Ad menstrua provocanda depiletur dens unius allii...

Allium, c' est ail (aul)... Il est deux manieres d' ail, l' ung domestique commun, l' autre sauvage... Son jus aussi pris dedens par la bouche boute hors venin, pour ce l' appellon tiriacle a villains... Pour faire courir les fleurs aux femmes soit pistee une coulse d' ail...

16. — (fol. XIX). Allutra (3) albor est cujus frutex similem est simul cerase.

Albatra; c' est une herbe dont le fruit ressemble a cerises.

17. — (fol. II). Aloen lignum... (4) Sunt autem tria genera lignorum aloes ut Constantinus dicit; est unum quod reperitur in insula que dicitur Cume, et est laudabilius ceteris...

Aloe, c' est bois qui est appellé ling aloes... De ce boys cy sont trois manieres. L' ung si est qui est trouvé en une ysle appelée Cume et est le meilleur de tous...

18. — (fol. I). Aloen ex succo herbe fit, que herba aloen (5) appellatur. Nos autem vocamus eam cimbar (6). Hec autem herba non solum in India,

(1) *Allium sativum* L.

(2) *Allium* sp.

(3) All' indice: « De albatris » — La miniatura porge un albero con frutti rossi, nel quale sarebbe assai difficile di riconoscere l' *Arbutus Unedo* L., se tale pianta non fosse, ancora ai nostri giorni, chiamata dagli Italiani: *albatre*, *albatro*, *albatrelle*, *albatrello* (Vedi O. Targioni-Tozzetti, *Dizionario botanico italiano*. Firenze, 1825).

(4) *Excoecaria Agalocha* L.

(5) *Aloe vulgaris* Lamk.

(6) Nell' anonimo « Tractatus de sinonimis » stampato nell' ediz. di Masue (Venet. 1508) fol. 355 v., si ha: « Sabar id est aloe », e tutti gli autori del secolo XVI che trattarono dell' aloe, ne diedero come nome arabo, *sabar*, *saber*, *sabor*, ecc. Quindi è assai singolare di constatare che i derivati di tal vocabolo siano rimasti nella lingua italiana soltanto per l' *Agave americana* L.; così in Sicilia « *Zabbàra di ghai*, *sabbàra*, *sambarone*, » e nella Calabria « *Zammàra*, *sambaron* » (Vedi J. Danielli, *op. cit.* p. 72). Se l' origine americana dell' *Agave* fosse meno accertata, si potrebbe dal suddetto fatto linguistico dedurre un argomento più plausibile di quello, sul quale si appoggiò il dotto storico della Botanica, E. Meyer (*Bot. Zeitung*, April, 1856, n. 17), per sostenere che tal pianta fosse già coltivata nell' Italia meridionale, prima della scoperta del Nuovo Mondo.

Persia, Grecia reperitur, verum eciam in Ampulia (1). Aloe tria genera sunt: cicotrinum, epatis et caballinum.

Aloen est fait du jus d'une herbe qui est ainsi appelée aloen, mais nous l'appellons inbar (2). Ceste herbe cy ne croist pas seulement en Ynde, en Perse, en Grece, mais aussi en Puille. Et sont trois manieres d'aloen: cicotrin, epatic et cabalin.

19. — (fol. XVI). Altea (3) herba est que alio nomine dicitur buisco vel ibiscum... Domiani vocant eam moloche agrie... Nascitur locis humidis et in campis... Ubi invenitur Bismalva de suo semen intelligitur.

Altea. C'est haute mauve (altee aute); autrement est appelée euiscus... Les Donnens l'appellent moloche agrie... Elle croist en lieux moestes et en champs... La ou l'en trouve bismalva, c'est a entendre de la semence.

20. — (fol. V). Alumen — Alun.

21. — (fol. XII). Ambra — Ambre.

22. — (fol. XVIII). Ambroxiana... (4) herba est similis eupatorium, (5) sed non est adeo longiora, et magis similatur mentastrum.

Ambrosiana. C'est une herbe semblable a eupatorium, mais elle n'est pas si longue.

23. — (fol. XVIII). Ameos (6), piperula, karvi agrestis, curminella, idem est. Due sunt enim species, s. maius et minus. Dicitur enim maius

(1) Anche nel codice di Breslavia abbiamo: « *Aloes dicitur que in Nimidia, Persia, Graecia, APULIA reperitur* ». Per conseguenza errano quelli autori, fra i quali il Nyman (*op. cit.* p. 178), che ritengono l'*Aloe* introdotta in Europa dall'America tropicale, benchè oggidì, secondo il « Compendio della Flora italiana » di V. Cesati, G. Passerini e G. Gibelli (p. 147), tale pianta non si trovi più allo stato selvatico che in Sicilia e nell'isola di Malta. — Vedi in proposito J. Camus e O. Penzig, *Ducale Erbario Estense del sec. XVI*, p. 39. Modena, 1885.

(2) Errore del copista per *cinbar*, poichè il « Grant Herbier dà *cymbre*.

(3) *Althaea officinalis* L. — Cfr. cap. « Malva eviscus ».

(4) *Achillea Ageratum* L., pianta chiamata in Italia *canforata* e *eupatorio giallo* (Targioni-Tozzetti, *Dis. bot.*) — Cfr. *Ambroxia* al cap. « Mille folium ».

(5) *Eupatorium cannabinum* L.

(6) In generale è assai difficile determinare le ombrellifere negli scritti del medio evo; però qui, v'è da supporre che si tratti dell'*Ammi majus* L., e del *Sison Amomum* L. — Si conosceva

quia magna habens folia... minor autem habet parva, et modice crescit et est valde aromaticum quam maius, et habet saporem quasi ut pipere. Nota q. illud quod in montibus crescit magis aromaticum est.

Ameos, piperula, carvi agrestis, curminella c' est, tout ung, et est une herbe que l'on appelle ameos. Et en sont deux manieres le grant et le petit. L'en appelle l'un le grant pour ce qu'il a grans feuilles... l'autre le meindre a petites feuilles, et ne croist gueres hault et a tres bonne oudeur, et sent meilleur que le grant, car le grant a comme oudeur de poyvre. Et est assavoir que celluy qui croist en montaigne a meilleur oudeur.

24. — (fol. XII). Amidalis amare (1) — *Amandes ameres.* ✓

25. — (fol. VII). Amidum — *id.*

26. — (fol. XI). Amigdale dulces (2). ✓
Amigdale dulces, ce sont amandes doulces.

27. — (fol. XIX). Amonum (3) — *id.*

28. — (fol. XV). Anabula (4).
Anabula (anabule).

29. — (fol. XI). Anacardi (5) sunt autem fructus cuiusdam arboris in India nascentis. Quidam dicunt q. sunt pediculi elefantum, quod falsum est.

Anacardi (anacars), ce sont fruitz dung arbre qui croist en Inde. Aucuns dient que ce sont pououx de elefant, mais c'est fault.

30. — (fol. VIII). Anetum (6) — *Anet.*

probabilmente già l'*Ammi copticum* L. che sembra essere il *Cuminum etiopicum* del quale si parla nel cap. « Ameos » del codice di Breslavia (Vedi Henschel, Janus, I, p. 71), come anche nel « Livre des Deduys » manoscritto del trecento (*Bibl. Estense*, n. 31, fol. 62, r): « *Prends une graine qui est appellé graine d'oultremer qui ressemble a commin, fors que elle est plus menue* ».

(1) *Amygdalus communis* L. var. *amara*.

(2) *Amygdalus communis* L. var. *dulcis*.

(3) *Sison Amomum* L. — Vedi « Ameos ».

(4) L'autore rinvia a « Titimallus ».

(5) Frutti dell'*Anacardium orientale* L.

(6) *Anethum graveolens* L.

31. — (fol. X). Anisum... (1) alio nomine dicitur ciminum dulce.
Anis... Il est appelé par aultre nom doulz commin.

32. — * Antalis (De) (2). — * De Entallis.

33. — (fol. XVIII). Anthera... (3) dicitur flos rose, i. semen q. reperitur in medio rosarum.

Anthera, c' est la fleur jaune qui est ou milieu de la rose.

34. — (fol. VII). Antimonium — *id.*

35. — (fol. XVIII). Anthora... (4) radix est parva; assimilatur quasi testiculi galli, et habet nigrum colorem exterius, intus vero alba... Nascitur in magnis montibus et in desertis.

Anthora c' est une herbe que l' en appelle actoire, et a petite racine qui ressemble a coillons de coq, et a noire couleur par dehors et blanche par dedans... Elle croist en grans montaignes et en grans desers

36. — *Antiformacum* (5)...

37. — (fol. V). Appium commune (6).

Ache commune (aiche, hache).

38. — (fol. VI). Appium emoroydarum (7) q. alio nomine botracion, staticere, appellatur. Alii dicunt vrā... Nascitur locis sabulosis. et in campis, et habet radicem similem verticulo et parve.

Ache de emorroydes est autrement appelé botracion, staticere. Les autres l'appellent vran... Elle croist en lieux sablonneux es champs et a racine semblable a vermeillon.

(1) *Pimpinella Anisum* L.

(2) Nell' « Alphita », glossario medievale pubblicato da C. Daremberg nella « Collectio salernitana » (vol. III, p. 276), si ha « *Anthale id est lapis quidam* »; però sospetterei che si tratti nel nostro manoscritto dell' *Anthalion* di Plinio, cioè del *Cyperus esculentus* L. (Vedi O. Lenz, *Botanik der alten Griechen und Römer*, p. 271. Gotha, 1859).

(3) Stami di rose.

(4) *Aconitum Anthora* L.

(5) Soltanto nel ms. fr., con rinvio al capitolo « Vincetoxicum ».

(6) *Apium graveolens* L.

(7) *Ranunculus* sp. secondo le miniature. — Per il nome *vran*, vedi cap. « Satirion ».

39. — (fol. VI). Appium raninum (1); nascitur iuxta aquas et in aqua. Alii vocant appium silvestre.

Ache ranin croist entour les eaues ou en l'eaue. Et l'appellent aucuns hache sauvaige.

40. — (fol. VI). Appium risus (2) nascitur locis sablonosis et in campis renosis... Alii vocant herba scelerata, alii appio rustico...

Ache de ris croist en lieux sablonneux et en champs gravelleux.

41. — (fol. XVI). Apollinaris (3) herba est q. sic appellatur quia Apollinus eam administravit ad Platonem. Greci vero vocant eam dicea... alii herba baccina...

Appollinaris, c'est une herbe appelee appollinaire pour ce que Appollonius, ung philosophe, l'administra a Platon. Les Grecs l'appellent dyatea... les autres herbe vaccine...

42. — (fol. III). Argentum vivum — *Argent vif.* ✓

43. — (fol. XII). Aristolonga, diverse sunt species s. longe et rotunde (4).

Aristologia (aristologe, aristologue, aristologie)... Il en est deux manieres la longue et la ronde.

44. — (fol. XII). Aristolonga lingua (5) sic vocatur quia habet radicem longam et subtilem... Domani vocant pexionus.

(1) Secondo la miniatura, sarebbe qualche ombrellifera, forse *Ceanothe Phellandrium* Lam. — Al cap. A. commune, l'autore spiega il nome di *raninum*, dicendo che viene dalle virtù della pianta contro le malattie dei reni, ovvero dalla sua abitazione in mezzo alle rane.

(2) Le miniature dei due manoscritti figurano un *Ranunculus*, e quindi si penserebbe al *R. sceleratus* L., poichè il nostro autore attribuisce alla pianta un'azione venenosa sull'uomo. Ma dall'abitazione indicata nel testo, si deduce più verosimilmente che il suddetto *Appium risus* sia la cicuta (*Conium maculatum* L.), come lo credette Henschel, nella sua dissertazione sul Codice di Breslavia, laddove riferì questo passo mancante al nostro manoscritto: « *Nota quod apium risus virtutem habet pernecabilem, homines enim ridendo perimit unde a quibusdam dicitur apium risus* » (Janus, vol. I, p. 70).

(3) J. Ph. de Lignamine, nel suo « *Herbarium* » (cap. XXIII), pubblicato alla fine del quattrocento, dà *Herba Appollinaris* come sinonimo di *Mandragora*. Altri invece, nel sec. XVI, chiamavano *Appollinaris*, il Giusquiamo. — Vedi num. 552, nella Sinonimia del nostro codice.

(4) *Aristolochia rotunda* L.

(5) *Aristolochia longa* L.

Aristologia longa. Aristologe est ainsi appelée pour ce qu' elle a racine longue et deliée... Les Romains l'appellent pecionus.

45. — (fol. X). Armoniacum est gummi cuiusdam arboris que simili nomine appellatur (1).

Armoniac. C'est la gomme d' ung, arbre qui est appelé pareillement armoniac.

46. — (fol. XIII). Arthemisia. Tria sunt genera s. maior, media et minor. De arthemisia maiore (2) nunc dicamus. Alio nomine dicitur mater herbarum. Romani vocant regia; Onnani vocant caristellum... Nascitur locis sablosis, et eciam in montibus et in ortis, habet folia subalbida et longa; assimilatur canapa.

Arthemisia, c' est armoise. Il en est de trois manieres. C' est assavoir la grande, la moienne et la meindre, mais maintenant voulons parler de la grant. Elle est autrement appelée la mere des herbes. Les Romains l'appellent regia; les autres l'appellent caristellum... Elle croist en lieux sablonneux et en montaignes et aussi en jardins. Elle a feullez traians au blanc et longues, et sont de telle figure comme chanvre.

47. — (fol. XIV). Arthemisia letaphilos (3) et dicitur minor sive matricaria. Flos ejus similiter camomille et habet odorem sambuci quando eam tunseris.

Arthemisia lepthaphilos, c' est armoise la moindre qui est autrement appelée matricaria, et a oudeur de seu quant l'en la espraint ou frote.

48. — (fol. XIII). Artemisia media (4)... Greci vocant tagantes... alii vocant tanacita...

Armoise moienne.

49. — (fol. XVII). Asarum (5) vel asara i. bachara.

Asara vel asarum i. brathea. Aucuns l'appellent vulgago.

(1) Estratto del *Dorema Ammoniacum* Don.

(2) *Artemisia vulgaris* L. od una delle altre specie vicine, allora probabilmente confuse sotto lo stesso nome.

(3) *Anthemis Cotula* L. o sp. vic.

(4) *Tanacetum vulgare* L.

(5) *Asarum europaeum* L.

50. — (fol. XV). Aspaltum i. bitumen judaicum — *id.* ✓
51. — (fol. IV). Assa fetida (1) — *Ase puante.*
52. — (fol. XVII). Astula regia (2) — *id.*
53. — (fol. XII). Atriplex (3)... utimur in quoquina seu in cibis.
Atriplex. C'est une herbe que l'on appelle arroche. Nous en usons en cuysine pour poree.
54. — (fol. XV). Auripigmentum — *Orpiment.* ✓
55. — (fol. III). Aurum temperacius est quolibet metello.
Or est le plus atrempé de tous les metaulx.
56. — (fol. XIX). Avellane (4) — *Avellane, ce sont avellaines.*
57. — (fol. XIII). Avena (5).
Avena, c'est une herbe dont le grain est ainsi appelé avene.
58. — (fol. XXI). Balaustia (6) flos candidus mali granati. Cum autem arbor fructus debet producere, flores in quadam tuberositate conglutinantur, et quandoque ab arbore cadunt... Psidia dicitur cortex mali granati.
Balaustia est la fleur qui chiet du pommier de granade. Quant cest arbre doit faire fruit, la fleur se assemble en une petite masse, la quelle aucunesfoiz chiet de l'arbre: ce appelle l'en balaustie... Psidia (psidie) c'est l'escorce de la pomme de grenate.
59. — (fol. XX). Balsamus (7) albor est, ut quidam dicunt, vel frutex, quod verius est, attestante Dioscoride et eciam illis qui viderunt, quod

(1) Non si conosce ancora esattamente la pianta che fornisce l'*Assa fetida*, ma si ritiene che essa appartenga alle *Ferulae* od ad un genere affine. (Vedi L. Maout et Decaisne, *Traité général de Botanique*, p. 263. Paris 1876).

(2) *Asphodelus albus* Wild, o *sp. vic.*

(3) *Atriplex hortensis* L.

(4) Frutti di *Corylus Avellana* L.

(5) *Avena sativa* L.

(6) Fiori di *Punica granatum* L. \

(7) *Amyris Opobalsamum* L.

nunquam crescit nisi in quantitate duorum cubitorum ad plus... Circa Babiloniam reperitur...

(* De basme) Balsamus. C'est ung arbre comme dient aucuns. Les autres dient que c'est une maniere d'arbrecel petit, et est verité, comme dit Dyascorides et aussi ceulx qui l'ont veu; il ne croist jamais plus hault que haulteur de deux coudees. Et le treuve l'on vers Babiloine...

60. — (fol. XXVIII). Bardana (1); alio nomine dicitur lapa inversa, alii lappa maior... Nascitur locis solidis pinguibus et humorosis, et proprie circa fossas... Habens magna folia et florem purpureum; facit lappa que simulatur pomiculi ambre; item facit semen nigrum et longum.

Bardana (bardane, grant lape, gleteron), c'est une herbe qui est autrement appelée lapa inversa ou lapa maior. Elle croist en lieux fermes et humoureux et gras, et principalement environ foussés. Elle a grans feuilles et fleur vermeille, et semblent petites pometes, et fait semence noire et longue.

61. — (fol. XXII). Baucia; huiusmodi herbe duplex est maneries: domestica (2) s. et agrestis (3). Hec herba alio nomine appellatur pastinaca. Dicitur plus competis cibo quam medicine.

Baucia, c'est une herbe que l'en appelle panaie (4). L'en le nomme autrement pastinaca. De ceste herbe sont deux manieres, la sauvaige et la privee ou domestique. L'en dit qu'elle vault mieulx pour viande que pour medicine.

62. — (fol. XXVII). Bedegard, spina alba... (5). Dicunt quidam bedegard esse quedam superfluitas que nascitur supra fustum rose (6), quod falsum

(1) *Lappa officinalis* All.

(2) *Pastinaca sativa* L.

(3) *Pastinaca sylvestris* DC., ed anche apparentemente *Daucus*, *Carota* L. (Cfr. più oltre i numeri 160, 535).

(4) La parola francese moderna è *panais*, della quale Littré non cita nessuna forma antiqua, poichè il *panax* di Paré, da lui riferito, non ha che fare colla pastinaca. Quanto all'etimologia poi, il vocabolo *panaie* del nostro testo deriva, in questo passo, evidentemente di una contrazione del latino *pastinacam*, e non da *panacem*, che avrebbe dato *pance*, come lo osservò bene il prof. Boucherie (*Additions au Dict. de Littré, Lexicol. bot.* p. 23). Tuttavia vedremo al cap. « Scolopendria » che il nostro codice offre pure un esempio di *panaie* nel senso di *panacea*.

(5) *Silybum Marianum* Gaertn.

(6) Escrescenza che vien prodotta sui rami delle Rose dalla puntura di un imenottero, la *Rhodites rosae* L. Il manoscritto francese rappresenta la *Rosa canina* L. o *sp. vic.*, senza galle.

est. Est autem bedegard herba que nascitur locis solidis et in planis, et habet folia pingua et fixa, similis eruce, et extenditur per terram, et in medio producit spinam albam que multum pungit, et hoc est quando parva est. Crescit autem in quantitate unius cubiti, et non amplius, et multa producit de hiis spinis, et habet florem purpureum.

Bedegard, c'est espine blanche... Aucuns dient que bedegard est une superfluité qui croist sus le fust du rosier, mais c'est faulx, car bedegard est une herbe qui croist en lieux fermes et plains, et a la feuille grasse, fendue a semblance de eruque, et se extent par terre, et ou milieu a une espine blanche qui est moult poignant, et se extent ainsi sur terre quant elle est petite. Car après croist elle en la haulteur d'une coulee, et non plus, et pourte moult de ces espines, et pourte une fleur vermeille.

63. — (fol. XXVIII). Bedellium, gummi arboris (1) est qui in ultra maris partibus reperitur; sed dicunt quidam quod sit idem quod reperitur infra quoddam rotundum simile galange, quod in arbor ulmi fit (2).

Bdellium, c'est une gomme. Elle croist en arbres qui sont oultre mer, et dient aucuns que c'est ce que l'en trouve en une chose ronde qui vient en ourmel, qui ressemble a garingal.

64. — (fol. XXIV). Belliculi marini... sunt autem umbelici; circa littora maris reperiuntur.

Belliculi marini (bellicules marins), ce sont ainsi que une maniere de nombris que l'en trouve environ les rivaiges de la mer.

65. — (fol. XXIX). Ben album.

66. — (fol. XXIX). Ben rubrum (3).

(1) *Balsamodendron africanum* Arn.

(2) Sembra trattarsi della galla di *Schisoneura lanuginosa* Htg., frequentissima sulle foglie dell' *Ulmus campestris* L.

(3) Il testo manca nei due codici, e le miniature grossolane che accompagnano i nomi di *Ben album*, *B. rubrum*, nel ms. lat. non aiutano per identificare le piante disegnate. Del resto queste denominazioni si applicavano a varie piante. Nel « Grant Herber » si ha: *Behin une excrecence aspre qui vient sur aucunes racines charneuses et restraist de seicheresse*; Nella « Sinonimia » già citata dell'ediz. di Mesue (1508) si legge: « *Ben rubrum radix q. in India invenitur. Been album in Egypto reperitur* »; Nic. Mutono nell'ediz. di Serapione (Venezia, 1552) dice al fol. 78: « *De Behen... radices autem sunt pastinacham parvam magnitudine aequantes. Ex*

67. — (fol. XXV). Berbena (1), verminaca idem est; herba est que alio ✓ nomine dicitur columbaria.

Berbena, c' est vervaine. Elle est autrement appelée columbaria.

68. — (fol. XXIV). Berberis sunt autem fructus cuiusdam arboris (2), rotundi et aliquantulum sub nigri.

Berberi. Ce sont les fruitz d' ung arbre (3), qui sont aucunement longs et roons, et en couleur traians sus le noir.

69. — (fol. XXIV). Bernix... est enim gummi cuiusdam arboris (4) in ultra maris partibus nascentis.

Bernix, c' est la gomme d' ung arbre qui croist oultre mer.

70. — (fol. XXII). Bethonica (5). Herba hec nascitur in planis, videlicet in silvis, et eciam in montibus et locis mundis... sancta dicitur ab omnibus personis... vocata domina omnium herbarum.

Betonica., c' est betoine (betoigne). Ceste herbe croist en boys et en montaignes, et en lieux umbragés, nés, et entour les arbres... est dite sainte de toutes personnes... appelée la dame de toutes herbes.

71. — (fol. XXIV). Bistorta (6) cuius radix bistorta appellatur, quia est tortuosa et similis galange, sed non habet acumen.

Bistorte... Saiches que bistorte est une herbe dont la racine est appelée bistorte, et est tortue en maniere de garingal, mais elle n' est point aque comme luy.

Armenia deportatur. »; Cesalpino nel suo Erbario raccolse la *Silene inflata* Smith per il *B. Album*, e la *Statice Limonium* L. per il *B. rubrum*; (Vedi T. Caruel, *Illust. in hort. sicc. A. Caesalpini* p. p. 43, 76); poi si ebbe per il *B. album* la *Centaurea Behen* L., ecc.

(1) *Verbena officinalis* L.

(2) *Berberis vulgaris* L. — Malgrado la descrizione chiara di questo fruttice, la miniatura del cod. lat. porge la *Rosa canina* L., od una specie vicina. Invece nel « Libro di Mandeville » (ms. del 1388 conservato nella Biblioteca Estense, n. 33) si legge al fol. IV: « Une espigne blanche que l' on appelle berberis ».

(3) Il « Grant Herbier » aggiunge « nommé en françois espinete vinete ».

(4) *Callitris quadrivalvis* Vent. — Cfr. « Vernis, sandaraca » nell' « Opus Pandectarum medicine Matthæi Silvatici » fol. 181, ediz. di 1521.

(5) *Betonica officinalis* L. e probabilmente anche diverse altre labiate (Cfr. T. Caruel *Illust. in hort. sicc. Andreae Caesalpini* p. 63).

(6) *Polygonum Bistorta* L.

72. — (fol. XXIX). Blatte (1) bisancie. Est autem blacte bisancie oculus quorundam piscium similis limacie, qui reperitur in mari, et habet substantiam ossium.

Blacte bisancie. C'est l'eul d'ung poisson qui ressemble a limace, et est trouvé en la mer, et a substance ossueuse.

73. — (fol. XXIX). Bleta (2) que greci vocant sicla hec herba satis competit esui.

Bleta. C'est une herbe commune que l'on appelle bete. Elle est bonne pour mangier.

74. — (fol. XXI). Bolus quedam vena terre est, que precipue in Armenia reperitur; unde dicitur bolus armenicus.

Bolus est une vaine de terre laquelle est plus trouuee en Armenie que aultrepart; et pour ce l'appelle l'en bol armenic.

75. — (fol. XXV). Bombax (3) sive cottonem, unum et idem est. Est herba que ultra maris partibus eciam Scicilia in multa quantitate crescit.

Bombax, c'est coton. Et est une herbe qui croist oultre mer et en Cecile en grant quantité.

76. — (fol. XXII). Borax... est autem gummi (4) cuiusdam arboris in ultra maris partibus nascentis.

Borrax, c'est la gome d'ung arbre qui croist oultremer.

77. — (fol. XXI). Borrigo (5) herba quidem est satis communis, aspera habens folia.

Borrigo est une herbe assez commune qui a les feuilles aspres, et l'appelle l'en bourraiche (borraiche, bourraige).

78. — (fol. XXIV). Branca ursina (6).

Branca ursina, c'est une herbe qui est ainsi appelée brance ursine.

(1) Sul margine sta scritto « blacce ».

(2) *Beta vulgaris* L. — Cfr. C. Bauhin (*Pinax*, p. 117): « Beta sicula, nunc Ciela practicis ».

(3) *Gossypium* sp. — Nella prima metà del secolo XVI, Rabelais (*Pantagruel*, cap. VII) vantava il *Coton de Malthe* per la sua bianchezza.

(4) Forse qui l'autore fa errore prendendo il borrace, sostanza minerale, per una gomma.

(5) *Borrigo officinalis* L.

(6) Vedi la nota al cap. « Acanthum ». — Al' indice del ms. franc., abbiamo « *De branche ursine* ».

79. — (fol. XXVIII). Braxillo (De) (1). Bracallum sive bercinum, arbor est tortuosa et valde rubea, et lignum similatur sandali rubeo. reperitur in ultra maris partibus.

* *De bresil.*

80. — (fol. XXVII). Brionia, cucurbita agrestis, vitis alba idem est. Nascitur locis sablosis humorosis et in sepibus, et habet magnam radicem. Sunt autem due species, scilicet alba et nigra; semen producit rubeum et illa dicitur nigra (2). Alia facit semen album (3).

Brionia. Cest brionie; l'en l'appelle aussi cucurbita agrestis, c'est courge sauvaige, et si l'appelle l'en vitis alba. Elle croist en lieux sablonneux moites et humoreux en haies et a grosse racine. Il en est deux especes, c'est assavoir la blanche et la noire. Celle qui porte semence rouge celle est appelee la noire, l'autre la pourte blanche.

81. — (fol. XXVI). Brittanica (4) est omoeos. Itali dicunt beata pianta yiana.

Brittanica herba, c'est l'erbe britannique l'on appelle autrement ameos. Les ytalien l'appellent beata piatamana.

82. — (fol. XXVIII). Brusci (5) sive bruscus.

Brucus. C'est cel arbressel de quoy l'on fait les housseurs a cheminees. L'on en treuve au boys en grant quantite.

(1) Si ammette comunemente che il *legno brasil* del medio evo sia stato quello della *Caesalpinia Sappan* L. Però siccome nel nostro ms. lat. vien detto al cap. « Sandalis » che tal legno non è aromatico, e che esso si sostituisce talvolta al sandalo, se ne può inferire che l'espressione suddetta designi anche il legno del *Pterocarpus santalinus* L. (Vedi F. A. Flückiger et D. Hanbury, *Histoire des drogues d'origine végétale*, trad. par J. L. De Lanessan, vol. I, p. 364. Paris, 1878).

(2) *Bryonia dioica* Jq.

(3) *Bryonia alba* L., ma le bacche di questa specie sono nere a maturità.

(4) *Ammi* sp., forse *A. Visnaga* Lamk. (Cfr. cap. « Ameos »). — Il nome *brittanica* si usò inoltre per il *Polygonum Bistorta*, la *Tormentilla erecta*, ecc. (Vedi fra altri Amatus Lusitanus, *Enarrationes*, p. 373. Venetiis, 1557) — Riguardo al nome volgare italiano, rilevo dai « Commentarii » di Matthioli (Venetiis, 1565, p. 947): « Quamquam tradit Ruellius Britanicam esse plantam Italiae cognitam, atque ibi vulgò appellari *Piatamano*, mihi tamen hactenus non solum nomen illud incompertum est, sed nullum etiam invenire obtigit, qui Britanicam ostenderet ».

(5) *Ruscus aculeatus* L.

83. — (fol. XXV). Buglossa... Herba lingua bovina que facit tres ramulos a semine... Nota q. hec herba bovina sunt tres species: prima (1) que producit florem colore selestis quasi borrago et radix eius est sub rubea. Alia (2) producit florem album, et radix nigra, intus vero alba, et facit ramulos magnos et similatur cauda cati. Alia (3) producit florem in citrino colore et habet modica folia, et est valde aspera, quia a multis dicitur asperago.

Buglosse.. Aucuns l'appellent borraiche sauvaige. Ceste herbe, dite langue de beuf ou buglosse, fait trois ramissiaux en faisant semence... Saiches de ceste herbe langue de beuf, ils sont .iii. especes; la premiere qui pourte fleur comme couleur de ciel, aussi comme bourraiche, et est sa racine tirant sur le rouge. L'autre pourte fleur blanche, et a racine noire par dehors et blanche dedans, et a grans rainseaux, et ressemble a queue de chat. L'autre a fleur jaune et a petites feules, et est tres aspre, et pour ce l'appellent plusieurs asperago ou asprele.

84. — (fol. XXVII). Bursa pastoris (4)... alio nomine dicitur sanguinaria, quod fluxum sanguis e naribus sistit; habens folia similia eruce; semen eius similatur bursa.

Bursa pastoris, c'est bourse a pasteur (bourse a pastour); aucuns l'appellent pastourelle. Et si est appelee sanguinaire pour ce qu'elle arreste le flux de sang du nés. Elle a feuilles qui ressemble a eruque petite, et sa semence ressemble a une bourse.

85. — (fol. XXV). Butirum — *Butirum*, c'est beurre (*burre*). V

86. — (fol. XXVIII). Buxus (5) albor et cuius ligna ad multa operantur rebus edificandis; folior' eius similatur mirta, et semen habet rubeum rotundum.

Buxus, c'est ung petit arbre dont l'on fait moult de edifices. Il a feuilles qui ressemblent a feuilles de mirre (6), et a semence rouge et ronde; l'en l'appelle bouix.

(1) *Anchusa italica* Retz., o *Alkanna tinctoria* DC., cioè la ἀρχουσα di Dioscoride.

(2) *Heliotropium* sp. o *Galium* sp. (Cfr. Ch. Mentzel, *Index nom. plant.* tab. 7. Bero-
lini, 1682).

(3) *Onosma echinoides* L.

(4) *Capsella Bursa-pastoris* Moench.

(5) *Buxus sempervirens* L.

(6) Invece di mirte, per errore di traduzione.

87. — (fol. XXXIII). Calamentum (1)... alio nomine nepita, nepitella... Calamentum montanum (2) melius est.

Calament... C'est une herbe qui est autrement appelée nepite... Calament montain est le meilleur.

88. — (fol. XXXIX). Calamus aromaticus (3)... est autem radix cuiusdam fructicis et calame assimilatur, et valde aromaticus et concavus, quod cum colligitur extrahitum quodam lignum interius existens... duplicis maneriei est. Quidam dicunt q. reperitur in Persia qui citrinus, et eo non utimur; alius in India qui sub albidus est.

Calamus aromaticus... C'est la racine d'ung petit arbre qui ressemble a roseau ou jonc, et a tres souee oudeur, et est aussi concave et creux, car, quant l'en le cuet, l'en oste une petite buchete dure qui est dedens, et aucunesfoiz le laisse l'en tout entier affin qu'il poise plus. Il en est deux manieres; l'en en treuve l'un en Perse qui tent a couleur citrine ou jaune, et de celui la nous ne usons point; l'autre est trouvé en Inde qui a couleur sus le blanc.

89. — * Calatantam (De) (4).

90. — * Caleam (De).

91. — (fol. XLVIII). Calendula (5) dicitur florem omne mense. Nascitur locis humorosis, et eciam mulieres ponunt in ortis ad faciendum coronam, quod habet pulchros colores citrinos, subrufos, et dicitur calendula quia omni mense gerit florem.

Calendula, c'est une herbe que l'en appelle soussicle (soucicle). Elle croist en lieux plains de humeurs, et en font les femmes leurs chapeaux (6) qu'ilz pourtent aux festes, car elle a belle fleur jaune et rousse, et l'appelle l'en kalendule pour ce que en toutes les kalendes de tous les moys elle pourte fleur.

(1) *Calamintha Nepeta* Link.

(2) *Calamintha officinalis* Moench. o *C. grandiflora* Moench.

(3) *Acorus Calamus* L.

(4) I capitoli *Calatantam* e *Caleam* mancano all'indice del ms. francese.

(5) *Calendula arvensis* L.; *C. officinalis* L.

(6) Nell'antico francese *chapel* aveva il senso di corona. Cfr. nel Diz. di Littré la storia della parola *chapelet*, rosario.

Aucuns experimenteurs, qui ne sont point a croire en ce, dient qui se oindroit au soir, quant il se va coucher, du jus de ceste herbe et d'aurosne (1), il se trouvera au matin mué d'une place en autre.

92. — (fol. XLIII). Calx albestrix. calx viva. ✓
Calx, c'est chaux.

93. — (fol. XXXVII). Camedreos (2) q. quercula minor appellatur.
Camedreos. C'est une herbe que l'on appelle ainsi, et est autrement nommee quercula minor, la mendre quercule... et est tout une mesmes herbe la camedreos la meindre, quercule et germandree.

94. — (fol. XLV). Cameleunta nigra (3) herba est q. alii vocant camel-
leam... Nascitur iuxta sepes et in fossatis; potest legi eam omni tempore.
Cameleunta nigra... c'est une herbe appelee cameleunte noire... aucuns l'appellent camelean. Elle croist jouxte les hayes et en foussez, et la peut on cueillir en tous temps.

95. — (fol. XLV). Camelleunta alba (4)... habet folia aspera, et in medio
habet in modum echino marinum rotundo et spinoso et vestito floribus
purpureis, et semen habet album et radicem albam et odorosam.
Camelleunta alba, c'est cameleonte blanche. Elle a feuilles aspres, et au copiau a ainsi comme une maniere de boutonniere espinu qui est plain de fleurs vermeilles, et a la semence blanche et la racine blanche et flairant bon.

96. — (fol. XXXVII). Camepitheos; (5) quercula maior.
Camepitheos (grant quercule).

97. — (fol. XLVI). Camomilla (6)... vocant Italii vuolorosa; Romani, beneolente; Galli, oblaodia; Tuscii, abiana.
Camomille que aucuns appellent chermiere.

(1) *Artemisia Abrotanum* L.

(2) *Teucrium Chamaedrys* L.

(3) *Carlina acaulis* L.

(4) *Carlina* sp. o forse anche qualche silibea (*Tyrimnus*, *Galactites*, ecc.).

(5) *Teucrium pseudo-Chamaepitys* L.

(6) *Matricaria Chamomilla* L.

98. (fol. XXX). Camphora (1)... Dicunt quidam camphoram esse gummi arboris, quod falsum est. Est succus cuiusdam herbe, testante Dyascorides et aliis multis, que camphorata dicitur herba (2).

Camphora, c' est camphre (camfre, canfre). Aucuns dient que c' est une gomme, mais c' est faulx, car c' est le jus d' une herbe si comme tesmoigne Dyascorides et autres plusieurs, et est l' erbe appelee herba calphorata.

99. — (fol. XLIV). Canapa herba est cuius duplex est maneries, s. domestica que satis est communis (3), et silvatica (4)... Canapa silvatica alio nomine dicitur agrion cannabin.

Canapa, c' est chanvre... C' est une herbe dont il est deux manieres. C' est assavoir la privee ou la commune, et la sauvaige... Chanvre sauvaige... l' en l' appelle autrement agrion canabin.

100. — (fol. XLI). Cancabrum... idem est q. furfur tritici.

De bren de froment. — (G. H.) Cantabrum c' est l' escorce du froment qui demeure au saxis, qu' on appelle bran.

101. — (fol. XLVIII). Candelaria (5)... crescens in magnis montibus, et maxime locis obscuris et humorosis; folia eius similatur sigillum Salamonis, et habet radicem similem candelaria et candela' de cera.

Candelaria, c' est une herbe que l' en appelle ainsi candeliere, pour ce qu' elle a racine semblable a chandelle de cire, et a les fueilles semblables au seau de Salemon. Elle croist en lieux umbrages, plains de humeurs.

(1) Sostanza proveniente dal *Laurus Camphora* L. ed anche altre volte dal *Dryobalanops aromatica* Goertn. (Vedi. Flückiger e Hanbury, op. cit. t. II, p. 258).

(2) Alcune piante come l' *Achillea Ageratum* L., o la *Camphorosma monspeliaca* L. venivano forse adoperate nella medicina di quel tempo per sofisticare la canfora, il cui prezzo era assai elevato.

(3) *Cannabis sativa* L.

(4) *Eupatorium cannabinum* L.; però vedi cap. « *Arthemisia* ».

(5) E assai difficile di identificare questa pianta, poichè, senza parlare delle miniature, ove i fiori celesti possono essere di mera fantasia, il testo non sembra indicare alcuna specie del genere *Verbascum*, al quale si riferiva altre volte il nome di *candelaria*, secondo alcuni botanici del secolo XVI. (Vedi L. Fuchsius, *De hist. stirpium*, p. 845. Basileae, 1542).

102. — (fol. XLVIII). Canna satis est communis que alio nomine dicitur arundo (1)... Canna mellis (2) in natura est quasi musa.

Canna; l'en appelle roseau. C'est une chose assez commune... Canna mellis, c'est la plante ou le sucre croist... et ceste plante ressemble a roseau... Ceste canne de miel est de telle complexion comme sont une maniere de fruitz que l'on appelle muses.

103. — (fol. XXXVI). Capillus veneris (3) — id. ✓

104. — (fol. XXXII). Capparis sive Capparus (4)... Est autem capparus ut quidam dicunt herba, alii q. frutex in transmaris partibus, eciam in Ampulia et in aliis partibus reperitur.

Capparis sive Capparus. Aucuns dient que c'est herbe, les autres dient que c'est ung petit arbresel; l'en le trouve es parties de oultre mer et aussi en Puille.

105. — (fol. L). Capragine (5)... alio nomine dicitur galligaria. Nascitur locis cultivis et humosis.

Capragine que aucuns appellent autrement galligaria. Elle croist en lieux labourés et moites.

106. — (fol. L). Caprifolium (6) sive caprificus herba est q. alii vocant oriolam; habens folia similia matrisilve, et maior est. Quidam vocant matrisilvam, sed menciuntur quod matrisilvam producit fructum rubeum, caprifolium vero nigrum et maius, et folii magis viridia. Illam vero albam nascitur in vallibus et in fossatis, locis obscuris, crescens in quantitate duorum cubitorum, et habet stipita sicut albor florem citrinum; semen immaturum viridem sub rubeum, maturum vero fit nigrum ut semen pionie.

(1) *Phragmites communis* Trin., o *Arundo Donax* L.

(2) *Saccharum officinale* L.

(3) *Adiantum Capillus Veneris* L. ✓

(4) *Capparis spinosa* L. — Dalle indicazioni dell'autore, sembrerebbe che questa specie fosse stata piuttosto rara in Italia nel medio evo.

(5) *Galega officinalis* L. — Questa pianta, nell'Erbario di Cesalpino, è accompagnata dalla menzione seguente: « *Caprago vulgo appellatur, alibi Gralega* » (Vedi T. Caruel, op. cit. p. 249).

(6) Secondo la descrizione, questo caprifoglio avrebbe i frutti neri dopo la maturità, quindi la sua specie dovrebbe essere *Lonicera nigra* L. o *L. coerulea* L., ma l'autore fa evidentemente una confusione con altre specie, parlando dei fiori e delle foglie. — Cfr. cap. « Matrisilva ».

Caprifolium sive caprificus, c'est chievrefeuil; aucuns l'appellent oriolain; les autres *matrisilvam*, mais ce n'est pas vray, car elle est greigneur. Et aussi *matrisilva* pourte semence rouge, et chievrefeuil noire, et aussi a il les feules vertes et l'autre les a comme blanches. Ceste herbe croist en vales et foussés, et croist jusques a la quantité de deux coutees, et a branches fermes a maniere d'estoc comme ung arbre; sa fleur est jaune, sa semence, quant elle est non meure, est verte, puis apres devient rouge, et, quant elle est completamente meure, elle est noire comme semence de poivre (1).

107. — (fol. XXXII). *Cardamomum* (2)... est autem fructus cuiusdam arboris, vel potius semen, in tempore veris producens fructus; facit quasdam tuberositates sicut est semen rute, vel semen fusaginis, vel similes uvis, in quibus semina conducuntur.

Cardamomum... c'est le fruit d'ung arbre, ou a plus vraiment dire la semence. Cest arbre produisant fleurs ou printemps fait une tuberosité ainsi comme semence de rue ou semence de fusain, ou semblables a raisin, et la dedens sont les semences.

108. — * *Cartamo* (De).

109. — (fol. XXXVIII). *Carvi* (3)... in transmaris partibus et eciam in Scicilia in multa quantitate nascentis.

Carvi... L'on en trouve en grant quantité es parties d'oultre mer et aussi en Cecile.

110. — (fol. XXXI). *Cassia fistula* (4). Fructus cuiusdam arboris quasi semina longa producentis, tempore postea succedente elongatur, et ingrosatur, et exteriora in coactione caloris condempnatur medulla interius existens; in una copula inveniuntur XX nel XXX sic coherencia (5).

Cassia fistula, c'est casse fistule (casse fistre). C'est le fruit d'ung arbre qui pourte semences longues, lesquelles par proces de temps se

(1) Il « Grant Herhier » ha *peoyne*, che corrisponde al vocabolo *pionie* del testo latino.

(2) *Alpinia Cardamomum* Roxb.

(3) *Carum Carvi* L. o meglio forse *Carum carvifolium* DC., a cagione dell'abitazione in Sicilia.

(4) *Cassia Fistula* L.

(5) Nel « Circa instans » stampato, si ha la variante: « XXX vel XL sibi coherencia ».

aloignent et engrossissent, et la partie de dehors par l'action de la chaleur du soleil se endurecit, et la mouelle demeure dedens; et en trouve l'en en un couple XX ou XXX qui se entretiennent.

111. — (fol. XXXIV). Cassie ligne (1) vel xillocassia. Est autem cortex cuiusdam arboris que cassia lignea dicitur, vel frutex nascens iuxta confinem Babilonie.

Cassia lignea vel xillocassia, c' est l'escorce d'ung petit arbre qui croist vers la fin de Babilone.

112. — (fol. XLVI). Castanee (2)... ad glandium comparacionem sunt ad digerendum faciles et nutribiles.

Castanee, ce sont chataignes... Elles sont bonnes a digerer au regart des glans, et aussi sont plus nourissant que les glans.

113. — (fol. XXXV). Castoreum... Est autem castoreum testiculus cuiusdam animalis quod castoreum appellatur, s. beveris.

Castoreum est le genitaire d'une beste appellé castor ou bever.

114. — (fol. XL). Catapucia (3).

Cathapucia (cathapice, catapuce) c' est espurge.

115. — (fol. XLIV). Caules (4)... manieres duplex est; quedam enim est bletis similis, est et qui vocatur carabie... caules duobus modis sunt, hyemales et estivi.

Caules sont choux... en y a de deux paires; l'ung ressemble a bele dit blitus, et l'appelle l'on carambia. Mais vray choux sont encore de deux manieres, car il y a choux d'iver ou hyemaulx, et si y a choux d'esté ou estivaux.

116. — (fol. XLII). Celidonia cuius duplex est manieres, s. indica (5) que citrinam habet radicem, et communis (6) que in partibus nostris

(1) Soorza di varie specie di *Cinnamomum*.

(2) Frutti della *Castanea vulgaris* Lamk.

(3) *Euphorbia* sp.

(4) *Brassica* sp.

(5) Probabilmente l'*Helleborus Teeta* Baill. (Vedi Flückiger e Hanbury, op. cit. t. I, p. 7).

(6) *Chelidonium majus* L.

reperitur... alio nomine arundinina vel herba arundinea. Oritur in tempore cum veniunt arundines.

Selidonia. C'est une herbe asses commune que l'on appelle celidoine. Aucuns l'appellent esclaire. Et saiches qu'il est deux manieres de celidoine, c'est assavoir, celle de Inde qui a la racine citrine... l'autre est la commune que l'on trouve en ce pays.

117. — * Celtica (De) (1) — * D' espic celtique.

118. — (fol. L). Cennerugio (2)... herba est similis celidonie. Quem quidam vocant celidonium masculus quia folia habent colorem similem celidonie; florem gerit purpureum, in medio sub albidum; radix sub nigra, intus vero alba; crescens in quantitate duorum cubitorum. Nascitur in fossatis et locis obscuris et aquosis. Invenias eam propter florem mense aprilis et maii.

Cennerugio, c'est une herbe qui ressemble moult a celidoine, et pour ce aucuns l'appellent celidoine masle, car elle a les feuilles et les fleurs pareilles a celidoine, qui tendent un poy sur le rouge, et sont blanches ou milieu; sa racine trait a noir par dehors et est blanche par dedens. Ceste herbe croist .ii. coutees en haut. Elle croist en fossés et obscurs lieux et caveux. Tu la trouveras portant sa fleur ou moys d'avril ou de may.

119. — (fol. XXXIV). Centaurea maior (3).

120. — (fol. XXXIV). Centaurea minor; (4) herba amarissima unde alio nomine dicitur fel terre vel febrifuga.

Centaurea, centoire. C'est une herbe tres amere, et pour ce l'appelle l'en autrement fiel de terre. La greigneur centoire est celle qui est de greigneur efficace.

121. — (fol. XLVII). Cepa domestica (5).

Cepa domestica, c'est oignon privé et commun (cibole). ✓

(1) Vedi cap « Spica celtica ».

(2) *Glaucium corniculatum* Curt., pianta tuttora chiamata *cienerognola* in Italia (Vedi Targioni-Tozzetti, *Dis. bot.*). Però il colore della corolla non è purpureo, ma piuttosto aranciato, come sembra voler dirlo il traduttore nel codice francese.

(3) *Centaurea* sp.

(4) *Erythraea Centaurium* Pers. e sp. vic.

(5) *Allium Cepa* L.

122. — (fol. L). Ceresa vel cerasorum, frutex albor est satis communis cuius duplex est manieres, videlicet in sapore, et eciam in virtute; sunt enim ceragie valde acre sub amari saporis et acetosi, que a quibusdam vocantur amarene; alii vocant agriotte (1)... Sunt autem alie ceragie (2) dulcis saporis, et multe sunt enim manieres in sapore et in bonitate, sicut diverse pire et similes.

Ceresa, cerises; l'arbre ou elles croissent est assés commun. Il est .ii. manieres de cerises qui different et en saveur et en vertu, car il en y a de telles qui sont tres aigres et sures, qui aucunement traient a saveur amere avec celle aigreur, que aucuns appellent amarenes, les autres agriotes... Il y a autres cerises qui ont saveur doulce, et de ceulx yci en y a il de moult de manieres differentes en saveur et en bonté, ainsi comme il y a diverses poires et autres fruitz differens.

123. — * Cera (De). v

124. — (fol. XXXII). Cerusa... flos plumbi sive gerse appellatur.
Cerusa est fleur de plonc ou jersa. v

125. — (fol. XLIV). Cerfolium (3)... herba est satis communis in quina et in cibis; folia eius similia sunt petro sillo.

Cerfolium, c'est cerfueil. C'est une herbe qui est assés convenable en cuisine pour mangier; elle a fueilles semblables a persil.

126. — (fol. XLVIII). Ceterach (4) herba est que nascitur in parietibus et muris, et eciam super lapidibus et antiquis locis.

Ceterac, c'est une herbe qui est ainsi appelée. Elle croist contre murs vieux et sur pierres et anciens edifices de pierre.

127. — (fol. XLIV). Cicer... Est cicer viride nec completum, est siccum atque completum... Siccum duobus dividitur modis; est enim cicer album (5), est et nigrum (6).

(1) Frutti di *Cerasus vulgaris* C. et G.

(2) Frutti di *Cerasus juliana* DC. e sp. vic.

(3) *Anthriscus Cerfolium* Hoff.

(4) *Ceterach officinarum* Wild. — Le miniature offrono un buon disegno colle due faccie delle fronde.

(5) *Pisum sativum* L.

(6) *Cicer arietinum* L.

Cicer, c' est une herbe ou croist celle semence que l' en appellent chiches... Il est deux manieres de chiches, car il y a chiches vertes qui n' ont point encores tout leur accomplissement, et si y a chiches qui ont leur accomplissement... Les chiches seches sont de deux manieres, car il en y a de blanches et de noires.

128. — (fol. XXIX). Ciclamen (1)... panis porcinus, malum terre appellatur... Nascitur locis cultivis et montuosis, quasdam habens tuberositates que quando maiores tanto efficiores.

Ciclamen... est autrement appelé pain a porc et malum terre ou pomme de terre. Il croist en lieux non labourés et en montaignes, et a une maniere de tuberosités ou excrescences, lesquelles tant plus sont grans tant est meilleur.

129. — (fol. XXXVIII). Cicuta (2).

Cicuta, c' est cheue.

130. — (fol. XXXVI). Cinamomum. Duo sunt genera cinamomy (3), s. grossum et spissum, et parum cavatum quod cortex est cuiusdam arboris, et subtile, quod cavatum est et non spissum, quod cortex est cuiusdam arboris fructice. Utrumque in India, Auropa reperitur.

(1) *Cyclamen europaeum* L. — Questa pianta è abbastanza ben figurata nella miniatura del ms. lat., ma nel codice francese abbiamo invece il *Lathyrus tuberosus* L. coi suoi tubercoli.

(2) Comunemente, con tal nome, vien disegnato presso gli antichi autori il *Conium maculatum* L., ma è probabile che la medesima denominazione abbia servito anche per altre ombrellifere venenose, quali *Cicuta virosa* L., *Phellandrium aquaticum* L., e specialmente *Aethusa Cynapium* L.

(3) *Cinnamomum* sp. (Vedi cap. « Cassie ligne »). — Ho qualche ragione di credere che una delle cortecce delle quali parla il nostro autore, sia la « cortex nere » menzionata nel « Liber simplicium medicinarum » del cod. di Breslavia, come pure nell' « Alphita » (Coll. sal. t. III, p. 302) ove abbiamo: « Nera id est arbor que fert cerasa nigra de cuius cortice sophisticato cassia lignea ». Ora, leggendo nel « Tractatus de sinonimis » (edis. cit. di Mesue, fol. 352 r.^o): « Cortex nere id est cuiusdam arboris similis ceraso: qui in Apulia nascitur, et fructus eius vocant micum », e nella « Sinonimia » del nostro codice (num. 548): « Cucube i. fructus nere », ne deduco che questa Nera sia il *micoucoulo* dei Provenzali, il *μικροκούλουι* dei Greci moderni, cioè sia il *Celtis australis* L. Infatti la corruzione di *cucube* in *cucule*, o in qualche forma simile, è resa plausibile dal confronto di confusioni analoghe avvenute nel latino, per es., fra *cucubalus*, *cuculus*, ecc. (Vedi Forcellini). Però la *cassia lignea* venne sofisticata anche colla scorza del *Ribes nigrum* L., come già lo notai altrove dando l'etimologia della parola francese *Cassis* (Vedi *Revue de Botanique*, p. 127, Oct. 1884).

Cinamomum, canelle. Il en est de deux manieres, l'une est grosse et espesse, ung poy concave, et est l'escorce d'ung arbre. L'autre subtile, deliee, et est toute concave, et n'est point espesse, et dient aucuns que c'est l'escorce d'ung petit arbrel. L'une et l'autre est trouvee en Inde et Europe.

131. — (fol. XXXVIII). Ciminum (1) est semen herbe in magna quantitate nascentis.

Cuminum, c'est commin. C'est la semence d'une herbe qui croist en grant quantité.

132. — (fol. XXXIX). Cipperus (2)... Est autem cipperus herba quedam modica, continua et tuberosa; est autem radix iunci triangularis; que in ultra maris partibus nascitur melior est et maior... quod vero in nostris regionibus reperitur minor est, et non tante efficacie. In quolibet tempore reperitur et colligi, sed precipue in fine veris.

Cyperus... est une substance continue, creuse et ligiere, et est la racine du jonc a trois costes qui croist oultremer. Et celuy qui croist la est le meilleur et greigneur... Cyperus que l'en treuve en nostre region est mendre que celluy qui croist la, et aussi n'est pas si bon... L'en le treuve en tous temps, et aussi le peut on cuillir en tous temps, mais mieulx vault celuy qui est cuilly en la fin de ver ou printemps.

133. — (fol. XXXVI). Cipressus (3) — Ciprés.

134. — (fol. XLIII). Citroli (4) sunt frigidores, grossiores cucumeribus. *Citrules sont encores plus froiz que coucourdes.*

135. — (fol. XLIII). Coliandium (5). Herba est satis communis; habet semen aliquantulam aromaticitatem.

Coriandrum, c'est l'erbe ou croist ce grain que l'on appelle coriandre... Coriandre a odeur aromatique et souesve.

(1) *Cuminum Cyminum* L.

(2) *Cyperus* sp.; *C. esculentus* L. molto probabilmente.

(3) *Cupressus sempervirens* L.

(4) Frutti giovani del *Cucumis sativus* L. — L'autore paragona la forma dei frutti con quella delle banane, al cap. « Musa ». — Cfr. cap. « Cucumerus ».

(5) *Coriandrum sativum* L.

136. — (fol. XLII). Colofonia (1)... Est autem gummi cuiusdam arboris qui in multa quantitate in Grecia reperitur, unde pix greca dicitur.

* De colofoine — (G. H.) *Colophonia, colofoine, c'est la gomme d'un arbre qui croist en grant quantité en Grece, et pource l'appelle on poix de Grece.*

137. — (fol. XXXI). Coloquintida (2) pomum est cuiusdam fructicis nascentis in ultra maris partibus, circa regionem Iherusalem, que dicitur ielela, et cucurbita alexandrina appellatur.

Colloquintida; l'en appelle ainsi colloquintide. Colloquintide est la pomme d'ung petit arbre qui croist oultre mer vers Iherusalem, et est autrement appelé iebela ou courge de Alexandrie.

138. — (fol. XLIX). Consolida maior (3)... alio nomine simphitum maius... Nascitur in ortis et locis humorosis, et habet folia magna ampla et longa; florem habet purpureum, radix sub nigra, intus vero alba et odorosa.

Consolida maior, c'est la grant consoude, et l'appelle l'en autrement simphitum. Elle croist le plus souvent es jardins et a grans feules et larges, et a fleur vermeille, et racine qui tent au noir par dehors, mais par dedens elle est blanche et a odeur fort.

139. — (fol. XLIX). Consolida media (4) quem alii vocant consoualdem; folia similia borraginis, sed non est adeo aspera; flos autem eius est sub citrinum et album colorem. Radix eius habet ad modum testiculi galli, et nodosa, unus ante alium. Nascitur in locis curtilis et humorosis.

Consolida media est consoude moienne; aucuns l'appellent consovalda. Elle a feules semblables a bourraiches, mais elles ne sont pas si aspres; sa fleur est moien entre noir et blanc, et sa racine est plaine de neufs qui ont facon de genitairres (5), et se entretiennent ces neux. Et en y a plusieurs l'un apres l'autre. Elle croist en lieux labourés, moites et plains de humeurs.

(1) Resina del *Pinus maritima* Lamb. o sp. vic.

(2) *Citrullus Colocynthis* Schrader. — Il nostro autore ne fa un frutice, ma questo genere di errore, che egli commette anche altrove, si capisce, poichè si tratta di piante esotiche che non aveva probabilmente mai vedute.

(3) *Symphitum officinale* L.

(4) *Symphitum tuberosum* L., o forse meglio *S. bulbosum* Schimp.

(5) Nel « Gr. Herbar », *genitoires de coc.*

140. — (fol. XLIX). *Consolida minor* (1) que alii vocant *citisana*; folia eius similatur *menta ortelana*; flos autem eius habet colorem purpureum, similatur *sticados arabicum*. Nascitur iuxta fossas, loco aquoso et humoso.

Consolida minor, c'est la mendre consoude; aucuns l'appellent citisana... Ses feuilles ressemblent a mente, et sa fleur a couleur sur le vermeil, et sont assés semblables a fleur de sticados arabic. Elle croist en fossés et en lieux moites.

141. — (fol. XLVII). *Contilidon* (2) herba est que alio nomine dicitur *faber*, alii *cimbalaria*... alii *umbelici veneris*...; habet folia rotunda et pingua, et crescit super tectibus et antiquis edificiis.

Cotilidon (cinbalaire), c'est une herbe que l'on appelle autrement faber; l'on l'appelle aussi cimbalaria et umbilicus veneris. Elle a feuilles rondes et grosses, et croist sur vieilles couvertures de vielx edifices.

142. — (fol. XL). *Corallus* — *Corallus*, c'est corail.

143. — (fol. XLVIII). *Cornu cervino* (3)... herba est que alio nomine dicitur *scorna montone*. Alii vocant *ferrariam*. Nascitur super lapidem per viam, et extenditur; similatur *nasturcium*, et in mediio semen simile *plantaginis*.

Cornu cervina, c'est une herbe que l'on appelle autrement scornia, les aucuns l'appellent ferraria. Elle croist sus pierres et s'estent et espant, et ressemble a cresson de jardin, et au bout a une semence qui ressemble a semence de plantain.

144. — (fol. XLVII). *Costula fetida* (4) herba est que multum similatur *camomille*, sed *feculenta* est valde, *camomilla* vero non olens odorem habet bonum et suavem... Sunt enim due manieres s. maior et minor (5).

(1) La *Brunella vulgaris* Moench si riconosce facilmente dalla descrizione; ma il termine *consolida minor* serviva allora a designare anche altre piante, e quindi non fa meraviglia di vedere la *Bellis perennis* L. figurata nella miniatura del codice latino, mentre vien rappresentata una specie di *Galium*, od una pianta di portamento simile, nel manoscritto francese (Cfr. cap. « *Rubea* » « *Spargula* »).

(2) *Umbilicus pendulinus* DC.

(3) *Senebiera Coronopus* Poir., o *Plantago Coronopus* L.

(4) *Anthemis Cotula* L.

(5) *Anthemis arvensis* L. o sp. vic.

Cotula fetida, c'est une herbe qui ressemble moult a camomille, mais elle a tres mauuaise oudeur et puant, et camomille l'a souef. Ce deuoit estre amourouque; (1) les aucuns l'appellent canesson. Et en sont deux manieres, la greigneur et la mendre.

145. — (fol. XLI). *Costus* (2)... radix cuiusdam herba in India nascentis, simili nomine eciam appellatur. *Costus* duplicis maneriei, s. indicus qui sub rufus est... et arabice qui s. albus est.

De cost. (coste) — (G. H.) *Costus*... c'est la racine qui croist en Inde qu'on appelle ainsi cost. Et en est de deux manieres. L'une qui croist en Ynde qui a couleur sur le roux. L'autre croist en Arabie et a couleur blanche.

146. — (fol. XLIX). *Cotonaria* (3)... herba est similis polligonie; folia eius tamen est alba et pilosa; pili ut fuerit bombix, quia dicitur cotonaria. Sunt enim due species, s. maior et minor: maior autem nascitur locis marinis, super montibus et lapidosis locis, et est valde pilosa et alba.

Coronaria, c'est une herbe qui ressemble a une autre herbe que l'en appelle poligonia ou lingua passerina, c'est langue de moisson, de la quelle sera apres dit, et luy ressemble coronaria par les feuilles. Mais les feules de coronaria sont pelues, blanches, et en ressemblent les peulx a peles de soie. Il en est deux especes la grande et la meindre: la grande croist en lieux qui sont vers la mer, sur montaignes, et est tres plaine de ces peulx, et blanche.

147. — (fol. XLIX). *Cotonaria* minor (4) nascitur locis solidis, et in planis, et habet florem parvum sub citrinum album q. parum discernitur. Hec herba crescit amplius in quantitate unius palmi. Maior autem crescit in quantitate unius brachii.

Coronaire la mendre croist en lieux fermes et en plaines, et a une petite fleur qui a couleur sur le jaune, qui n'est guere loin de blanc.

(1) Cfr. nell' « *Alphita* » (Coll. sal. t. III, p. 275): « *Amaruscus*, fetida idem ».

(2) *Haplotaxis Lappa* Decaisne, pianta chiamata *kosth* dagli Arabi (Vedi H. Baillon, *Dict. Bot.*). — Le due maniere del nostro autore erano forse soltanto due aspetti differenti di colore, che le radici di questa pianta potevano presentare nel commercio.

(3) *Lychnis coronaria* DC. e forse qualche *Gnaphalium*.

(4) *Filago arvensis*, L. *F. germanica* L., o sp. vic. — A questo genere dovrebbe riferirsi la pianta menzionata in questo passo del « *Livre des Dedyys* » (ms. cit. fol. 62): « *Prenez une herbe qui est appelee vermeilleuse et en medecine fillago* ».

Ceste herbe croist plus du hault d'une paulme, et la grande croist a la haulte de une brasse.

148. — * *Crispula* (De).

149. — (fol. XLI). *Cretanus* (1). *Herba est que in marinis locis reperitur. Alio nomine dicitur laccih.*

* *De crete marine.* — (G. H.) *Cretanus: C'est une herbe qui est ainsi appelee croite marine... Et est une herbe qui croist voutentiers en lieux eaueux environ de la mer.*

150. — (fol. XXXIX). *Crocus orientalis* (2).

Crocus, c'est saffren; il en est .ii. especes: de l'un est dit crocus ortensis, c'est saffran de jardin, qui la vient pour ce que l'en lui seme ou plante. L'autre est appellé crocus orientalis, saffren d'orient, pour ce qu'il croist en orient et croist sans nulle preparacion ou labour.

151. — (fol. XXXIX). *Crocus ortensis* (3); quod semen eius cartamen vocatur; flos autem ejus dicitur cafflor; tinctorum ipsum utuntur ad tingendum. ✓

Crocus ortensis, c'est saffran qui croist en jardin, la semence est appelee cartamus et la fleur appelee cafflor; les paintres en usent a paindre.

152. — (fol. XXXVI). *Cubebe* (4)... est autem fructus cuiusdam arboris in transmaris partibus nascentis.

Cubebe... c'est le fruit d'ung petit arbre qui croist es parties de oultre mer en Inde.

153. — (fol. XLIII). *Cucumerus* (5)... *Cucumeris genus sunt citrulli.*

Cucumeres, ce sont coucourdes, et sont les fruitz d'une herbe qui croist pareillement comme courges, mais ne sont pas si grans fruitz.

(1) *Crithmum maritimum* L.

(2) Il testo manca nel codice latino. V'è però una buona miniatura rappresentante il *Crocus sativus* L., col suddetto nome in margine.

(3) *Carthamus tinctorius* L.

(4) Frutto del *Piper Cubeba* L.

(5) La miniatura rappresenta bene il *Cucumis sativus* L.

154. — (fol. XLII). Cucurbita (1) et citrulli in calidis regionibus precipue reperiuntur.

* De courge — (G. H.) *Cucurbita est courge; citrulli est une herbe qui est de la nature de la courge... On les trouve le plus en chaudes regions.*

155. — *Culcasia* (2), c' est une racine qui croist le plus es parties de Egipte. Elle a saveur ague aucunement sur le poignant.

156. — * *Curcuma*. (De) (3).

157. — (fol. XXXI). *Cuscuta* (4)... Est autem *cuscuta* *podagra lini* quod heret circa *linum*.

Cuscuta. C' est une herbe que l' on appelle autrement *podagre de lin* pour ce qu' elle se hert contre le lin.

158. — * *Cymolea* (De) (5).

159. — (fol. LIII). *Dactylis* (6)... Quidam enim in frigida, quidam in calida nascuntur regione, quidam vero in mediocri.

Dactili, dates... Les unes croissent en chaude region, les autres en froide, les autres en moienne.

160. — (fol. LIII). *Daucus*; ejus duplex est manieres, s. *daucus creticus* qui maiori est efficacie, et dicitur *creticus* (7) quod precipue in Creta insula reperitur; et *daucus asininus* (8) quod cibus asinorum est precipue.

(1) *Lagenaria vulgaris* Ser, specie di cui la miniatura del cod. lat. figura due varietà importanti per la storia dell'orticoltura, cioè le forme cosiddette *zucca-fiasco* e *zucca a tromba* (Cfr. A. De Candolle, *Origine des plantes cultivées*. p. 197).

(2) *Colocasia antiquorum* Schott. — Il capitolo corrispondente manca al cod. latino dell'Estense. Nel cod. di Breslavia v'è un articolo col titolo di *mulcasia*, parola, che, secondo Henschel, si dovrebbe intendere per *culcasia*. Però osservo che nell'« *Alphita* » vien detto: « *Culcatia est radix nobis ignota* ».

(3) *Curcuma longa* L. — Vedi cap. « *Zedoaria* ».

(4) *Cuscuta Epilinum* Weihe.

(5) *Cimolea* si ritrova ugualmente nel codice di Breslavia (*Janus*, loc. cit. p. 66).

(6) Frutti della *Phoenix dactylifera* L.

(7) *Athamanta cretensis* L.

(8) *Daucus Carota* L. — Cfr. Pietro di Crescenzo (ediz. di 1478, lib. VI, c. 93): « *La pastinaca salvatica per altro vocabolo e appellata dauco asinino* », e nel « *De regimine sanitatis Ugonis Bencii senensis* » (ediz. di 1482, fol. 35, v.º): « *Ex oleribus et radicibus potest uti caroto sive pastinaca rubea* ».

Daucus; c'est une herbe assés commune, et pourte une fleur large comme la fleur du seu, et a ou milieu de la fleur ung petit point rouge (1). Elle croist communement en lieux secs, contre fossés; et en est de .ii. manieres: l'une est appelée *daucus creticus* pour ce qu'il croist en Crete, l'autre est appelée *daucus asininus* pour ce que les asnes le manguent volentiers.

161. — (fol. LIII). *Deronici* (2). Sunt eius radix sub albide, parve, quasi nodose ad modum polipodii.

Deronici, ce sont les petites racines d'une herbe qui est appelée *deronice*. Ces racines sont blanches et petites, plaines de neufs, ainsi comme la racine de *polipodium*.

162. — (fol. LIII). *Diptamus* (3)... herba est cuius radix simili nomine appellatur... in locis calidis et frigidis, et lapidosis precipue reperitur; cuius folia simulatur *fraxinum*.

Diptamus, c'est *diptam*. C'est une herbe dont la racine a non ainsi *diptan*, que aucuns appellent en ce pais *gingembre de jardin*, et croist hault, et a feuilles qui ressemblent assés a feules de *fresne*. Elle croist en lieux pierreux, chauls ou frois.

163. — (fol. LII). *Dragagantum* (4)... Est autem gummi cuiusdam arboris in ultra maris partibus nascentis; humiditas enim effluens ex accione caloris condempnatur, et in gummi substantiam transmutatur.

Dragagantum, c'est *dragagant* (*dragagan*)... est la gomme d'un arbre qui croist oultre mer, duquel il yst une humidité laquelle par chaleur du soleil est espessie et sechié, et muee en substance gommeuse.

164. — (fol. LIII). *Dragantum i. vitriolum*.

Dragantum i. vitreoleum, c'est *copperose*.

(1) Le miniature dei due manoscritti figurano questi fiori rossicci centrali nell'infiorescenza del *Daucus*. (Cfr. i cap. « *Baucia* » e « *Pastinaca* »).

(2) Forse le radici del *Doronicum pardalianches* Wild. — Cfr. nell'« *Alphita* »: « *Deronica seu veronica; radix est parva utroque capite gracili in medio vero latior* ».

(3) *Dictamnus Frazinella* Pers.

(4) Succo di varie specie di *Astragalus*. (Vedi Flückiger et Hanbury, op. cit. t. I, p. 346).

165. — (fol. LI). Dyagridium (1)... est autem succus cujusdam herbe nascentis in transmaris partibus, que est species tintimalli.

Dyagredium, c' est dyagrede. C' est le jus d' une herbe qui croist es parties d' oultre mer, et est une espece de titimaule.

166. — (fol. LVII). Ebulus (2) — *Ebulus, c' est yeble.*

167. — (fol. LVII). Edera nigra (3) albor est quot greci vocant cissommelle.

De esdre noir. — (G. H.). Edera magna: c' est yedre noire... Elle croist contre les arbres.

168. — (fol. LIX). Electerium (4)... cucumeris agrestis alio nomine dicitur.

Elacterum (elactere), c' est le jus de cucumere sauvaige, et a difference entre elacterides et elacterium, car elacterides sont les semences de cathapuce.*

169. — (fol. LVIII). Eliotropium (5) herba est que alio nomine dicitur sponsa solis; alii sicorea, alii solsequum, alii intiba... Nascitur locis solidis et in pratis. Hec herba est divina ad cursum solis, et habet fusticulos retrorsi, et florem in colore celestino.

De eliontropion que l' on appelle cicoree. — (G. H.). Eliotropium c' est une herbe qui est appelee sponsa solis, c' est cicoree... Elle croist en lieux fermes et en prez. C' est une herbe divine au cours du soleil: et a les branches tortues, et sa fleur a couleur du ciel.

170. — (fol. LIX). Elleborus (6)... Cuius duplex est manieres, s. albus, ita dictus quia radices habet albas... et niger quia nigram habet radicem.

(1) La droga conosciuta sotto quel nome proveniva dal *Convolvulus Scammonia* L., pianta della quale parla il nostro autore al cap. « Volubidis »; ma altre volte si riguardava generalmente il *Diagridium* come il succo di un' *Euphorbia*. Così abbiamo nel « Compendium aromatariorum » di Saladini, pubblicato alla fine del secolo XV: « Scamonea que secundum aliquos est succus volubilis maioris: et secundum alios est succus cuiusdam species thithymali ».

(2) *Sambucus Ebulus* L.

(3) *Hedera Helix* L.

(4) *Ecballium Elaterium* Rich.

(5) *Cichorium Intybus* L.

(6) *Helleborus* sp. o *Veratrum* sp. — Secondo Schroff l' elleboro nero degli antichi sarebbe stato *H. orientalis* Lamk. (Vedi Flückiger et Hanbury, op. cit. vol. 1, pag. 2).

Elleborus, eleboire. Il en est .ii. manieres, car il y a eleboire blanc qui est dit blanc, pour ce qu' il a les racines blanches... Il y a aussi elleboire noir qui est dit noir, pour ce qu' il a les racines noires.

171. — (fol. LVII). Emathites... lapis qui in occidentalis et orientali parte reperitur.

Emathites, c' est une pierre appelee emathite que l' en treuve en orient et en occident.

172. — (fol. LVI). Emblici (1) fructi sunt in ultra marinis partibus nascentis.

Emblici, embliques (emblics), ce sont fruitz qui croissent oultre mer.

173. — (fol. LIV). Endivia (2)... que alio nomine scariola dicitur. Semina et folia competunt medicine folia in usu ciborum... aliquantulam habet amaritudinem et ponticitatem.

Endivia, endive (endivie); l' en l' appelle autrement scariole, selon ce que dit cest acteur. Les semences et les fueilles vailent pour medicine... Ces fueilles ont aucune amerté... et si ont une ponticité.

174. — (fol. LV). Enula... duplex est manieres, s. ortulana (3), et campana (4) que maioris est efficacie... Enula campana reddit precordia sana.

Enula, c' est une herbe que l' en appelle eaune. Il en est .ii. manieres, l' une est dite ortholana, qui croist es jardins; l' autre est dite enula campana, c' est eaune qui croist en plains champs... Ceste eaune champaigne rend les entrailles.saines.

175. — (fol. LVI). Epatica (5)... est autem quedam herba crescens in aquosis locis, et precipue lapidosis, minuta habens folia.

Epatica, epatique... c' est une herbe qui croist en lieux caveux, et par especial se il y a pierres, et a menues feuilles qui se herdent a terre et a ces pierres.

(1) Frutti di *Phyllanthus emblica* L. — Vedi cap. « Mirabolani ».

(2) *Cichorium Endivia* L. — Nel manoscritto francese invece, la miniatura rappresenta una pianta dai fiori gialli, con foglie dentate, che sembra riferirsi a qualche specie di *Leontodon* o di genere affine.

(3) *Inula* sp., forse *I. Conysa* DC.

(4) *Inula Helenium* L.

(5) Apparentemente *Marchantia* sp., secondo le miniature dei due codici.

176. — (fol. LIV). Epithimum (1)... Est autem herba precipue in locis calidis crescens; flos ejus dicitur epithimum, quasi supra thimum crescens. Flos autem et non herba in medicinis ponitur, pro quo ponitur quando-cunque cuscute.

Epithimus, epithime... C'est une herbe qui croist le plus en lieux chaus. Cest herbe aucunesfoiz se tourne entour une herbe appellee thimus, et est sa fleur, et pour ce l'appelle l'en epithime, pour ce qu'elle croist sur cette herbe appellee thim. La fleur en est mise en medicine, et non pas l'erbe pour laquelle l'en met aucunesfoiz cuscute.

177. — (fol. LVII). Eruca... Est autem domestica (2) et silvestris (3) vero minor.

Eruca, eruque. Il en y a .ii. manieres, l'une domestique ou privee et l'autre sauvaige.

178. — (fol. LVI). Esula (4).

Esula, c'est esule.

179. — (fol. LVIII). Es ustum.

Es ustum, c'est arain brulé.

180. — (fol. LVIII). Eufrasia (5) q. alii vocant luminella.

De eufrase. — (G. H.). Eufrasia, c'est une herbe que aucuns appellent luminelle.

181. — (fol. LVI). Eupatorium (6); idem est quod salvia agrestis.

Eupatorium, c'est une herbe qui autrement est appellee salvia agrestis, et est tout ung eupatoire (eupatore) et sauge sauvaige.

(1) *Oscuta Epithimum* L.

(2) *Eruca sativa* L.

(3) Nelle miniature vien figurata una *Orocifera*, di portamento simile alla precedente, ma sarebbe impossibile di dire con certezza a qual genere essa appartenga. Questa seconda specie dovrebbe essere l'*eruque petite* menzionata al cap. « Bursa pastoris ».

(4) *Euphorbia* sp. — Nell' incisione del « Grant Herbier », l' *E. Cyparissias* L. è ben riconoscibile.

(5) *Euphrasia officinalis* L. — Nel margine del cod. lat. il nome è scritto *Eufragia*.

(6) *Salvia pratensis* L. o sp. vic. — Il medesimo nome serviva anche per il nostro *Eupatorium cannabinum* L., come si può rilevare dal cap. « Ambroxiana ».

182. — (fol. LV). Euforbium (1)... Gummi arboris est in India nascentis, que in tempore estivo quandam emittit gumositatem, que circa arborem conglutinatam in substanciam euforbii transit.

Euforbium... C'est la gomme d'ung arbre qui croist en Inde, lequel arbre en temps d'esté gette une gommosité laquelle se hiert a l'arbre, et s'endurcit, et devient euforbe.

183. — (fol. LVII). Exiflon (2)... herba est que alii vocant gladiolus sagittale, alii spatula fetida... Nascitur iuxta sepes et in umbrosis locis; similatur yreos.

De exiflon — (G. H.). Exiflon, c'est ung arbre que aucuns appellent glays satigal; on l'appelle communement spatula fetida. Elle croist en lieux umbrageux, et ressemble a feuilles de yedres (3).

184. — (fol. LXIV). Faba communis (4).
Fabe communes, feves communes.

185. — (fol. LXIV). Faba grossa (5), que alii vocant faba greca, herba est que appellatur sic; habens folia grossa et pingua, et succosa; radix eius est herba ad modum sigillum Salamonis.

Faba grassa, c'est feve grasse; c'est une herbe qui a grosses feuilles, et grasses, et ointeuses, et a racine blanche en maniere du seau Salemon.

186. — (fol. LXIII). Faba inversa (6) herba est similis solatrum rusticum in foliis eius; semen autem eius est simile bacce lauri; radix eius parva ut solatrum.

Faba inversa, feve enverse, c'est une herbe qui a les feuilles semblables a espee de morelle que l'on appelle solatrum rusticum, c'est

(1) Molto probabilmente il succo dell' *Euphorbia resinifera* Berg.

(2) *Iris foetidissima* L.

(3) Le parole *satigal*, *yedres* sono altri esempi degli errori di stampa che si rilevano tante volte nelle edizioni del « Grant Herbie ». fusi

(4) *Faba vulgaris* Mch. — Al cap. « Celidonia » il traduttore ci dà il nome del fusto di fava in questo passo: « *Capitellum*, c'est une forte leixive faite de cendre de favas et de grosse cendre a tainturiers ».

(5) *Sedum Telephium* L. o sp. vic.

(6) *Solanum nigrum* L. — Nella miniatura del cod. lat., le bacche della pianta sono rossicce, mentre sono giallognole in quella del ms. fr. Quindi si avrebbero due delle varietà della suddetta specie, cioè le varietà *rubrum* Mill.; *chlorocarpum* Spenn, od altre vicine.

alkacange, et sa semence est semblable a baies de laurier, et sa racine est petite comme celle de morelle.

187. — (fol. LXIII). Facius videon (1) herba est cuius folia assimilatur lauri (2), et nunquam producit florem. Nascitur in paludis et in aquis non bene curcivis; dicitur autem facius videon a viduam facendo. Quicunque comederat de hac herba statim mortem expectabit.

Faciens viduam, c'est une herbe dont les feuilles ressemblent a feuilles de laurier, et ne pourte jamais fleur. Elle croist en lieux paludeux et en eue mal courans, et l'appelle l'en faciens viduam pour ce qu'elle fait les femmes vesves, car occist et tue ceulx qui en usent. Aucuns livres disent que c'est tout ung elle et laureole.

188. — (fol. LXIII). Fagioli (3)... In partes duas dividuntur sunt enim albi et rufi.

Faseoli (faseoles), ce sont grains ainsi appellés... Il en y a de deux manieres, c'est assavoir blanches, et rousses.

189. — (fol. LXII). Feniculus (4) — *Feniculus, c'est fenoil (fenoul).*

190. — (fol. LXII). Fenu grecum (5). *Fenugrecum, fenugrec.*

191. — (fol. LX). Ferrum, ferrugo et scama ferri eiusdem virtutis sunt. (G. H.). *Ferrugo, c'est l'escume du fer. (6).*

(1) *Potamogeton natans* L. o sp. vic.

(2) I nostri maggiori conoscevano diverse piante venenose le cui foglie erano paragonate a quelle del lauro; così la *laureola* (Daphne), l'*oleandro* (Nerium), ed anche forse il *Laurus insana* di Plinio (XVI, 44) che J. Leunis (*Synopsis der Pflanzenkunde*, vol. II, p. 154. Hannover, 1885) sospetta essere il *Prunus Lauro-Cerasus* L. Quindi si può supporre che le pretese virtù del *Faciens viduam* gli fossero attribuite a cagione della forma delle sue foglie. Tuttavia noto che Plinio (XXVI, 8) dice: « *Potamogiton adversatur crocodilis; itaque secum habent eam qui venantur eos* ».

(3) *Phaseolus vulgaris* L., o forse *P. nanus* L. (Vedi Alph. de Candolle, *Origines des plantes cultivées* p. 272. Paris, 1883).

(4) *Foeniculum officinale* All.

(5) *Trigonella Foenum-graecum* L.

(6) Nel manoscritto francese manca il foglio sul quale doveva trovarsi l'indice del gruppo di capitoli colla F iniziale.

192. — (fol. LXV). Ferula (1) herba est similis fenicli, sed maior est, et fetet in multa copia. Reperitur in Calabria et in Sicilia.

Ferula, c'est une herbe appelee ferule. Elle ressemble a fenoil, mais elle est greigneur, et si put; l'on en trouve grant quantité en Calabre et en Cecile.

193. — (fol. LXV). Ficus (2) q. alii carice vocant; satis sunt communes; sunt multa genera caricarum albarum et nigrarum. Ficubus ceteris fructibus laudabilior est ac nutribilior est. ✓

Ficus, ce sont figues que aucuns appellent carices, et en est de moult manieres de carices, de blanches et de noires. Selon Ysaac la figues est la meilleur de tous les fruitz, et qui mieulx nourrist.

194. — (fol. LXII). Filicem (3)... Herba est satis communis quot Romani vocant ferce.

Filix, c'est fougere; c'est une herbe assés commune.

195. — (fol. LXVI). Filicis masculus (4) herba est similis alia filicem, sed non tamen crescens; radix autem eius est cepposa, et non spergitur per terram.

Filix masculus, c'est fougere masle. Elle est semblable a l'autre fouchiere, mais elle ne croist pas si hault; sa racine est chepue, et partie en plusieurs branches, et se espart sus terre.

196. — (fol. LXI). Filipendula (5), q. fissalidos alio nomine appellatur, in ultra maris partibus et Ampulia, in montuosis locis et calidis reperitur.

Filipendula, c'est une herbe que l'en appelle filipendule. L'en la treuve es parties d'oultre mer et aussi en Puille, et en lieux haults, et montueux, et chauls.

(1) *Ferula nodiflora* L. o sp. vic.

(2) Frutti di *Ficus Carica* L. — Questi frutti sono neri nella miniatura del codice latino, e verdi in quella del ms. francese. — A proposito di quel genere di pianta, credo interessante di riportare una passo curioso del libro di Mandeville, viaggiatore del secolo XIV, ove, trattando dell'Egitto, l'autore sembra parlare del *Ficus Sycomorus* L.: (Ms. cit. fol. XV, r.) « *Y a aussi figués qui n'ont point de fuelles, et portent les figues sur les brances, et les appellent figues de Pharaon* ».

(3) Secondo le miniature dei nostri codici, sembrerebbe che si tratti della *Pteris aquilina* L.

(4) *Polystichum Filix-mas* Roth.

(5) *Spiraea Filipendula* L. — Le miniature figurano bene la radice tuberosa.

197. — (fol. LXIII). *Fistularia* (1) sive *taglasana*, herbe et similis *majorana*, sed est viridior, et habet florem citrinum ut *penthaflon*; radix modica et sub rufa. Nascitur locis lapidosis et montuosis.

Fistularia, c' est une herbe nommee *fistulaire*, et est nommee *taglasana*. Ceste herbe ressemble a *majoraine*, mais elle est plus verte, et si a semence sus le jaune comme quinte feuille; elle a petite racine qui a couleur sus le rous; elle croit en montaignes et en lieux pierreux.

198. — (fol. LX). *Flammula* (2), i. vincula, est herba que sic appellatur, quia habet incensivam virtutem.

(G. H.). *Flammula* c' est une herbe qui est ainsi appelée pour ce qu' elle est chaude comme flamme, et art.

199. — (fol. LXIII). *Fragia* (3) sive *fragula*... satis est communis, et nascitur inter castaneta, et locis mundis et umbrosis.

Fragaria sive *fragula*, c' est une herbe qui est appelée *frasier*, et pourte les *freses*, et croist en bocaiges, et en lieux nés et umbragés.

200. — (fol. LXI). *Fraxinus* (4)... arbor est cujus cortex, semen et viscositas (5), quem ad modum fungi super excresciunt, usui competunt medicine.

Fraxinus, c' est *fresne*... C' est ung arbre dont l'escorce, la semence, et aussi une autre chose gluieuse qui y croist en maniere de *champignon* (6), vaillent pour medicine.

201. — • *Fuligo* (De).

Fuligo, c' est suie qui se hert a la cheminee de la fumee du boys.

202. — (fol. LXI). *Fu* i. *valeriana* (7) — *Fu*, c' est *valeriane*.

(1) *Potentilla Tormentilla* Schnrk. — Cfr. cap. « *Torbentilla* ».

(2) *Clematis Flammula* L. o sp. vic.

(3) *Fragaria vesca* L. e sp. vic.

(4) *Fraxinus Ornus* L.; *F. excelsior* L.

(5) Questa viscosità è evidentemente la *manna di fronda* o *di foglia*, sostanza secretata specialmente dalla prima delle suddette specie di frassino. (Vedi Flüchiger et Hanbury, op. cit., vol. II, p. 49).

(6) Il « *Grant Herbar* » aggiunge: « qu' on appelle *boulé* ».

(7) *Valeriana officinalis* L.

203. — (fol. LX). Fumus terre (1)... ita appellata, quia ut fumus a terra in multa quantitate exintitur.

Fumus terre, fume terre... est une herbe que l'en appelle ainsi fumus terre, pour ce qu'elle se engendre d'une grosse fumosité qui se eslieve de terre, et aussi qu'elle yst de terre en grant quantité ainsi comme fumee.

204. — (fol. LXIV). Fungi... duplices sunt, mortiferis. et non mortiferi (2).

Fungi, ce sont champignons... Il en y a de .ii. paires, car les ungs sont mortelz et qui font mourir ceux qui les mangeuent, les autres ne le sont pas.

205. — (fol. LXIII). Fusago (3) sive fusagine arbor est... cuius folia similia sunt folia sanguinem (4), i. quidam arbor; semen eius habet .iiii. semina in cruce similia in uno cortice, et habet croceum colorem.

Fusago sive fusasina. C'est un petit arbre que l'on appelle fusain et a feuilles qui ressemblent a sanc (5), et a semences qui ont .iiii. semences en croix qui sont toutes jointes ensemble en une escorce, et ont couleur jaune.

206. — (fol. LXVII). Galangal (6)... Quidam dicunt quod sit arbor, alii q. frutex. Dyascorides dicit q. sit radix, et reperitur circa pedem arboris in Persia.

Galanga, c'est garingal... Aycuns dient que c'est ung arbre, les autres dient que c'est ung arbressel. Dyascorides dit que c'est racine que l'en trouve au pié d'ung arbre en Inde et en Perse.

207. — (fol. LXVII). Galbanum (7)... Dicunt quidam q. est gummi arboris. Dicit Diascorides quod lacrimam est cuiusdam fructicis similis ferule.

(1) *Fumaria officinalis* L.

(2) Si capisce che, colla distinzione del nostro autore, non si possa porgere alcuna determinazione, nemmeno per il genere, poichè fra gli *Agaricus*, *Amanita*, *Boletus*, ecc. vi sono tanto specie mangereccie, come specie venenose.

(3) *Evonymus europaeus* L.

(4) *Cornus sanguinea* L. — Cfr. i nomi popolari italiani di questa specie: *sanguine*, *sanguinello*, *sanguinetto* (Targioni-Tozzetti. *Dis. bot. ital.*).

(5) Il traduttore non intese il senso della parola abbreviata del manoscritto latino. Forse mancava, nella copia che aveva sotto occhio, l'osservazione *i. quidam arbor*.

(6) *Alpinia officinarum* Hance, e sp. vic.

(7) Succo della *Ferula galbanifera* Boiss. o sp. vic.

* *De Galbane — Galbanum...* Aucuns dient que c'est gomme, mais Dyascorides dit que c'est la lerne d'ung arbressel qui ressemble a une herbe appelee ferule.

208. — (fol. LXIX). *Galia muscata*... Quidam dicunt q. fructus est (1), sed falsum est. Est autem quedam confeccio ex aromaticis et musco.

Gallia muscata... Aucuns dient que c'est ung fruit, mais ce n'est pas vray, car c'est une confection faite de choses souef flairans avec du musc. ✓

209. — (fol. LXIX). *Galla* (2) — *Galla*, ce sont noix de galles.

210. — (fol. LXIX). *Gallitricum* (3), alio nomine dicitur centrigalli.

Gallitricum c'est une herbe que l'en appelle gallitric, et croist en lieux secs et sablonneux, et est appelee aussi centrum galli.

211. — (fol. LXVIII). *Garioflata* (4) herba est et satis est communis... Dicitur autem garioflata que habet odorem similem gariofli.

Garioflata est une herbe assés commune, et l'appelle l'en gariofle ou sanemunde... et pour qu'elle a odeur semblable a clous de girofle l'appelle l'en giroflee.

212. — (fol. LXVI). *Gariofli* (5)... Sunt autem fructus cuiusdam arboris in India.

Gariofli, girofle ou clous de girofle. Ce sont les fruiz d'ung arbre qui croist en Inde.

213. — (fol. LXXI). *Gelesia* (6)... similis est bleton masculus. Folia eius est tribus coloris, videlicet rubea, viridis et citrina, unde dicitur gelesia. Quedam mulieres tenent in orto.

(1) Vedi cap. « *Nux muscata* ».

(2) *Galla* prodotta sul *Quercus lusitanica* Webb. var. *infectoria*, in seguito alla puntura di un insetto, la *Cynips Gallae tinctoriae* Olivier.

(3) *Salvia Sclarea* L.; *S. Horminum* L. — Vedi la parola *Gallitricum* nel Diz. bot. di O. Targioni Tozzetti.

(4) *Geum urbanum* L.

(5) Gemme florali della *Eugenia caryophyllata*, Thunberg.

(6) *Amarantus tricolor* L.

* *De gelesie* (1). — (G. H.). *Gelasia, c' est une herbe: et ressemble a blette, mais sa fueille est coulouree de trois couleurs, c' est assavoir de couleur rouge, de couleur verte, et couleur citrine ou jaune sus le rouge. Aucunes femmes la tiennent et la plantent en leurs jardins.*

214. — (fol. LXVII). *Genciana* (2)... *Radix autem genciane usui medicine maxime competit.*

Genciana c' est genciane... La racine de genciane est bonne pour medicine, et non l' erbe.

215. — (fol. LXX). *Genestinsula sive genestella* (3)... *simile est geneste, sed minor est, et habet stiptices minores et angustiores, et florem album, et semen rubeum velud bruschus. Genestam vero habet florem croceum.*

Genestule ou genestelle, c' est une herbe qui ressemble a genest, mais elle est maindre, et a branches meindres et plus gresles, et pourte fleur blanche, et rouge semence comme fragon ou brusc, qui est tout ung, mais genest pourte fleur jaune.

216. — (fol. LXX). *Genestra* (4) *herba est satis communis.*

Genesta, geneste (genest), c' est une herbe asses commune.

217. — (fol. LXVIII). *Git* (5)... *Est autem herba que intus frumenta reperitur, et semen nigrum quasi triangulare facit.*

Git... Elle croist es fourmens, et a semence noire qui a figure comme triangle ou a .iii. costes; et l'appelle l'en en commun langaige noiele (6), *mais les mediciens appellent noiele une autre herbe dont mencion sera faite apres.*

218. — (fol. LXIX). *Glandes* (7) *fructus idem sunt ex quercubus.*

(1) Oggi, *fleur de jalousie* o semplicemente *jalousie*. Vedi Littré, *Dict. de la lang fr.*

(2) *Gentiana* sp.; forse *G. lutea* L.

(3) *Oxyris alba* L., pianta tuttora chiamata *genestella* in italiano.

(4) *Sarothamnus scoparius* K. o *Genista* sp.

(5) Le miniature dei due manoscritti rappresentano l'*Agrostemma Githago* L.; ma, dalla forma dei frutti indicata nel testo, è probabile che si tratti invece della *Nigella arvensis* L. o sp. vic.

(6) Il « Grant Herber » dice « *en commun langaige herbe indayque* », ciò che potrebbe indicare la *Nigella sativa* L.

(7) Frutti di *Quercus* sp. — Il capitolo corrispondente manca nella traduzione francese, però esso è nel cod. di Breslavia. (*Janus* p. 66).

219. — (fol. LXXI). Golgemma (1)... Folia eius et custos similatur sticados citrinum, et habet florem similem rore marino... Nascitur in montibus et maxime in Provincia apud Montem Pessulanum.

* De golgemma. — (G. H.). *G olgemma. Ses feuilles et fust ressemblent a sticados citrin, mais la fleur ressemble a fleur de romarin.*

220. — (fol. LXXI). Gracia Dei (2)... Nascitur in pratis et maxime in locis humorosis; folia habens quasi mirta, sed sunt parviora et stricciora, et habet fusticulos quatriangulatus et florem album; crescit in quantitate unius palmi.

Gracia Dei, grace Dieu; c'est une herbe qui croist es prés, en lieux moites, et a feules qui ressemblent a mirtes, c'est l'arbre qui pourte les mirtilles, mais encoires sont ses feules plus gresles et plus estroites; et a ceste herbe les rainsieaux comme a .iii. testes (3) et pourte fleur blanche. Elle croist en hault a la haulteur d' une brace (4).

221. — Grain froissié (5), comme seroit fourment et autre grain cuit sans estre mis en pain ou paste. Telx grains cuis avec lait, comme l' en fait du froment la fromentee, ilx engendrent assés bon sanc.

222. — (fol. LXX). Gramen sive graminea (6) herba est satis communis, quot greci vocant agrostis.

De gramine. Gramen ou graminee. C'est une herbe assés commune et a telle feuille comme l'erbe commune des champs, mais elle est ung poy aspre et a une racine qui se espant fort en terre, et se estent bien loing.

223. — (fol. LXIX). Granum solis (7)... cuius semen proprie dicitur granum solis sive millium solis, quia nitidum est et clarum.

(1) *Lavandula Spica* L. — La miniatura figura vagamente la specie, ma il testo, soprattutto col paragone delle foglie con quelle del *Helichrysum Stoechas* DC, non mi sembra lasciare alcun dubbio intorno a questa determinazione.

(2) *Gratiola officinalis* L.

(3) Nel « Gr. Herb. »: « a trois costes ».

(4) Altro errore di traduzione del nostro testo, che si complica nel Gr. Herb., col controsenso « d' une branche! ».

(5) Questo capitolo manca al codice latino.

(6) Secondo le miniature dovrebbe essere qualche graminacea con radici stolonifere, come *Cynodon Dactylon* Pers., o *Agropyrum repens* PB.

(7) *Lithospermum officinale* L.

De grains du soleil. Granum solis, c'est une herbe dont la semence est proprement appelée granum solis; l'en l'appelle autrement milium solis, car c'est tout ung grain de soleil et mil de soleil (milet de soleil). L'en appelle ceste semence en francoys gremil (grumil), et est clere, blanche et luisante.

224. — (fol. LXX). *Grias* (1) herba est que nascitur in Lucaniam, et habet colorem marmoreum, et habet quatuor folia rubea.

Grias, c'est une herbe qui croist en ung pays appelé Lucane, et a couleur de marbre, et a quatre feules rouges.

225. — *Grisomiles ou crisomiles* (2), ce sont fruitz qui ne croissent point en ce pays, et sont fruitz qui ressemblent a peches... Elles sont mauvaises en toutes manieres, et se l'en en use, les doit prendre devant toutes autres viandes.

226. — (fol. LXX). *Gumma elemmi* (3) Gummi cuiusdam arboris est q. Sarraceni elemmi, id est arbor, sic vocant. Nos autem dicimus lome, alii vocant lymon. Dicunt quidam esse gummi feniculi, quod falsum est. Est autem gumma lymonum que in ultra marinis partibus invenitur... Gumma autem elemmi magnam habet efficaciam et habet magnum odorem, et cum rumpitur interius est pura, similis ture masculo.

Gumma elenni. C'est la gomme d'ung arbre que les Sarrasins appellent elemni, et l'appelle l'en aussi gomme de elemni ou de lomee, ou de limon. Aucuns dient que c'est la gomme de fenoil, mais ce n'est pas vray, car c'est la gomme de l'arbre qui pourte les limons oultre mer... Ceste gomme de elemni a grant vertu et a bonne oudeur, quant

(1) Nel *Herbarium Apulei* pubblicato da J. de Lignamine nel secolo XV, trovo al cap. LI: « *Nomen herbae Crias. Nascitur in Lucania marmoris albi colorem habet quatuor rubicundis ornata coliculis* » — Secondo Dodoneo, C. Bauhin, ed altri antichi botanici, tale pianta sarebbe stata una *Pinguicula*, e ciò spiega forse come il nome *Grias* sia stato scelto da Linneo per un genere di *Utriculariaceae* dell' America.

(2) *Armeniaca vulgaris* T. — Il capitolo corrispondente non si trova nel codice latino dell' Estense, ma bensì in quello di Breslavia, sotto la rubrica « *Crisomila* », parola formata da χρυσός, oro, e μήλον, pomo.

(3) Secondo Flückiger et Hanbury (op. cit., vol. I, p. 279) questa gomma, menzionata per la prima volta in una lista di droghe vendute a Francoforte verso il 1450, sarebbe identica ad un olibano particolare, conosciuto sotto il nome di *Luban Meyeti*, il quale si ricava dalla *Boswellia Frereana* Birdwood.

l' en la casse ou brise, et est clere ou pure dedens, et ressemble a fin ancens masle.

227. — (fol. LXVIII). Gummi arabici (1).

Gomme arabic... C'est tout ung gomme arabic et gomme sarrasine.

228. — (fol. LXXII). Heccinum (2) herba est similis cameleunta alba; sunt enim teneriores et albidiores, spisse et spinose, et lingua uno digito et spinosa, et habet duos ramulos, et summitate duas palinas rotundas et spinosas, similes echinomarino, et gerit florem purpureum; semen autem eius est simile cardo, videlicet rotundum et minuctum.

Heccine c'est une herbe qui ressemble a cameleonte blanche, de laquelle est dit devant, mais ses feules sont plus tendres et plus blanches, et sont espineuses, et a couppel a .ii. rainsseaux ou il a .ii. teteletes rondes, espineuses, la ou est sa semence enclose, laquelle semence est ronde et blanche comme semence de chardon, et la fleur est au bout de la tetele qui est comme vermeille.

229. — (fol. LXXIII). Herba paralis (3), q. alii arthritica vocant, crescit ad pedem montibus, locis humosis et aquosis; cuius similitudo est folia ruthe, et crescens quasi arbor.

Herbe paralisie que aucuns appellent arthetique. Elle croist es piés des montaignes, en lieux caveux, et a fueilles qui ressemblent a feules de rue, et croist en maniere de arbre.

230. — (fol. LXXII). Herba rabiosa (4) q. alii porrariam, alii fagiolariam, alii veruca. Nascitur in ortis et maxime inter porrorum; habens

(1) Gomma dell' *Acacia vera* Wild, e di altre specie vicine.

(2) *Carlina* sp. od altra *Cinarea* vic.

(3) Nel poema salernitano « Flos Medicinæ » (Coll. salern. vol. I, p. 507) abbiamo

« *Salvia, castoreum, lavendula, prima veris,*
« *Nasturtium, athanas, haec sanant paralitica membra* ».

ma fra i vari rimedi vegetali indicati in questi versi, contro la paralizia l'*athanas* (*Tanacetum* sp.) mi sembra il solo che si possa prendere in considerazione per identificare la pianta menzionata nei nostri codici.

(4) Questa descrizione ed i nomi italiani consimili ci indicano l'*Heliotropium europaeum* L. — Il manoscritto francese porge sotto il titolo « de Rabieuse » un secondo capitolo quasi identico al presente.

folia similia fagioli, sed mag' ac trahens in albedinem; florem habet parvum et album.

(G. H.). *Herbe rabieuse que aucuns appellent porreaue, pour ce qu'elle est bonne pour poreaulx et pour verrues. Les autres faseolaire pour ce qu'elle a les fueilles semblables a faseoles, mais ses fueilles trayent plus sus le blanc.*

231. — (fol. LXXIII). Herba sancte marie (1) q. alio nomine dicitur costus dulcem. Nascitur in ortis; competens enim precipue in unguentum marciaton, quod facit contra diversa, ut dictum est in Antidotario.

Herbe sainte Marie qui est autrement appelee cost ou coq (2). Elle croist en jardins. Elle est mise en l'oignement que l'on appelle marciaton, lequel oignement vault a moult de diverses maladies, si comme il est dit ou livre appelle Antidotaire.

232. — (fol. LXXII). Herba vitis (3) q. alio nomine dicitur squinancia. Hec nascitur locis sablosis et in montibus, et proprie iuxta mare; similis est foenum, et omni tempore gerit florem, et multum parvum in colore; flore rore marino parvior est.

(G. H.). *Herbe de vigne; elle est autrement appelee herbe a squinance. Elle croist en montaignes et specialement de costé la mer, et est menue comme herbe de foin. Elle porte fleur en tous temps, et est petite la fleur, et a couleur semblable a fleur de romarin, mais elle est encore mendre.*

233. — *Herbe d'ancens (4), c'est une herbe de qui les feules ressemblent a une autre herbe que l'on appelle meu, dont apres sera dit, et a une racine qui par dehors a couleur sur le noir, et par dedens est blanche et est gommeuse, et flaire bon, et a oudeur ainsi comme d'ancens. Elle croist es montaignes.*

(1) *Tanacetum Balsamita* L. — Nelle farmacopee posteriori, la pianta si chiamò *Costus hortensis*.

(2) Abbiamo qui la spiegazione delle strane denominazioni francesi moderne, *Herbe au coq*, *Menthe coq*, di cui nessuno ha finora indicato l'origine. Infatti i sinonimi del ms. mostrano che *cost*, derivato dall'arabo *Kosth* (Cfr. cap. « Costus »), si mutò nei scritti popolari in *coq* (gallo) per cagione della pronunzia identica (*co*) delle due parole nell'antico francese.

(3) *Asperula cynanchica* L.; *A. arvensis* L. o sp. vic.

(4) *Meum Mutellina* Gaertn. — Questo capitolo manca al codice latino.

234. — (fol. LXXI). Hermodactilorum herba (1) est cuius circa radices tuberositates inveniuntur.

(G. H.). *Hermodates, c'est une herbe ou croist a l'environ de sa racine une maniere de choses rondes, les quelles choses sont proprement appelees hermodates.*

235. — (fol. LXXII). Herpillus herba est similis serpillio (2), sed radix eius sub terra serpit... Sunt enim due species: una autem nascitur in ortis, alia in montibus et locis lapidosis.

Herpillus ou herpille, c'est une herbe qui ressemble a serpillle, mais sa racine se charie en terre et est longue... Il en est .ii. manieres, l'une croist es jardins, l'autre es montaignes et en lieux ou il a pierres.

236. — (fol. LXXIV). Iarus (3)... Alio nomine dicitur barba Aaron, eciam pes vituli appellatur; alii serpentaria minor. In locis humidis et siccis, montuosis et planis reperitur; in hyeme et estate colligitur; magnam habet efficaciam... sc. tuberositates que circa radices reperiuntur.

Iarus... L'en appelle aussi barbe Aaron et aussi pié de veau. Elle croist en lieu moite et sec, et en montaignes et en plaines, et la treuve l'en en yver et en esté. Aucuns l'appellent oueil (4) a prestre. Elle a une telle chappe, et dedens une telle chose longue comme serpentine (5), mais serpentine l'a moult plus grant. L'en la treuve en ce pays volentiers en hayes.

(1) Forse *Hermodactylus tuberosus* Salisb. — Questa pianta si trova oggidì inselvaticchita in diverse contrade d'Italia (Monti Berici, Colli Euganei, Prov. di Pisa, ecc.), nelle quali deve essere stata altre volte coltivata. Però sotto il nome di « *Hermodactylus* » è probabile che si adoperava inoltre qualche specie di *Colchicum*, forse il *C. variegatum* L., come lo ha supposto il professore J. E. Planchon (*Ann. des sciences nat. bot.*, 1855, IV, p. 132), e questo spiegherebbe in qualche modo la presenza del *Crocus sativus* nella miniatura del nostro codice latino, poichè i generi *Crocus* e *Colchicum* si confondevano certamente allora, come avviene oggidì anche, nel volgo.

(2) *Thymus vulgaris* L.; *T. Serpyllum* L.

(3) *Arum italicum* Mill. — La pianta è figurata abbastanza bene, senza macchie di sorta, nelle miniature dei due codici. Non capisco perchè voleva il Meyer (*Gesch. d. Bot.* IV, 157) che il *Jarus* di Plateario fosse stato l'*Arum Arisarum* L.

(4) L. Fuchsius (*op. cit.*, p. 68), trattando del Gigaro, dice: « *Vulgus quod pistillum promit exerti fere genitalis effigie, Sacerdotis virile nominant* ». Quindi sembrerebbe che, per certi riguardi, il copista del nostro manoscritto non abbia ardito di scrivere correttamente il nome volgare francese di tale pianta.

(5) *Arum Dracunculus* L.

237. — (fol. LXXVI). Ieribullus (1) herba similis cepe et nascitur locis lurdis et in sepibus, eciam in desertis.

De Ieribulle. Ierubule, c' est une herbe qui ressemble a oignon. Elle croist en lieux desers et en haies.

238. — (fol. LXXVI). Inantes (2) idem est q. lambruscus vel vitis agrestis. *Inantes et lambrusce c' est tout ung, et est vigne sauvaige.*

239. — (fol. LXXVI). Incensaria (3) herba est q. simili nomine appellatur, quia habet odorem incensum sive turem; habens folia similia consolida media sive borrago, et extenditur per terram, et in medio producit flores usque sex in colore citrino, in medio subalbido, et non crescunt super terram nisi longitudine unius digiti, et habet dulcem saporem quasi mellis, et odorem ture, quia dicitur incensaria. Nascitur locis mundis silvestribus et in castanetis.

De incensaire. Incensaria, encensaire, c' est une herbe que l' on appelle ainsi pour ce qu' elle a odeur semblable a odeur de ancens. Elle a les feuilles semblables a la moienne consoude ou a bourraiche. Elle se espant sus terre, et ou milieu d' elle pourte des fleurs jusques au nombre de .vi., lesquelles ont jaune couleur qui tent ou milieu d' elle (4). Elle pourte couleur qui tent a blanc, et ne croissent point ses fleurs sus terre plus hault que la longueur de ung doy, et ont douce saveur comme miel, et aussi ont odeur semblable a odeur d' ancens. Elle croist en lieux nets et en boscaiges.

240. — (fol. LXXVI). Indacus (5)... quedam confectio est ex quadam herba que dicitur guado et similatur cauli; q. in multa quantitate reperitur.

(1) *Liliacea* che appartiene probabilmente al genere *Allium*, almeno secondo le miniature. — Ph. de Lignamine (*Herb. Apulei*, cap. XXII) dà *Spata fetida* come sinonimo di *Herba Hierobulbum*.

(2) *Vitis vinifera* L.; inselvaticita.

(3) *Cerintho minor* L. od anche *Onosma echinoides* L., giacchè abbiamo nell' « *Ortus Sanitatis* » di J. Cuba (*edis. di 1491*, cap. 233): « *Incensaria herba est facta sicut arnoglossa, sed aspera et super terram spansa* ». — Mentre la miniatura del codice latino sembra riferirsi ad una delle suddette borraginee, quella del ms. francese rappresenta una *Composita* con fiori gialli, che è senza dubbio la *Pulicaria odora* Reich, chiamata *incensaria* da vari autori italiani, e fra altri da Cesalpino. (Vedi T. Caruel, *Illust. in hort. sicc. A. Caesalp.*, p. 48).

(4) Il « *Grant Herber* » aggiunge: *sur le blanc*.

(5) *Isatis tinctoria* L.

De indace. Indacus, c'est une herbe que l'en appelle gaude (1), et est l'erbe de quoy l'en taint en bleu, et a les feuilles semblables a chous. L'en en treuve en grant quantité en moult de lieux.

241. — (fol. LXXV). Ipericon (2)... herba perforata, herba sancti Joannis, scopa regia, idem est. Nascitur omnibus locis, et proprie iuxta fossas et in campis; habens folia similia rute, minutatim perforata, fusticulos rubeos; florem habet citrinum.

Ypericon, herbe persee ou pertusee, herbe saint Jehan, c'est tout ung, et aussi l'appelle l'en escope a roy. Ceste herbe croist en tous lieux et proprement croist sus et environ fossés, et aussi fait elle en plains champs. Elle a feules qui ressemblent a feules de rue, et appairent menu pertusees quant l'en regarde parmy, et a fleur jaune.

242. — (fol. LXXV). Ippirum (3) est herba q. alio nomine dicitur cauda equina.

Ippirum, c'est une herbe qui est appelée chevaunqueue. ✓

243. — (fol. LXXIV). Iris... similiter yreos, similes sunt in foliis... sed yris (4) purpureum florem gerit; yreos (5), album; herba est q. alii vocant gladiolus... Radix yris illirice (6) pro radice yreos potest poni.

Iris ou Yreos, c'est glay; yris et yreos sont semblables en feuilles et en facon de fleur, et en vertus, mais yris (7) pourte fleur sus l'inde rouge et yreos la pourte blanche. Mais gladiolus ou glaieul (8), qui leur ressemble aussi, la pourte jaune, et spatule puante (9) aussi, qui leur ressemble en feuilles, ne pourte point de fleur, et si put.

(1) Il « Gr. Herbier », scrivendo in questo passo *guaide* (fr. mod. *guède*), corregge l'errore nel quale incorse il nostro traduttore col porgere il *gaude*, nome della *Reseda luteola* L. In conseguenza, il miniatore del cod. francese, che, come l'abbiamo già visto più volte, badava poco alla descrizione data nel testo, figurò la luteola.

(2) *Hypericum perforatum* L.

(3) La miniatura del codice latino sembra riferirsi ad un *Equisetum*, quella del codice francese piuttosto all'*Hippuris vulgaris* L. Del resto il nome volgare italiano *coda di cavallo* serve ancora per i due generi di piante.

(4) *Gladiolus Segetum* Gawl. o sp. vic.

(5) *Iris florentina* L.

(6) *Iris germanica* L. — Questa specie è figurata bene nelle due miniature dei nostri codici.

(7) Vedi i sinonimi estratti dall'appendice del nostro codice latino.

(8) *Iris pseudo-Acorus* L.

(9) Sospetterei che si tratti qui di una *Typha* o di qualche pianta aquatica con portamento simile, confusa colla *Iris foetidissima* L.

244. — (fol. LXXVI). Iuiube (1). *ℓ*

Jujubes.

245. — (fol. LXXVII). Iumolum (2) album herba; est que simili nomine appellatur; est autem clara plusquam alia herba. habens radicem suam rotundam nigram et magnam ad modum cepa.

Iumolum album c' est une herbe ainsi appelee jumole blanc. Elle a racine noire et grosse a maniere d' oignon.

246. — (fol. LXXV). Iuniperus (3).

Jenievre.

247. — (fol. LXXIII). Iusquiamus... alii vocant simphoniaca (4)... Alii jusquamen cuius semen proprie jusquiamus appellatur; herba ipsa cassilago. Triplex diversitas, est enim album, rubeum et nigrum.

Jusquame que l' en appelle hanebane... Elle est par ung autre nom appelee cassilago et autrement simphoniaca... Il en est des semences de trois manieres, car il en y a de blanches, de rouges et de noires.

248. — (fol. LXXVI). Iva (5) herba est q. herba yva appellatur; habens folia pilosa et minuta intercisa, spanditur super terram sicut polligonia, et florem habet parvum citrino colore. Nascitur locis sablosis et in montibus tuis. Et nota quod omni tempore producit florem.

Iva, c' est une herbe que l' en appelle yve (ive). Elle a feuilles qui sont pelues et menues, et sont bien pres l' une de l' autre ainsi que sans qu' il y ait espace. Elle se extent sur terre, ainsi comme fait l' erbe que l' on appelle poligonia... Yve pourte fleur petite qui a couleur jaune. Elle croist en lieux sablonneux et en montaignes seches; elle pourte fleur en tous temps.

(1) Frutti del *Zisypus vulgaris* Lamk, e forse anche del *Z. Lotus* Lamk. (Vedi Flückiger et Hanbury, op. cit. I, 309).

(2) *Allium nigrum* L. (?). — La parola *Iumolum*, scritta *Etmolum* nel « Herbarium Apulei » (cap. XLIX), sembra contenere il greco μῶλυ, nome, nell' Odisseo di Omero, di una pianta con radice nera e fiori bianchi come latte, la quale, secondo O. Lenz (op. cit. p. 295), potrebbe essere l' *Allium magicum* L.

(3) *Juniperus communis* L.

(4) *Hyoscyamus niger* L.; *H. albus* L.

(5) *Ajuga Chamaepitys* L.

249. — (fol. LXXVII). Karabe vel kekabre gummi arboris est, et genus bernicis, quia eciam vocatur in ambra orientalis.

Iucabre ou kacabre, c'est une gomme que l'en appelle en francoys ambre, et est celle chose jaune de quoy l'on fait les patenostres qui tirent les festus; c'est une maniere de vernis (1).

250. — * Lacca (De).

De lacce. Lacca est la gomme d'ung arbre (2) qui croist oultremer.

251. — (fol. LXXX). Lactuca (3)... herba usui ciborum, semen vero usui medicine competit.

Laitue (laictue), ceste herbe est pour manger, et la semence est pour medicine.

252. — (fol. LXXXV). Lactuca leporina (4) herba est similis cicorea. Nascitur locis sablosis et humosis; expanditur super terram et in medio gerit florem similis ungule caballine (5).

Lactuca leporina, laitue a lievre; c'est une herbe qui a feules telles comme cicoree. Elle croist en lieux sablonneux et se espant sur terre, et ou mylieu d'elle pourte une fleur que ressemble a la fleur d'une herbe que l'on appelle ungle de cheval.

253. — (fol. LXXXIV). Lactuca silvatica (6), herba est q. Greci vocant tridaxagam... Nascitur locis cultivis et sablosis.

Laitue sauvaige. Les Grecs l'appellent tuxagam... Elle croist en lieux sablonneux.

(1) Al cap. « Bernix » si legge: « *Saiches que bernix, kakabre, veronice est tout ung* ».

(2) Succo di varie specie di *Acacia*. Però, secondo Le Maout et Decaisne (*Traité général de Botanique* p. 528), si chiama anche *lacca* l'essudazione di una specie di insetti (*Coccus lacca*) che vivono in agglomerazioni su alcuni *Ficus* dell'Oriente.

(3) *Lactuca sativa* L.

(4) *Taraxacum officinale* Weber. o sp. vic. — Le miniature rappresentano evidentemente una pianta di questo genere, ma è probabile che sotto lo stesso nome si intendesse allora anche qualche specie di *Sonchus*. Infatti non saprei spiegare altrimenti l'origine del nome francese di *palais au lievre* (*Sonchus oleraceus* L.) che come il risultato di una confusione con *laitue a lievre*, giacchè negli antichi scrittori italiani l'espressione *palacium leporis* si riferisce sempre all'*Asparagus tenuifolius* Lam. — Cfr. cap. « Trifolium ».

(5) *Tussilago Farfara* L.; ital. *Ugna di cavallo*, *ungbia cavallina*, ecc.

(6) Di nuovo *Taraxacum* sp. o *Leontodon* sp. nelle miniature.

254. — (fol. LXXX). *Lactuca silvestri* (1) in forma quasi domestica est; ramii tamen silvestras longiores sunt et frondes subtiliores et asperiores, minusque virides.

Laitue sauvage est assés pareille a la domestique en la figure des feules, et toutesfoiz sont les rainseaux ou branches de la sauvaige plus longs et plus deliés ou gresles, et plus aspres et ont moindre verdeur... La sauvaige laitue est amere et a ponticité ou arreur plus que la domestique.

255. — (fol. LXXXV). *Lanceolata* (2) sive lanceola vel plantago minor idem est.

Lanceolata c' est lancelee ; l' on l' appelle autrement petit plantain.

256. — (fol. LXXXIII). *Lapis agapis* vel lapis iudaicii idem est; similis est testiculi galli, externis obrigata et lucida quasi vitro.

Lapis agalpis, c' est la pierre agappe que l' en appelle la pierre judaïque. Elle est semblable a ung genitaire de coq, et est roié par dehors et par dedens; elle est ferme et clere comme voirre.

257. — (fol. LXXXIII). *Lapis armenicus*.

Lapis armenicus c' est la pierre de Armenie.

258. — (fol. LXXXIII). *Lapis demonis* vel lithon demonis quidam lapis niger qui fricatus attrahit lapidem ad se.

Lapis demonis ou lithe demonis. C' est une noire pierre qui attrait les festus comme l' ambre quant elle est frottee.

259. — (fol. LXXVIII). *Lapis lazuli* — *La pierre de lazur.*

260. — (fol. LXXXIII). *Lapis lincis* i. lapis que fit de urina lupi cervini et invenitur in montibus coagulata.

Lapis lincis, c' est la pierre de lin. Elle est faite de l' urine du leu cervin... et la treuve l' en es montaignes.

261. — (fol. LXXXIII). *Lapis magnetis*.

Lapis magnetis, c' est la pierre de aymant qui attrait le fer.

(1) *Lactuca viminea* Lk., o sp. vic.

(2) *Plantago lanceolata* L. o sp. vis.

262. — (fol. LXXXIII). Lapis spongie; dicitur esse quidam lapis in quo invenitur intus spongia.

De la pierre de l'esponge. Lapis spongie, c'est la pierre qui est trouvee dedens les sponges marines.

263. — (fol. LXXXVI). Lappacioli (1) sive lappa minor herba est habens folia similia ungule caballine (2), et non producit florem, sed habet lapa ad modum bardane. Nascitur locis humidis et in planis.

De lape la petite dicte lapaciolo. Lapaceola, c'est une herbe que l'en appelle lape la mendre, et a feuilles qui ressemblent a l'erbe appelee ungle de cheval, et ne pourte point de fleur, mais elle pourte telles semences qui se herdent de legier comme font celles que pourte la gran lape ou gleton, que l'on appelle bardane dont dit est devant. Elle croist en lieux moites, et entour lieux ou il a eaue.

264. — (fol. LXXIX). Lappacium... Romani, romice... Est autem triplex maneriei, s. lappacium acutum (3) habens acuta folia... lappacium rotundum (4) habens folia rotunda... et lapacium domesticum (5) folia habens lata et aliquantulum mag' (6).

Lapacium, c'est une herbe que on appelle parelle ou doque... en est de .iii. manieres, car il y a lapacium doque ou parelle ague qui a feules agues. Il y a aussi la ronde qui a feules rondes... et si y a celle qui est domestique ou privee, qui a feules aucunement lee et noires.

265. — (fol. LXXVII). Laudanum (7). Dicunt quidam quot sit gummi cuiusdam arboris, quod falsum est; sed in quasdam partes Grece ros in quasdam herbas descendit et circa illas conviscatur.

(1) *Xanthium Strumarium* L. — Diversi autori hanno creduta questa specie oriunda d'America, non essendosi rilevata finora alcuna menzione di essa nelle opere anteriori al cinquecento. (Vedi D.^r Saint-Lager, *Réforme de la Nomenclature botanique*, p. 86. Lyon, 1880).

(2) *Tussilago Farsara* L.

(3) *Rumex acutus* L. o sp. vic.

(4) *Rumex scutatus* L. o sp. vic.

(5) *Rumex Patientia* L.

(6) Può darsi che vi sia qui un errore del copista. Difatti il traduttore dando per la parola latina abbreviata, il francese *noires*, v'è da supporre che vi sia stato *nig'* (*nigra*) in altre copie del *Tractatus Herbarum*.

(7) Resina che proviene dal *Cistus creticus* L., dal *C. ladaniferus* L. e di qualche altra specie del medesimo genere.

Lapdane (laudane). Aucuns dient que c'est la gomme d'ung arbre, mais ce n'est pas vray; mais en une partie de Gresse descent une maniere de rousee sur les herbes, qui se hert encontre elles et se y espessit en maniere de glu.

266. — (fol. LXXXII). Laureola (1)... alio nomine dicitur mezerion, alii camedafne.

Laureole, c'est une herbe ou ung petit arbressel qui a plusieurs noms; l'en l'appelle camedafne... meseron, laurier terrestre.

267. — (fol. LXXXI). Laurus (2) — *Laurier.* √

268. — (fol. LXXXII). Lenticula (3)... usui medicine et esui competit. *Lentilles... vaillent plus pour l'usaige de medicine que pour mangier.*

269. — (fol. LXXXV). Lenticule aquatice (4) qui nascuntur in aquis, videlicet in fontibus vel in foveis, ubi moratur aqua.

Lentille de eaue (5), c'est une petite herbe ronde qui nage sur l'eaue en fontaines ou en lieux ou il a eaue dormant.

270. — (fol. LXXXII). Lentiscus (6) — *Lentisce, c'est ung petit arbre.*

271. — (fol. LXXXIV). Leontopodion (7)... alio nomine vocatur oculus consulis... per leonni; nascitur in campis et iuxta fossas et in arundineis.

Leontepedion, c'est une herbe que lon appelle pié de lion. Elle croist en plains champs et empres fossés.

272. — * Lepidos calce (De).

Lepidos calcis et batitura eris, c'est tout ung.

(1) *Daphne Mezereum* L. o *D. Laureola* L.

(2) *Laurus nobilis* L. √

(3) *Lens esculenta* Moench.

(4) *Lemna minor* L. e sp. vic.

(5) Nel « Grant Herbier » la pianta vien chiamata *ranoullee*, vocabolo che sembra aver per radicale il latino *rana*, a cagione dell'abitazione della pianta. Così al cap. « Appium » l'origine dell'espressione « *Ache de raynes* » (*Appium raninum*) è spiegata colle parole: « *pour ce qu'il croist en lieux ou raynes habitent* ».

(6) *Pistacia Lentiscus* L.

(7) *Alchemilla vulgaris* L.

273. — (fol. LXXXIII). Levisticus (1) — *Liviesche*.

274. — (fol. LXXXVIII). Licium (2); quidam dicunt esse gummi, quod falsum est, sed est succus herbe similiter appellate.

Licium; aucuns dient que c'est une gomme, mais ce n'est pas, car c'est le jus d'une herbe appelée ainsi licium... L'en l'appelle autrement oculus lucidus ou oeil luisant pour ce qu'il rent les yeulx clers et reluisans.

275. — (fol. LXXXVIII). Liliū; aliud domesticum (3), aliud silvestre. Sed silvestri aliud gerit florem purpureum (4) quod efficacius est, aliud croceum (5).

Lis. Il en est de .ii. manieres, car il y a lis sauvaige et lis domestique ou privé. Le lis sauvaige est de .ii. manieres, car il en y a qui pourte fleur sus le vermeil et est le meilleur... Ung autre y a qui pourte fleur jaune. Lis domestique qui croist es jardins... pourte fleur blanche.

276. — (G. H.). Limacis rubeis (De) (6).

277. — (fol. LXXXV). Linaria (7) herba est similis lino, sed habet florem citrinum, in medio sub albidum, et maiorem habens folia et lacriora.

De linaire. Linaria, c'est une herbe qui ressemble a lin assés, mais elle a une fleur jaune qui est comme blanche, et si a les feuilles plus laies que lin. Elle est en tout pareille a esule (8).

(1) *Levisticum officinale* L.

(2) Nella « Sinonimia » della Practica di Serapione (edis. cit. fol. 89) leggesi: « *Licium est quod fit de aqua in qua coquuntur cortices berberis* ». Difatti il *Licium* dei nostri maggiori era una sostanza preparata col legno o colle radici di varie specie di *Berberis* dell'India, quali *B. Lycium* Royle; *B. aristata* DC.; *B. asiatica* Roxb. (Vedi Flückiger e Hanbury, op. cit. t. I, p. 85).

(3) *Lilium candidum* L.

(4) *Lilium Martagon* L.

(5) *Lilium bulbiferum* L. o sp. vic.

(6) Questo capitolo del « Grant Herbier » manca ai nostri due manoscritti ed al « Circa instans » stampato, ma esso corrisponde certamente al cap. « Coclee terrene » del codice di Breslavia.

(7) *Linaria vulgaris* Moench.

(8) Il « Grant Herbier » aggiunge: « *fors que elle n'a point de lait comme esule* ».

278. — (G. H.). *Lingua anseris* (1). *Bec d'oye, c'est une herbe assez, commune sa racine ressemble a ung bec d'oye* (2), *et pourte feuilles a maniere de fougere.*

279. — (fol. LXXIX). *Lingua avis* (3). *Fraxinus cuius semen dicitur lingua avis.*

De langue d'oyse. Lingua avis, c'est langue de oyseau. C'est la semence du fresne qui a petites feules en maniere de langue d'oyseau.

280. — (fol. LXXXV). *Lingua canis* (4)... alio nomine dicitur *cynoglossa*. *Lingua canis, langue de chien. C'est une herbe que l'on appelle cinoglosse.*

281. — (fol. LXXXV). *Lingua hircina* (5) *herba est habens folia aspera ad modum buglosse, sed est parva et longa; florem habet sub rufum violaceum.*

Lingua ircina, c'est une herbe que l'en appelle langue de bouc, et a feules aspres comme a buglosse, mais elle est petite de la longueur (6), *et pourte fleur qui a couleur sus le rous ou comme couleur semblable a couleur de violette.*

282. — (fol. LXXIX). *Linochis* (7) i. *mercurialis*. *Linochis, c'est une herbe que l'on appelle mercure.*

283. — (fol. LXXXIV). *Linosa* (8) *quod semen lini dicitur.* *Linosa, semence de lin.*

(1) *Potentilla anserina* L. — Solo il « Grant Herber » comprende questo capitolo. Difatti la suddetta pianta non deve essere stata in uso nella medicina di Salerno, poichè, sebbene piuttosto comune in Francia, essa è assai rara in Italia, ove non si trova che nelle provincie settentrionali.

(2) Il Fuchsius invece, parlando della medesima potentilla, dice (*De hist. stirp.* p. 592. Lugduni, 1549): « Germani, quod herba illa anseres in cibo delectantur *Genserich* (Galli *Tinaice sauvage* ou *Bec d'oye*) vocant.

(3) Samarra di *Fraxinus* sp.

(4) *Cynoglossum officinale* L. o sp. vic.

(5) Secondo le miniature e la descrizione, probabilmente *Echium maritimum* Wild. o sp. vic.

(6) Aggiungere dal « Grant Herber »: « *d'ung doy* ».

(7) *Mercurialis* sp. — Nel margine leggesi: « *secundum Avicenam vocatur lublet* ».

(8) Seme del *Linum usitatissimum* L. — Qualche vernacolo di Francia ha conservato collo stesso significato: *linouse, lineuse, lenouse, lnoise* (Vedi il bel lavoro di N. Haillant, *Flore populaire des Vosges*, pp. 5 e 42. Paris, 1886.

284. — (fol. LXXVII). Liquiricia (1)... est enim magna radix parve herbe, habens folia simile pomo granato vel simile listrago (2)... Est autem eligenda que... intus est crocea.

Liquirice que l' on appelle rigolice (rigalice, regalice)... c' est une racine d' ung petit arbressel, et doit on eslire celle... qui a couleur jaune.

285. — (fol. LXXIX). Litargirum.

Litargirum, c' est litarge.

286. — (fol. LXXXIII). Lolium (3).

Lolium, c' est yvraie (4).

287. — (fol. LXXXI). Lupinus (5)... alius amarus... alius dulcis et inscupidus.

Lupins, ce sont grains ainsi appellés, et en est de .ii. manieres, car il y a lupins amers... il y a aussi lupins doux.

288. — (fol. LXXXIV). Luppulus (6)... Nascitur in sepibus et extenditur ad modum vitis alba, et folium eius similatur urtica; habens aliquantulum ponticitati.

De lupule. Lupulus, c' est une herbe qui croist en haies et rampe en maniere de l' erbe que l' en appelle brionie ou vigne blanche; l' en l' appelle hauberon et a feules qui ressemblent a ortie. Elle a saveur ague et poignant.

289. — (fol. XCIV). Maca (7) est autem, ut quidam dicunt, flos nucis muscate, quod videtur falsum, quia flores decidunt aut inter fructus consumuntur. Dicunt autem macas quidam cortices que reperiuntur circa avellanas.

(1) *Glycyrrhiza glabra* L. o sp. vic.

(2) *Astragalus glycyphyllos* L. ?

(3) *Lolium perenne* L.; *L. italicum* L. e sp. vic.

(4) Il « Grant Herbier » aggiunge: *proprement loeil* ».

(5) *Lupinus albus* L. o sp. vic. — P. di Crescenzo (op. cit., cap. XIV) dice parlando del lupino: « Per molta dimoransa ne l' acqua s' adolciscie; et cosi e facto insipido cioe sansa sapore ».

(6) *Humulus Lupulus* L.

(7) Arillode della *Myristica fragrans* Hott.

Macis. Aucuns dient que c'est la fleur de noix muguete, laquelle chose ne semble pas estre vraye, car fleurs, ou elles chient, ou elles se muent en fruit. Mais macis est une escorce que l'en treuve entour la noix muguete, ainsi comme l'on en treuve entour les avelaines.

290. — (fol. XCV). Macedonici (1) sive alexandri idem est q. petrossilinum macedonicum herba est; oritur in ortis et omnibus locis; similis est appio domestico, sed habens magna folia. Radix eius est sub nigra, intus vero alba. Semen habet nigrum et grossum.

Macidoine, c'est persil macidoine que l'on appelle autrement alexandrin. Il croist en jardins et en tous lieux, et ressemble a ache domestique, mais il a plus grans feules et pourte semence noire.

291. — (fol. XCIV). Maiorana (2) — *Mariolaine (maioraine).* ✓

292. — * *Malabatre (De)* (3).

293. — (fol. XC). Mala citonia (4).

Mala citonia, ce sont pommes de coing.

294. — (fol. XCI). Mala maciana (5) i. silvestria.

De macianes. Mala manciiana, ce sont pommes sauvages.

295. — (fol. XCI). Malorum granatorum (De) (6).

Mala granata, ce sont pommes de grenate (grenade, granade).

(1) *Althamantia macedonica* Spr.

(2) *Origanum Majorana* L.

(3) Colla denominazione « *folia malabatri* » designavansi altre volte le foglie disseccate di varie specie di *Cinnamomum* (Vedi Flückiger et Hanbury, *op. cit.* II, 246). — Il testo del capitolo manca ai nostri codici, ma nell'edizione cit. del « Circa instans » si ha: « *Malabattrum quod folium paradisi dicitur, est folium album et multum aromaticum.* »

(4) Frutti della *Cydonia vulgaris* Pers.

(5) Frutti selvatici del *Pyrus Malus* L., ed anche forse del *Viburnum Lantana* L. le cui bacche, somiglianti a piccoli pomi rosei, vengono chiamate *manciennes* dai Francesi, e si mangiano tuttora presso alcuni popoli del nord (Vedi Gillet et Magne, *Flore française*, p. 225). Si avrebbe in tal modo un'altra aggiunta da fare al Dizionario di Littré riguardo all'etimologia di *mancienne*, poichè pare evidente la derivazione di tal vocabolo da *maciana* o piuttosto da *manciiana*, forma data nell'« *Alphita* »).

(6) Frutti della *Punica Granatum* L. — Il ms. francese ha sotto questo titolo, due articoli diversi dei quali il primo manca al codice latino.

296. — (fol. LXXXVII). Malva... cujus duplex est maneries, domestica (1)... et silvestris. Que malvaviscus dicitur et bismalva eiam dicitur, crescens alcius et alciora et laciora... fit eiam quasi frutex.

Maulve... en est deux manieres, c'est assavoir, domestique ou privee qui croist en tous lieux... L'autre est mauve sauvage qui est appellee bismauve, et croist plus hault, et a plus laies feuilles, et est comme ung arbret.

297. — (fol. LXXXVII). Malvaviscus (2)... Alio nomine dicitur bismalva; alii alteam.

De bimaue. Malvaviscus, bimaue.

298. — (fol. LXXXVII). Malva ortensis (3)... crescens in ortis quasi frutex et habens magna folia.

Malva ortensis, mauve de jardin. C'est une grant mauve qui croist en jardin en maniere de arbre et a grans feuilles.

299. — (fol. XC). Mandragora... cuius due sunt species, s. masculus (4) et femina (5), et folia habet aspera.

Mandragora, c'est mandragore (mandragoire)... Il en est de deux manieres, c'est assavoir le masle et la femelle, et a la femelle les feules aspres.

300. — (fol. LXXXVI). Manna (6)... Dicunt quidam q. sit succus herbe, sed falsum est. Est autem ros qui super herbas diureticas cadit, in

(1) Il medesimo nome, nell'italiano, si riferiva alla *Malva rotundifolia* L. (Vedi Targioni-Tozzetti, *Dis. bot. ital.*), ma è da credere che alcune altre malve erano confuse sotto la stessa denominazione.

(2) *Althaea officinalis* L. ✓

(3) *Lavatera arborea* L.

(4) *Mandragora officinalis* Mill. o sp. vic.

(5) Nell'Erbario di A. Cesalpino si ha, secondo le determinazioni del prof. T. Caruel (*op. cit.* p. 75): Mandragoras mas: *Mandragora vernalis* Bert. — Mandragoras foemina: *M. microcarpa* Bert. — Mandragoras terttia: *M. officinarum* L.. Però è chiaro che nessuna di queste specie possa riferirsi alla *M. femina* del nostro testo, poichè l'autore parla di « folia aspera ». Quindi sono propenso a credere che si tratti qui del *Datura Stramonium* L., pianta che converrebbe per l'identificazione, tanto riguardo alle sue foglie con denti acuti, come a cagione delle sue proprietà venenose.

(6) Il succo di cui parla il nostro autore dovrebbe essere la manna prodotta sul *Tamarix gallica* var. *mannifera* Ehrenb. in seguito a punture di un insetto (*Coccus manniparus* Ehrenb.), e chiamata *Gas Anjabin* (miele di tamarice) dagli Arabi. Tuttavia la manna di frassino, secrezione del *Fraxinus Ornus* L., era anche nota in quel tempo, come risulta dal cap. « Fraxinus ».

quadam parte Grece et Indie, et conviscantur circa herbas. Colligitur autem sicut mel.

Manne. Aucuns dient que c'est le jus d'une herbe, mais ce n'est pas vray, car c'est une rosee qui chiet sus herbes qui ont vertu diuretique, en une partie de Grece, et par celle rousee se hert entour ces herbes, et la cuet on comme miel.

301. — (fol. LXXXIX). Margarita, lapis qui in quibusdam piscibus reperitur.

* *De marguerites.* — (G. H.). Ce sont petites pierres cleres que on treuve en aucuns poissons.

302. — (fol. XCI). Marubium (1)... alio nomine prassium dicitur.

De maroquin. Marubium, c'est une herbe que l'en appelle marrob ou marquin; l'en l'appelle autrement prassium.

303. — (fol. LXXXVIII). Mastix (2)... gummi cuiusdam fructicis similis lentisco.

Mastic. C'est la gomme d'ung arbre qui ressemble a l'arbrét que l'en appelle lentisce, et croist en une partie de Grece.

304. — (fol. XCV). Matrisilva (3) herba est que peridemon alio nomine appellatur; herba est crescens in montibus, in lapidosis et asperis locis, et habet lignum quasi arbor et serpit super terram vel super sepibus, et folia eius sub albida et quasi rotunda, et summitate facit semen .v. vel .vii. rubeo colore similio grana tinctorum, s. sunt rubiores. Crescunt autem rubiores in medio folia, cuius folia in summitate sunt rotunda et concava admodum umbelici Veneris et in medio producit semen.

Matrisilva, matrisilve. C'est une herbe appelée autrement pericomenon. Elle croist en montaignes, en lieux perreux et en lieux sauvages, et a branches comme bois, dures, et se estent sur terre et rampe sus haies, et a feules qui ont couleur traiant au blanc, et sont rondes

(1) *Marrubium vulgare* L. o sp. vic. — Nel Fuchsius, il nome francese è *marrouchin*.

(2) Diverse specie di *Pistacia* forniscono il mastice, ma di quelle che crescono in Grecia, non v'è, oltre alla *P. Lentiscus* L., che la *P. Terebinthus* L. alla quale può riferirsi il fruttice del nostro autore.

(3) *Lonicera Caprifolium* L.

matrisilva

et concaves a maniere de nombril du ventre (1), et pourte semence rouge comme graine de quoy l'en taint escarlate, et yssent ces semences dedens les feules au coupeau de l'erbe, et en pourte .v. ou .vii.

305. — (fol. XCII). Mel.

Miel est fait par l'artifice des mouches que l'en appelle es ou apes.

306. — (fol. LXXXVII). Mellilotum (2)... cuius semen simili nomine appellatur. Corona regia eciam dicitur quia formatur ad modum semi circuli.

Mellilot est une herbe qui est autrement appelée couronne royal, et aussi est sa semence appelée mellilot. Elle pourte fleur en semblance d'ung demy cercle, et pour ce l'appelle on couronne le roy.

307. — (fol. XCV). Mellissa (3) alio nomine citrina dicitur.

Melisse; l'en l'appelle autrement herbe de citre ou de citraire.

308. — (fol. XCVII). Mellongiano (4) sive petrograno herba est; in ortis oritur; qui similatur alkecangi; cuius frutex est magnus, ut pira maior, et habet colorem sub rufum, saporem amarissimum. Magis competit esui quam medicinis.

Melonges. Ce sont fruitz d'une herbe ainsi appelée qui pourte fruitz grans et gros comme poires. Et a feules qui ont couleur sur le rous, et ont saveur tres amère. Ilz vaillent plus pour mangier que pour medicine.

(1) Il traduttore lesse *ventris* invece di *Veneris*, nome probabilmente abbreviato nella copia che gli aveva sott'occhio.

(2) Il cap. omonimo dell' « Ortus Sanitatis » offre la citazione più completa di Plateario: « *Idem corona regia dicitur quia vagine seminum eius formate sunt ad modum semi circuli* ». Quindi si tratterebbe di un *Hippocrepis* nel ms. latino, mentre la disposizione dell'infiorescenza indicata nella traduzione francese si riferirebbe piuttosto a qualche *Lotus*. È da credere che la stessa appellazione « Mellilotum » abbia servito anche per il *M. officinalis* Lam. chiamato tuttora *couronne royale* in Francia, benchè non si rilevi in tale specie i caratteri menzionati nei nostri codici; ma non mi spiego la ragione che fece proporre il genere *Trigonella* per il *Mellilot* descritto in un modo analogo in altri antichi autori (Vedi E. Meyer, *Gesch. der Bot.* IV, 158).

(3) *Melissa officinalis* L.

(4) Nell'indice « De bongiano » — Abbiamo in questo capitolo la più antica notizia della coltivazione del *Solanum Melongena* L., in Europa. (Vedi Alph. de Candolle, *Origines des pl. cult.* p. 229).

309. — (fol. XCVII). De melones palestini (1) vel sarraceni... Melones duobus modis sunt, rotundi (2) q. alii popones vocant, s. et longi (3) q. alii melones vocant vulgariter.

Melons que l'en appelle poupons sont de deux manieres. Il en est de rons et de longs... Il est une autre maniere de melons que l'on appelle melons palestins... Les melons palestins que l'on appelle melons sarrasins ont moins de moiteur que les autres.

310. — (fol. LXXXVIII). Menta... cuius duplex est differencia; est enim quedam domestica (4) que precipue ortolana dicitur. Est alia silvatica que mentastrum dicitur... Est autem tercia que longior et laciore et acutiora habet folia, et hec menta romana vel sarracenica vocatur.

* *De mente. — (G. H.). Il en est de deux manieres, car il y en a une domestique qui proprement est appelee mente de jardin. Il y a autre mente sauvage qu'on appelle mentastre... Il y a une autre mente encore qui a les feuilles plus larges et l'appelle on mente romaine ou sarrazine.*

311. — (fol. LXXXIX). Menta romana (5) vel sarracenica; habet autem folio longiora, laciore et acutiora plusquam alia menta.

* *De mente romaine. — (G. H.). Elle a feuilles plus longues et plus larges, et plus agues que l'autre mente.*

312. — (fol. LXXXIX). Mentastrum (6)... alio nomine dicitur menta silvatica.

* *De mentastre. — (G. H.). On l'appelle autrement mente sauvage.*

(1) *Citrullus vulgaris* Schrader. — La specie è figurata bene nella miniatura. — Cfr. nell'Opus Pandectarum Matth. Silvatici (ediz. di 1521, fol. 81): « *Melon indus, Anguria, Batecha, Cucumer saracenicus* ».

(2) *Cucumis Melo* L.

(3) *Cucurbita maxima* Duch. (?). — Vedi A. De Candolle, *Orig. d. pl. cult.* p. 200.

(4) *Mentha rotundifolia* L. — Vedi cap. « *Consolida media* » e Cfr. la descrizione della « *common garden Mint.* » di Gerarde, nell'op. cit. di Flückiger et Hanbury, vol. II, 173.

(5) *Tanacetum Balsamita* L. — Cfr. cap. « *Herba sancte Marie* », e per il nome *sarracenica* vedi Targioni-Tozzetti, *Dis. bot. ital.*

(6) Probabilmente *Mentha silvestris* L., come nell'Erbario di Cesalpino.

313. — (fol. CX). Meu (1)... Alio nomine vocatur atamanticum, alii vocant sistra, sed alia herba est et non sistra.

Meu. Aucuns l'appellent sistra, mais sistra est une autre herbe.

314. — (fol. XCIV). Miliun (2)... Nutrit minus ceteris granis ex quibus panis fit.

Milet... Il nourrist le moins de tous grains dont l'en fait le pain.

315. — (fol. XCVI). Mille folium (3), ambroxia, ventus apium, formicularis, idem est.

Millefeul, formiculaire, c'est tout ung; l'en l'appelle ramette en aucuns lieux et l'erbe a charpentier.

316. — (fol. XCIII). Mirabolani... fructus autem arboris in India nascentis... Mirabolani species sunt .v., mirabolanorum, citrinorum (4), kebulorum (5), bellicorum (6), emblicorum (7) et indicorum.

Mirabolans... sont fruitz de arbres qui croissent en Inde... Il est .v. especes de mirabolans bons, c'est assavoir les citrins, les kebules, belle-riques, embliques et indes.

317. — (fol. XCIV). Mirra (8); est autem gummy arboris in India nascentis.

De mierre. Mirre, c'est la gomme d'ung arbre qui croist en Inde.

318. — (fol. LXXXVI). Mirtus (9)... Est autem mirtus frutex cuius fructus sunt mirtilli.

Mirte, c'est ung petit arbre ainsi appelé, lequel arbre pourte fruis que l'en appelle mirtilles.

(1) *Meum Athamanticum* Jacq.

(2) *Panicum miliaceum* L.

(3) *Achillea Millefolium* L.; *A. Ageratum* L. — Cfr. cap. « Ambroxiana ». — Rilevando nel poema « Flos Medicinae » (Coll. salern. v. I, p. 461) la parola *Ambrosia*, S. De Renzi osservava in nota: « Alcuni vogliono che sia l'*Apium graveolens* » (!).

(4) *Myrobalanus citrina* Gaert.

(5) *Terminalia Chebula* Roxb.

(6) *Terminalia Bellerica* Roxb.

(7) *Phyllanthus Emblica* L.

(8) Gomma resinosa del *Balsamodendron Myrra* Nees. e sp. vic.

(9) *Mirtus communis* L. — Il « Circa instans » stampato ha un breve capitolo che comincia con: « *Anagalidos i. semen mirte* ».

319. — (fol. XCV). Mori q. sunt domestica (1) et dicuntur siccomori... Silvestria (2) sunt fructus rubri, cum nigri sunt colliguntur.

Mora, ce sont meures. Il en est de .ii. manieres, car il y a meures domestiques... qui sont les fruis du franc meurier, et les appelle l'en mora celsi, ce sont meures du hault arbre... Il y a aussi meures sauvaiges qui sont fruis du buisson que l'en appelle ronce... L'en doit cueillir les meures quant elles sont noires.

320. — (fol. XCVI). Morsus dyaboli (3) succusa i. eadem herba que oritur locis umbrosis et humororis et maxime in castanetis; habens folia ad modum borraginis, sed non est adeo pilosa. Est enim solida et acucior, et circum intercisa, et crescens in quantitate unius brachii; florem habet purpureum.

Morsus dyaboli, c'est une herbe appelee le mors au diable, et l'appelle l'en ainsi, pour ce que sa racine est noire et est toute trenchee ainsi comme se l'en l'eust morse... L'en l'appelle autrement succuse. Elle croist en lieux umbrages et moites, et en bocaiges, et a feules semblables a feules de bourraiches, mais elles ne sont mie si pelues, et si sont plus fermes et plus agues, et ung poy detrenchies, et croist a la haulteur de une branche (4), et a fleur qui a couleur vermeille.

321. — (fol. LXXXIX). Mumia. quedam species que in sepulcris mortuorum reperitur.

Mummie est une maniere d'espace ou de confiture que l'on treuve es sepulcre des mors qui ont esté confis avec espices.

322. — (fol. XCIX). Musa (5)... fructus sunt similes citrolli q. alii pomum paradisi vocant; in ultra maris partibus crescunt, cuius folia simulantur enulla campana, sed sunt triplex.

Muses. Ce sont fruitz qui ressemblent a fruitz que l'en appelle citrules, et les appellent aucuns pommes de paradis, et croissent oultre

(1) *Morus nigra* L., nella miniatura del codice latino.

(2) *Rubus caesius* L.; *R. fruticosus* L. o sp. vic., nella miniatura del codice francese.

(3) *Scabiosa Succisa* L.

(4) Nel « Grant Herber » : *d'un bras*.

(5) *Musa paradisiaca* L. e sp. vic. — Il miniatore del codice francese rappresenta due frutti staccati, di color giallognolo, che somigliano a piccole sorbe. Nel codice latino il disegno è di pura fantasia. — Il viaggiatore Mandeville (ms. cit. fol. XIV) parla della Musa in questi

mer, et ressemblent les feules a l'erbe que l'en appelle eaune de champagne, et en est moult de manieres.

323. — (fol. XCVI). *Muscata herba* est que simili nomine appellatur quia odorem musce... Sunt enim tres maneries (1) s. maior, minor et media. Nascitur locis sablosis et in solidis, habet folia lingua unius palmi, ubi habens multa folia parva multa, admodum pinpinelle, et spargitur per terram, et habet florem parvum admodum pedum columborum, et facit semen quasi acum. *Muscata maior* sic appellatur quia habet maiorem efficaciam.

Muscata, herbe muscate ou herbe de musc; elle est ainsi appelée pour ce qu'elle a oudeur de musc, et en est de .iii. manieres, la grant, la petite et la moyenne, et toutes les trois ont semblables vertus. Ceste herbe croist en lieux sablonneux; la grande a feules longues a la longueur d'une paulme, et pourte une petite fleur semblable a l'erbe que l'en appelle pié de coulon, et pourte une semence qui a pointes comme aiguilles; elle est appelée la grande pource qu'elle a plus grans feules ou pour ce qu'elle a greigneur vertu.

Muscatale petite a moult de feules petites qui ressemblent a feules de pimpinelle.

324. — (fol. XCII). *Muscus* — *Must* (musc). √

325. — (fol. C). *Narcissus* (2)... habens folia admodum cepe et radix admodum scalonei ceparum. Nascitur lictoribus maris, locis sablosis et montibus.

De narscis. Narcisce, c'est une herbe chaude qui a feuilles a maniere d'oignon, et a la racine a maniere de escaloigne, et croit es lieux qui sont jouxte la mer, en lieux sablonneux.

termini: « En ce pays (Egitto) et autre part, l'on treuve pommes longues a vendre en la saison, et les appelon pommes de paradis, et sont douces et de bonne saveur a mangier. Et se l'on les coppes parmi en plusurs de cuers ou au lonc, ou milieu la figure de la croiz $\chi\rho\iota$ toujours trouverés. Mais elles pourrissent dedens .vii. jours, et pource ne puet l'on porter de ce fruit en lointeing pays. De telles pommes l'on treuve .vii. c. en une troche, et si ont grant fuilles de pié et demi de lonc ».

(1) I due manoscritti non concordano nell'ordine delle descrizioni, ma, malgrado la confusione dei testi, si riconosce trattarsi di specie di *Geranium* e di *Erodium*, quali *G. columbinum* L.; *E. moschatum* Lher. e sp. vic.

(2) *Narcissus* sp.?

326. — (fol. XCVII). Nasturcium (1).

Nasturcium c'est une herbe assés commune que l'on appelle cresson, mais toutesfois en y a de .ii. manieres: l'un croist en l'eau et l'autre croist es jardins (2); et quant l'en parle de cresson simplement sans fere autre addicion, l'en doit entendre de celui de jardin (3).

327. — (fol. XCVIII). Nasturcium agrestis (4). Nascitur secus vias.

Nasturcium agreste, c'est cresson sauvage. Il croist entour les chemins.

328. — (fol. XCVIII). Nenufar... herba est lata habens folia, in aquosis locis reperitur et in frigidis regionibus; cuius duplex est maneries s. nenufar purpureum (5) producens flores q. meliores sunt. Est et aliud croceos (6) facens flores qui non sunt adeo boni... Melior est qui in calidis regionibus reperitur.

De nenufar. Nenufar, c'est une herbe qui croist en eau, et a feules larges et pourte fleur a maniere de rose. Sa racine est appellee trimau (7) et est moult grosse. Il y a deux manieres de nenufar, car l'un pourte fleur sur le vermeil et est le meilleur, et l'autre pourte fleur jaune (8). L'en le treuve en toutes regions et chaudes et froides, mais celui qui croist es regions chaudes est le meilleur.

(1) *Nasturtium officinale* R. Br.

(2) *Lepidium sativum* L.

(3) Abbiamo invece nell'« Alphita » « *Nasturtium aquaticum est, et ortolanum, sed quando simpliciter ponitur ortolanum intelligitur, aquaticum vero, crisso, crissonis vel senatio, senationis* ». — Qui devo far osservare che la parola francese *alenois* (antico francese *orlenois*) mi sembra essere una corruzione di qualche tema quale *ortolanon*, *ortolanois*, piuttosto che quella di *orleanois*, come Littré ed altri lo vogliano, sotto pretesto che il *Lepidium sativum* sia frequente nei dintorni di Orléans.

(4) La miniatura porge una pianta che cresce in mezzo all'acqua di una fontana, e quindi sarebbe il *Nasturtium officinale* R. Br., del quale si parla al cap. « Senaciones ». Però può trattarsi qui di una terza *Crocifera* (*Sisymbrium* sp.?), almeno secondo il testo francese dei due capitoli « *Nasturtium*, » ove si distinguono evidentemente tre specie diverse di piante.

(5) *Nelumbium speciosum* W.

(6) *Nuphar luteum* S.

(7) Cfr. le parole *creuau*, *cruau*, rilevate, assieme a vari nomi di piante dei fossati, in documenti dei sec. XIV e XV, dal sig. De Melicoq, (*Bull. de la Soc. bot. de France*, t. IV, pag. 790).

(8) Nel « Grant Herber » v'è « *l'une est blanche l'autre est jaune* », e quindi abbiamo la *Nymphaea alba* L. invece del *Nelumbium*. Del resto l'autore anonimo dell'« Alphita », che si suppone essere stato Francese, aveva detto prima: « *Nenufar... in calidis regionibus invenitur; flos ille tam in albo, quam in violaceo et quam in citrino colore, sed apud nos tantum in albo et in citrino colore* ».

329. — (fol. C). Nespile (1).

Nespila ou nespile. Ce sont nefles que l'en appelle en aucuns pais mesles.

330. — (fol. XCIX). Nigella (2)... semen est cuiusdam herbe que in locis paludosis et inter frumenta reperitur... Est autem triangulatum, et sub nigrum, sub amarum.

Noiele (noyelle). C'est la semence d'une herbe que l'on treuve dedens les formens, en lieux caveux ou boeux... Elle est de figure de triangle, et a .iii. costes, et a couleur sus le noir et saveur amere.

331. — Nitre (3). C'est une vaine de terre que l'on treuve en moult de lieux.

332. — (fol. CXIX). Nuces (4).

Noix (nois, noiz) communes.

333. — (fol. XCVIII). Nux indica (5) in India reperitur; nux magna est.

Noix de Inde ou de indique... Elle est trouvee en Inde et est grande noix.

334. — (fol. XCVIII). Nux muscata (6)... fructus arboris est in India nascentis.

Noix muguete, c'est le fruit d'ung arbre qui croist en Inde.

(1) Frutti del *Mespilus germanica* L.

(2) Come al cap. « Git » le miniature rappresentano l'*Agrostemma Githago* L., benchè i semi triangolari del testo indichino piuttosto una *Nigella*. ✓

(3) Il capitolo corrispondente manca al nostro codice latino, ma nell'ediz. del « Circa instans » abbiamo « Nitrum. Est autem vena terre que in multis locis reperitur ».

(4) Frutti della *Juglans regia* L.

(5) *Cocos nucifera* L. — Il frutto è figurato nella miniatura evidentemente per rammentare la testa di una scimmia, in modo da dar ragione a Castore Durante che spiegò l'origine del nome di tal frutto in questi termini (*Herbario Nuovo* p. 313. Roma 1585): « Noce d'India... I Portughesi hanno posto nome a questo frutto Coquo per i tre forami o segnali che rappresentano il capo d'un gatto Mamone ». Ai nostri giorni si è voluto trarre la suddetta parola *cocos* dal greco κοῦχι, specie di palma, o da κόκκος, bacca (Vedi J. Leunis, op. cit. p. 889). Littré invece fa venire il francese *coco* dall'inglese *cocoa*.

(6) Drupa della *Myristica fragrans* Hott.

335. — (fol. XCIX). Nux sciarca (1) sive nux dinda vel melegeht... Est autem fructus qui in ultra maris partibus reperitur. Sunt enim nuces magne admodum nucium communium, que intus habent grana admodum sanguinea sive meregha, et sunt acuti saporis quasi ut piper.

Noix sciarce (siacre). C'est une maniere de noix qui croist oultre mer, et est grande comme noix commune, et a dedens elle grains rouges qui ont saveur ague comme poivre.

336. — (fol. XCIX). Nux vomica (2)... interioribus eius utimur non cortice. Virtutem habet vomitum provocandi.

Noix vomique... l'en use de ce qui est dedens et non pas de l'escorce. Elle a vertu de esmouvoir a vomir.

337. — (fol. CIV). Oleander (3) vel olisatrum, herba est cuius folia similia lauro, sed sunt longiora, et crescens quasi arbor circa flumina virtutem habet venenosam.

Oleandre ou olixantrum, c'est une herbe dont les feuilles ressemblent a laurier, mais elles sont plus longues, et croist en maniere d'arbre entour les fleuves. Elle a vertu venimeuse.

338. — (fol. CIV). Oleum — Oile (4) de olive. ✓

339. — (fol. CIV). Olibanum (5); idem est quod thus; gummi est cuiusdam arboris iuxta Alexandriam nascentis.

(1) Frutto dell' *Amomum Melegueta* Roscoe, che contiene i semi conosciuti nelle officine sotto il nome di « Grana paradisi ». Secondo alcuni, la voce *Melegeth*, fr. *maniguette*, proverrebbe da *Melega*, nome di una città di Africa, (Vedi P. Pommet, *Histoire générale des drogues*, p. 40. Paris, 1694).

(2) Dopo aver fatto osservare che nei libri dei medici arabi i passi ove si parla della noce vomica sono lungi dall'essere chiari, i sig. Flückiger e Hanbury (*op. cit.* vol. II, p. 82), aggiungono che nel *Circa instans* (ediz. di 1525), l'espressione *nux vomica* sembra dover essere riferita al seme del *Strychnos Nux vomica* L.. Tuttavia mi pare molto probabile, come già lo pensava Clusio nel sec. XVI, che si sia adoperato, nel medio evo, anche sotto lo stesso nome, il frutto della *Datura Metel* L., giacchè nell'« *Ortus Sanitatis* » vien detto al cap. « *Nux metal* »: « *est fructus similis nuci vomice... et cortex eius est asper* ».

(3) *Nerium Oleander* L. — L'autore raccomanda di non fare col legno venenoso di tale pianta degli spiedi di cucina.

(4) Il nostro testo presenta alcune varianti ortografiche per la medesima parola; così *huile*, *d'amendes* (cap. Cucurbita), *lye d'uile* (cap. Agnus Castus), ed altrove ora *uile*, ora *huile*.

(5) Resina gommosa proveniente dalla *Boswellia Carterii* Birdw. e sp. vic.

Olibane est une maniere d' encens. C' est la gome d' ung arbre qui croist iouxtle Alexandrie.

340. — (fol. CIII). Olive (1) duobus modis dividuntur; sunt enim domestice et silvestris.

Olives sont de deux manieres, car il en est de sauvaiges et de domestiques.

341. — (fol. CI). Oppium (2)... aliud est thebaicum q. ita dicitur quod ibi precipue fit vel in ultra marinis partibus nascentis; aliud tranencium quod asa fetida vel lasar, de quo dictus est (3).

Opium thebaic... est le jus de pavot. Opium tranensium, c' est ase puante... et est celui qui vient de ces pais de environ Thebes le meilleur, car l' on en fait environ une autre cité de Puile que l' en appelle Trane... et n' est pas si bon.

342. — (fol. CI). Oppoponax (4)... Est autem succus oppos, nax est herba similis ferule.

Oppoponac (oppopona). Saiches que oppos en grec vault autant a dire comme jus, et pour ce oppoponac c' est le jus de nax, et nax est une herbe ainsi appelée et ressemble a une herbe appelée ferule.

343. — (fol. CII). Ordeum (5)... Ex ordeo multa sunt que competunt usui medicine s. polenta.

Orge... Sont bons poulz ou boillie faite du grain.

344. — (fol. CI). Origanum. cuius duplex est maneries s. origanum silvestre (6) q. laciore habet folia... Aliud est domesticum (7) quod in ortis reperitur, minuta habens folia.

Origane... En est de .ii. manieres, car il en est de sauvaige qui a les feules plus larges... il en y a aussi de domestique qui croist es jardins, et le plante l' on, et a les feules plus menues.

(1) *Olea europaea* L. e var.

(2) Succo del *Papaver somniferum* L.

(3) Vedi cap. « Asa fetida ».

(4) Succo dell' *Oppoponax Chironium* K.

(5) *Hordeum vulgare* L.

(6) *Origanum vulgare* L.

(7) *Origanum Maiorana* L.

345. — (fol. CIII). Os de corde cervi... Os illud est quasi cartilago... et habet aliquantulum carnis de carne cordis.

*Os du cuer du cerf... y a aucune partie de la char du cuer
tenant a luy.*

346. — (fol. CIII). Os sepie... illud in ventre sepie reperitur.

*De os de seiche.. Os de seche... Cet os est trouvé ou ventre de
la seche.*

347. — (fol. CV). Ostriago (1) quod Punici sarramuris vocant; nascitur circa monumenta vel in parietibus.

*De obstriago. Ostriago que ceux d'Anfreque appellent saramuris;
c'est une herbe qui croist entour les tombeaux des mors ou es murs
qui sont environ.*

348. — (fol. CII). Oxifenicia (2), alio nomine dicitur finicon indi, dactili indi et tamarindi. Fructus eciam cuiusdam arboris in India nascentis qui assimilatur dactilis.

*Oxifenice que l'en appelle autrement finicon indes ou dates indes.
Ce sont tamarins et sont fruitz qui croissent en ung arbre de Inde, et
ressemblent a dates.*

349. — (fol. C). Ozimum (3), alio nomine dicitur basilicon... cuius duplex est maneries s. garioflatum et citrinum. Garioflatum est ut quidam dicunt quod habet odorem gariofli similem et minuta folia. Citrinum vero habet folia longa ad modum citri.

*Osimum, c'est une herbe assés commune que l'on appelle basilicon,
et en est .ii. manieres: l'ung est appelé basilicon girofle, l'autre basi-
licon citrin ou citron. Le girofle a oudeur de girofle et a feules menues.
Le citron a longues feules a maniere de citron.*

(1) Nel « Herbarium Apulei Platonici » (cap. XXIX) si legge: « *Herba Hortriago i. Parataria* » e quindi il suddetto nome potrebbe essere stato adoperato per la *Parietaria officinalis* L. o sp. vic. Ma l'autore del nostro codice, accennando all'abitazione africana, sembra trattare di un'altra pianta. — Cfr. la voce *Vistriago* nella Sinonimia del « Tractatus herbarum ».

(2) Frutti del *Tamarindus indica* L.

(3) *Ocimum Basilicum* L.; *O. caryophyllatum* Roxb. o sp. vic.

350. — (fol. CXIV). Palacio leporis (1) herba est simili sparago, sed habens folia longiora et morbidiora, quasi feniculo, et radix eius sicut radices brusci, et flores non producit; facit eius semen rubicundissimum, magnum et rotundum, sicut semen brusci, crescens in quantitate unius cubiti... et vocatur palacio leporis, quod leporem fugit a dyabolo persecuta, et cum esset sub hac herba secure est a dyabolo, et non potest eam tangere. Alii vocant eam artheticam.

Palacium leporis, le palais au lievre. C'est une herbe qui ressemble a sperage, mais elle a les feules plus longues et plus menues, et ressemblent a feules de fenail, et a telle racine comme brusc ou frugon (2), et ne pourte point de fleur, mais elle pourte une semence rouge comme fragon, mais elle est plus ronde. Elle croist a la haulteur d'une coutee. L'en l'appelle le palais du lievre, pour ce que quant une male beste que l'en appelle (3) chasse le lievre, et il peut trouver ceste herbe et se mettre dessous, il est a seurte et ne luy peut celle beste toucher. Aucuns l'appellent arthetique. Elle vaul contre goute arthetique.

351. — (fol. CXVI). Palleo herba (4) est cuius folia similia sunt frumento, sed sunt grossiora et albiora.

De paille. Palee c'est une herbe qui ressemble a fourment, mais elle a les feules plus grosses et plus blanches, et croist en cavernes et empres les chemins.

352. — (fol. CXV). Palma Christi (5), herba est similis satirionum, sed habens foliam signatam quasi de celestis coloris hinc illinc. Oritur locis obscuris et humidis, et proprie inter castaneta.

Palma christi. C'est une herbe qui ressemble a satirion, mais elle a feules trenchees, tachees de taches qui ont couleur de ciel sa et la. Elle croist en lieux obscurs et moites et proprement en bocaiges ou chastenés.

(1) *Asparagus tenuifolius* Lam. — La miniatura del codice latino porge la pianta con frutti rossi, quella del codice francese figura la medesima con frutti verdi. Presso gli autori italiani del cinquecento, come per es. Cesalpino, il nome di *Palacium leporis* si riferisce sempre alla suddetta specie; ma vediamo la confusione della quale abbiamo parlato al cap. « *Lactuca leporina* » manifestarsi in Germania già alla fine del secolo XV, in questo passo dell' « *Ortus Sanitatis* » (cap. 831): « *Palacium leporis herba est endivie similis nisi quod folia eius magis acuta* ».

(2) Il traduttore ha tralasciato alcune parole del testo latino.

(3) Lo spazio è rimasto in bianco nel codice.

(4) Probabilmente l' *Hordeum murinum* L.

(5) *Orehis* sp. nelle miniature.

353. — (fol. CXII). Panicum (1) in forma et natura simile est milio.

Panicum, panic. C'est ung grain qui est semblable a millet en nature et en figure, maistoutesfoiz nourrit moins que le millet.

354. — (fol. CVI). Papaver... cuius triplex est maneries est enim album (2)... et nigrum... et rubeum (3) quod alio nomine dicitur papaver silvaticum. Alii rosa fetida.

Papaver, c'est pavot... en est de .iii. manieres, car il en y a de blanc... de noir... et de rouge... autrement appelé pavot sauvage ou des champs.

355. — (fol. CXIV). Paratella (4) sive patella herba est cuius folia similatur liquiricia, sive simile listrago (5), et habet semen rubeum et rotundum ad modum ciceris. Radix eius lingua et grossa et colorem citrinum. Alii vocant eam basilica; habet enim virtutem venenosam... Nascitur in planis et locis sabulosis.

Paracelle, c'est une herbe dont les feules ressemblent a feules de l'arbre ou croist la rigolice, ou est semblable a une herbe que l'on appelle listrage, et a semence rouge et ronde a maniere de ciche. Sa racine est longue et grosse et a couleur jaune. Aucuns l'appellent herbe basilique pour ce qu'elle a vertu venimeuse... Elle croist en lieux plains et sablonneux.

356. — (fol. CIX). Paritaria (6) herba est que alio nomine vitreola dicitur, quia vitrea vasa ea optime mundantur... Alii vocant eam muralem, alii caniculare, alii herbe venti, alii morgellina... Nascitur in parietibus et in tectis et omni tempore invenitur.

Paritaire, c'est une herbe qui est autrement appelée vitreole, pour ce que l'en en lave tres bien vaisseaux de verre. L'en l'appelle aussi murale, caniculaire et herbe de vent et morgeline et herbe a verres. Elle croist en parois, en murs et en couvertures.

(1) *Setaria italica* P. B.

(2) *Papaver somniferum* L. e sp. vic.

(3) *Papaver Rhoeas* L. e sp. vic.

(4) *Abrus precatorius* L. — Il seme è chiaramente descritto nella « Practica » di Serapione (edis, cit. fol. 119) sotto il nome di *Abrong vel abrugi* (est *granum parvum punctatum nigredine et albedine rotundum sicut granum mes, i. robilie, ecc.*).

(5) *Astragalus glycyphyllos* L. probabilmente come al cap. « Liquiricia ».

(6) *Parietaria officinalis* L.

357. — (fol. CX). Passuli... dicuntur uve passe.

✓ *Passules ce sont raisins que l'en mangeue en karesme et les appelle l'en uves passes* (1).

358. — (fol. CVII). Penidii — *Penides*.

359. — (fol. CXIII). Penthapilon (2) herba est q. Greci sic vocant... Nascitur locis obscuris et sabulosis, et in pratis, et habet quinque folia in uno pendente, et habet florem croceum, et expandit super terram.

Penthaphilon. C'est une herbe que l'on appelle quinte fueille... Elle croist en lieux sablonneux et es prés; elle a .v. feuilles pendans a une queue, et pourte fleur jaune, et se espart en estant sus terre.

360. — (fol. CV). Peonia (3) — *Peoine*.

361. — (fol. CXV). Persica (4)... est enim fructus arboris cuius folia similia sunt amigdalidis, sed sunt maiores.

Peches... Elles croissent en ung arbre qui a les feules pareilles a amandiers, mais elles sont ung poy plus grandes.

362. — (fol. CXIV). Persicaria (5)... similatur folia persicci. Nascitur locis humorosis et aquosis. Alii vocant eam sanguinariam.

Persicaire, c'est une herbe qui a les feules qui ressemblent a feules de pechier; l'en l'appelle currago ou currage (curaige, curraige) (6). elle croist en lieux caveux et es mares. Aucuns l'appellent sanguinaire pour ce qu'elle fait venir (7) ou lieu ou l'en la frote.

363. — (fol. CXVI). Pes colombinus (8)... habens folia rotunda, intercisa, similis pede columbi, et fusticulos rubeos, et florem sub rufum, et

(1) Al cap. « Diptamus » abbiamo *raisins de quaresme*, espressione analoga a quella di *figues de karesme*, adoperata nel cap. « Siseleos » per designare i fichi secchi.

(2) *Potentilla reptans* L. e sp. vic.

(3) *Paeonia officinalis* Retz. — Nel medesimo capitolo si parla di una specie particolare, chiamata *peonia romana* (*peoine romaine*), ed adoperata contro l'epilessia.

(4) Frutto della *Persica vulgaris* DC.

(5) *Polygonum Hydropiper* L.

(6) Lobel (*Adversaria Nova*, p. 134), il quale scriveva *culraige* come altri scrittori del secolo XVI, diede di quel nome una singolare etimologia facile ad indovinare dall'ortografia che egli conseguiva, e dalla proprietà irritante attribuita a questo *Polygonum*.

(7) Aggiungere *le sang*, parole omesse dal copista.

(8) *Geranium columbinum* L. — Cfr. cap. « Muscata ».

expanditur super terram. Nascitur in ciliaria et locis sablosis, et lapidosis mense madio vel iunio.

Pes columbinus, pié de coulon, c'est une herbe qui autrement est appelée flectio. Elle a feules rondes, entrecoupees, et ressemble au pié d'ung colon, et a les branches, ou les feules tiennent, rouges, et a fleur qui a couleur sus le roux. Elle se espart et estent sus terre et croist en roiches et en lieux sablonneux et pierreux.

364. — (fol. CXVI). Pes leporinus (1) herba est cuius folia simulantur cicoree, et habet florem croceum similem lactuce leporine sive herbe calendule, et radix eius alba, et multi testiculi ad modum anfidilli, sed sunt parvi ut testiculi leporis.

* *De pié de lievre.*

365. — (fol. CVIII). Petroleum (2)... dicitur oleum petre... Eligendum est q. album vel citrinum et clarissime substancie, et quod est fetidissimum.

Petroleum ou oile de pierre... Le petroleon doit estre choisi qui a couleur blanche ou jaune, et qui est de clere substance, et qui a odeur puante.

366. — (fol. CVII). Petroselinum (3)... Est autem duplex s. domesticum et silvestre (4) quod synomum dicitur.

(1) Può darsi che i medici di Salerno intendessero sotto questo nome la *Crepis bulbosa* Cass.; ma nel nord dell'Italia ed in Francia, contrade ove non cresce tal pianta, la descrizione data nel testo del « Circa Instans » conduceva certamente a prendere invece la *Ficaria ranunculoides* Mch., specie nella quale i bulbi della radice somigliano a quei della suddetta *Crepis*. In altre opere coetanee, come l'« Ortus Sanitatis » (cap. 205), trovasi l'espressione *pes leporis*, adoperata per designare il *Geum urbanum* L.

(2) Riguardo alle virtù allora attribuite al petrolio, chiamato anche *oglio di sasso*, *oglio santo* ed *oglio benedetto*, si può consultare il curioso manoscritto « *De oleo montis Zibinii seu petroleo agri Mutinensis* », scritto nel 1460 da Francesco Ariosto e tuttora conservato nella R. Biblioteca Estense (num. 104, XVI, HH. 23). — Vantato di nuovo nel sec. XVI, da Brasavola, Mattioli, Cesalpino e da altri, il petrolio dei colli di Sassuolo perdette poi alquanto dell'antica sua rinomanza, come si rileva da una lettera scritta, nel 1698, dal celebre medico Bernardino Ramazzini all'abate Felice Viale, professore nell'Università di Padova. Tuttavia lo vediamo ancora menzionato in questo passo della « *Pharmacopoea Helvetica* », pubblicata sotto gli auspici di Alberto di Haller, a Basilea nel 1771, (pag. 132): « *In Agro Mutinensi, circa castellum montis Baransonis, putei effodiuntur, qui in collis parte superiore suppeditant Petroleum album, sed parca copia, in infima parte oleum rufum uberrimum. In eodem Agro Mutinensi prope montem Gibbeum seu Cibinum perpetuus fons scaturit, cui oleum flavum innatat* ».

(3) *Petroselinum sativum* L.

(4) Vedi cap. « *Sinomum* ».

Persil. Il en est de deux manieres, c'est assavoir domestique et sauvage; le sauvage est appellé sinomum.

367. — (fol. CVI). Peucedanum (1) herba est que alio nomine feniclus porcinus dicitur.

Peucedanum, c'est une herbe que l'en appelle fenoil a pourceaux.

368. — (fol. CXV). Pilosella (2) herba est que oritur ad pedem moncium; habet folia lingua unius digiti ad plus vel minus, et habet pilos longos unde dicitur pilosella; extenditur super terram.

Pilloselle ou pelluete, c'est une herbe qui croist au pié des montaignes et a feules moins longues d'ung doy, a peulz en ses feules assés loncs pour lesquelx l'en l'appelle pelluete ou pilloselle, et se estant sus terre.

369. — (fol. CXIV). Pimpinella (3)... Nascitur locis sablosis et ad pedem moncium.

Pimpenelle (pipernelle, pinpernelle) est une herbe qui croist en lieux sablonneux au pié des montaignes.

370. — (fol. CVII). Pinea (4) que alio nomine dicitur strobilia.

Pins ou pignons. Ce sont les noyaux (5) qui sont dedens la pomme V de pin.

371. — (fol. CV). Piper cuius triplex (6) est maneries, piper longum quod macro piper dicitur, et album quod leuco piper dicitur. Est et nigrum quod melanum piper dicitur.

Poivre... Il en est .iii. manieres, car il y a poivre lonc qui est appellé macropiper, et si y a poivre blanc qui est appellé leucopiper; et si a poivre noir qui est appellé melanopiper... Quant il pourte fleur

(1) *Peucedanum officinale* L.

(2) *Hieracium* sp.

(3) Nelle miniature, *Poterium Sanguisorba* L. o *Sanguisorba officinalis* L. Però un'osservazione sulla *Pimpinella* fatta al cap. « Sorbastrella » mi porta a pensare che l'autore intendesse parlare nel presente capitolo della *Trinia vulgaris* DC. o della *Pimpinella Sazifraga* L.

(4) Frutti di *Pinus Pinea* L. — Nel margine del ms. latino abbiamo: « *Tapinum id. pinea* ».

(5) Al cap. « Baucia » i pignuoli vengono chiamati *grains de pins*, e semplicemente *pins* al cap. « Pistacee.

(6) *Piper longum* Rumph. e *Piper nigrum* L. con varietà relative.

cette fleur s'assemble en ung troquelet, et devient longue ainsi que fait la fleur de coudre (1), et cella est le poivre long.

372. — (fol. CIX). Pira (2)... alia sunt domestica... alia silvestria.

De pooires. Poires... il en est de .ii. manieres de domestiques et de sauvaiges.

373. — (fol. CV). Piretrum (3)... herba est satis communis.

Piretre, c'est une herbe assés commune.

374. — (fol. CXI). Pistace (4) que alii fistici vocant.

Pistacee que l'en appelle autrement festuces ou festus (5), sont fruis qui croissent oultre mer et ressemblent a pins.

*Pistacho
d'Occid.*

375. — (fol. CXI). Pix navalis, alia liquida que picula dicitur.

Poix (6)... Il y a poys navale et poix liquide ou clere appellee picula (picule, poy roisine).

376. — (fol. CXII). Plantago (7)... Galli vocant tarpidolopium... Romani plantago maior... alii quinquenervia. Nascitur locis aquosis et in planis.

Plantain est une herbe que les Grecs appellent arnoglosse. L'en l'appelle aussi quinquenervia et grant plantain; elle croist en lieux caveux et en plains champs.

377. — (fol. CXII). Plantago (8) minor q. alio nomine dicitur lanciola.

Plantain petit qui est autrement appellee lancelee.

378. — (fol. CXI). Plumbum — *Plonc.*

(1) Infiorescenza del *Corylus Avellana* L. chiamata *fleurs de avellainier* al cap. « Avellane ».

(2) *Pyrus communis* L., e varietà selvatica.

(3) *Anacyclus officinarum* Hayne; *A. Fyrethrum* DC. e sp. vic.

(4) Frutti di *Pistacia vera* L. ↓

(5) Nell' « Ortus Sanitatis » cap. 355, abbiamo: « *Pistacea, arab. Pistach sive Fustech* » e questa forma ultima ci conduce alla vera etimologia del nome francese di un'altra terebintacea, *fustet* (*Rhus Cotinus* L.), parola che Littré fa erroneamente derivare da *fust* (fusto). Cfr. nella « Practica » di J. Serapione (ediz. cit. fol. 117): « *Dalb i. fustet i. scotatum* ».

(6) Poce proveniente da varie conifere, dei generi *Abies*, *Pinus*, ecc.

(7) *Plantago maior* L.

(8) *Plantago lanceolata* L. o sp. vic.

379. — (fol. CVII). Policaria (1)... triplex est maneries s. maior et minor et media.

Pollicaire. C' est une herbe dont il est .iii. manieres, la grande, la petite et la moienne.

380. — (fol. CXI). Pollii diversa sunt genera sed precipue montanum competit usui medicine.

Polium (2)... Il en est diverses manieres, mais le meilleur est celui qui est appelle polium (3) montanum.

381. — (fol. CVIII). Polipodium (4) herba est similis flici que super quercus, lapides et muros crescit.

Polipode. C' est une herbe qui est assés semblable a fougere et croist sus murs, sus pierres et sus chesnes.

382. — (fol. CXIII). Polligonia (5)... alii corrigiola, alii lingua passerina. Nascitur locis cultis et in pratis et secus vias.

Poligonia, c' est une herbe que l' en appelle langue de passeret (6). Aucuns l'appellent corrigiole. C' est celle petite herbe qui croist es chemins, qui a tant de neux.

383. — (fol. CXIII). Pollitricum (7)... alii vocant eam adiantos, alii trigomanens, alii supercilium terre.

Politric. Aucuns l'appellent adiantos, les autres le sourcil de la terre.

384. — (fol. CX). Pomum citrinum (8)... Interior autem substantia s. acetosa competent usui medicine; comestum cum carnibus vel piscibus appetitum confortat.

(1) *Pulicaria vulgaris* Gaertn.; *P. dysenterica* Gaertn. e sp. vic.

(2) *Teucrium* sp.

(3) *Teucrium Polium* L.

(4) *Polypodium vulgare* L.

(5) *Polygonum aviculare* L.

(6) Al cap. « Camomilla » abbiamo « une herbe que l'on appelle poligonia ou langue de moisson ou cent nous ».

(7) Le miniature dei due codici figurano l' *Asplenium Trichomanes* L.

(8) *Citrus Limonum* Risso. — All' articolo « Balsamus » si legge: « Alii accipiunt succum meloncelli vel foliorum citri ». — « Les autres preignent le jus de l' arbre des limons et est le jus de fueilles de citron ». D'altra parte vien fatta menzione del *Citrus vulgaris* Risso, al

Pome citrine... La substance de dedens qui est aigre ou surre vaut pour medicine, car quant elle est mangée avec char ou poisson elle fait avoir bon appetit.

385. — (fol. CXVI). Porrus (1).

Porreau (poreau, poriaux)... le porreau sauvage.

386. — (fol. CIX). Portulaca (2) herba est satis communis que alio dicitur... porcastrum.

Pourcelaine (3) c'est une herbe assés commune.

387. — (fol. CXIV). Primile veris (4)... alio nomine dicitur herba sancti Petri... quidam vocant paralisia. Dicitur enim primile veris quia in tempore prime veris producit florem. Nascuntur locis solidis et humorosis et in pratis.

Primula veris; l'en l'appelle primerolle. Aucuns l'appellent l'erbe saint Pierre, aucuns l'erbe a paralisie, et est appelée primerole ou primule de ver ou de printemps pource qu'elle pourte la premiere fleur en printemps. Elle croist en bois et en prés.

388. — (fol. CXV). Provinca (5) herba est satis communis de qua mulieres faciunt coronas.

Provinca, pervence. C'est une herbe assés commune dont l'en fait chapeaux (6).

389. — (fol. CVII). Pruna (7). alia sunt alba, alia nigra et alia rubea. que nigra sunt et aliquantulum dura, magis valent, et precipue damascena.

Prunes. Il en est de deux manieres, c'est assavoir de noires et de rouges. Celles qui sont aucunement dures sont les meilleures, et entre

cap. « Alcanna » nel quale, dopo aver dato la ricetta di una tintura per i capelli, le unghie, ecc. l'autore dice: « vix postea recedit tinctura nisi cum succo pomarum adrange » — « a peine se depart apres celle tainture se ce n'est par le jus de pomme d'orange ».

(1) *Allium Porrum* L.

(2) *Portulaca oleracea* L.

(3) Al cap. « Agnus castus » si ha il sinonimo *pourpié*.

(4) *Primula officinalis* Jq. e sp. vic. — Le miniature rappresentano la pianta con fiori gialli.

(5) *Vinca minor* L. o sp. vic.

(6) Cfr. cap. « Calendula », in nota.

(7) *Prunus domestica* L. e varietà.

elles encore vaillent mieulx celles que l'en appellent prunes de Damas ou damascenes.

390. — (fol. CVIII). Psillium (1)... herba est cuius semen eciam sic vocatur.

Psillium... c'est une herbe dont la semence est appelé psillium.

391. — (fol. CIX). Pulegium... Sunt enim due species pulegii s. masculus (2) et femina (3). Habet autem masculus florem album, femina vero purpureum et rubicundum. Que est efficacius et dicitur pulegium cervinum.

Poulieul (4)... Il en est .ii. especes de poulieul c'est assavoir le masle et la femelle. Le masle a fleur blanche et la femelle rouge, et est le meilleur et qui a greigneur vertu et l'appelle l'en poulieul cervin.

392. — (fol. CXIV). Pulmonaria (5) herba est similis borrago, sed est laciore et longior et morbidior, et habet quedam albam hinc et illinc, sicut pulmo, quia dicitur pulmonaria vel quia precipue valet contra vicium pulmonis.

Pulmonaire, c'est une herbe qui a feules qui ressemblent a bourraiches, mais elles sont plus lees et plus longue et de plus fade couleur, et ont unes places blanches puis ça, puis là, a maniere de poulmon, et pour ce l'appelle l'en pulmonaire, et aussi pour ce qu'elle vaut principalement contre les maladies du poumon.

393. — (fol. CXXI). Rabiosa (6) herba est q. alio nomine dicitur porraria. Alii vocant fagiolaria. Nascitur in ortis sive in campis et maxime inter porros.

Rabieuse qui est autrement appelée porraire ou fagiolane. Elle croist es jardins et es champs, et volontiers croist entre porreaux.

(1) *Plantago Psyllium* L.

(2) *Mentha Pulegium* L.

(3) *Preslia cervina* Fres.

(4) Al cap. « Ceretolium » si ha il sinonimo *poliet*.

(5) *Pulmonaria officinalis* L. — Nel « Grant Herbier » l'incisione relativa a questo capitolo rappresenta la *Lobaria pulmonaria* DC.

(6) *Heliotropium europaeum* L.

394. — (fol. CXVIII). Radix (1)... herba est cuius radix simili nomine appellatur; que cum in Passionario invenitur similiter debet poni radix rafani.

Radix c' est rais... et est sa racine appelee radix et quand l' en treuve ou livre appellé Passonaire que l' en mette radix, l' en doit mettre la racine de rafle.

395. — (fol. CXVIII). Rafanus (2) — *Rafane ou rafle.*

396. — (fol. CXXI). Rapistrum (3)... alio nomine dicitur rappa agrestis, quia folia ejus et semen similatur rappa, sed non radix.

Rapistre... Elle est autrement appelee rave sauvage pour ce qu' elle a feuilles semblables a rave, et aussi semence, mais sa racine ne lui ressemble pas.

397. — (fol. CXXI). Rappa (4)... multum plus ceterum herbis nutrit... Nappis (5) occurrit venenis si eius semen detur.

Rave... elle nourrist plus habundamment que nulle autre racine... Le navet vault contre venin se l' en donne sa semence.

398. — (fol. CXVIII). Reubarbarum (6)... quod sic dicitur quasi in barbara nacione reperitur, ut in India et ultra marinas partes. Aliud ponticum, eo q. in Pontho insula reperitur, vel quia ponticum habet saporem.

Reubarbe... Il est .ii. manieres de reu; l' ung est appellé reubarbarum... et croist en Inde et est appellé reubarbe. L' autre reu est reuponticum... et est appellé reupontic.

399. — (fol. CXXI). Risus (7), quidam semen est simile frumento, et sic crescit, et producit spicam ut frumentum, unde a multis dicitur frumentum risum.

(1) *Raphanus sativus* L.

(2) *Cochlearia Armoracia* L. (?)

(3) *Rapistrum* sp. o *Brassica* sp.

(4) *Brassica Rapa* K.

(5) *Brassica Napus* L.

(6) *Rheum officinale* Baillon. — Nel manoscritto latino vi sono due articoli separati per « Reubarbarum » e « Reuponticum ». — Si è supposto, non senza ragione, che i due antichi nomi di questa droga derivavano dalle due strade prese per importarla dalla China in Europa (Vedi Flückiger et Hanbury, op. cit. II, 197).

(7) *Oryza sativa* L. — La pianta è abbastanza bene figurata nel codice latino, ma nell' altro il disegno è di mera fantasia.

Ris... c' est ung grain qui ressemble assés a fourment quant il est cueilli.

400. — *Robellie* (1), *ce sont unes semences... ne causent point ventosité comme les feves, et sont bonnes pour mangier en esté et en chaude region.*

401. — (fol. CXXI). *Rodalda* (2)... *habens folia similia raphano et eiusdem saporis, sed sunt albidiora et radix parvior. Nascitur locis solidis et in campis.*

Rodalde est une herbe qui ressemble a rafle ou rafane quant aux feules, et aussi a elle semblable saveur, mais ses feules traient ung poy plus sus le blanc et si a mendre racine. Elle est chaude et seche, et croist es champs et en lieux fermes non caveux.

402. — (fol. CXVII). *Rosa* (3)... *debent desiccari ad solem articulum et possunt servari per triennium.*

Rose (rouse)... l'en les doit sechier au soleil aucunement (4), et puis l'en les peut garder par .iii. ans.

403. — (fol. CXX). *Ros marinus* (5)... *Flos autem dicitur anthos... In locis marinis crescit, unde ros marinus dicitur.*

Romarin... C'est une herbe qui croist a maniere d'ung arbre... La fleur de romarin est appelée anthos... Aucuns l'appellent libantis... autres alain. Elle croist volontier en lieux comme rousee jouxte la mer, et pour ce l'appellent l'en ros marinus, comme rousee de mer.

404. — (fol. CXIX). *Rubea herba* (6) *est que maiora habet folia, et est maior virtutis. Alia est minor (7) que minora habet folia et minoris virtutis.*

(1) Queste *Robellie*, probabilmente identiche alle *chiches rouges* menzionate al cap. « *Acorus* », dovrebbero essere i semi del *Lathyrus Cicera* L. Nel nord la pianta non era bene conosciuta, giacchè l'autore dell' « *Ortus Sanitatis* » (cap. 394) dice: « *Robelie quae a nonnullis medicorum nostrorum estimantur esse pisa* ». Quel capitolo del nostro codice francese manca al codice latino, ma esso si ritrova in quello di Breslavia sotto il titolo di « *Robelli* » (Vedi Janus, *loc. cit.* p. 67).

(2) *Roripa* sp. (?).

(3) *Rosa* sp. — Cfr. i cap. « *Bedegard* » e « *Berberis* ».

(4) Probabilmente v'era l'abbreviazione di *aliquantulum* nella copia del ms. lat. che servi per eseguire la traduzione francese.

(5) *Rosmarinus officinalis* L. ✓

(6) *Rubia tinctorum* L.; e *R. Peregrina* L.

(7) *Galium Aparine* L.

Rubea... Il y a rubea la greigneur et rubea la mendre. Rubea la greigneur a greigneur feules et si est de greigneur vertu, et est l'erbe dont l'en fait la garence de la racine, et pour ce l'appellent l'en rubea a tainturiers. La maindre (1) a maindres feules, et aussi maindre vertu, et est aspre et ressemble a petite consoude, fors que la consoude n'est point aspre.

405. — (fol. CXIX). Rubus (2).

Rubus que l'on appelle ronce (3).

406. — (fol. CXIX). Rutha. Duplex est manieres s. domestica (4) et silvestris (5) que piganum dicitur.

Rue... est de deux manieres, c'est assavoir la domestique et la sauvaige qui est appelée piganum.

Rue sauvaige que l'on appelle piganum croist en lieux perreux et aspres.

407. — (fol. CXXVII). Sal armoniacum... armoniacum dicitur quia in Armenia reperitur, quod dicunt ex herba fieri (6).

Sal armoniac.

(1) Cfr. cap. « Spargula ».

(2) *Rubus* sp. — Cfr. cap. « Mori ».

(3) Siccome Diez, l'illustre romanista, aveva tratto *ronce* da *rumicem*, senza l'appoggio di documenti, Littré, nel suo Dizionario, emise un'altra ipotesi, cioè la derivazione da *runcare*, dicendo che il senso di *rumex* non era del tutto soddisfacente. Eppure l'etimologia del filologo tedesco era la vera. Infatti già nel Marcellus Empiricus leggesi al cap. XVI: « *Radices rumicis minutae eiusque per campum se sternit et mora fert parvula* », passo ove si tratta evidentemente di un *Rubus*. Tuttavia, avendo il Meyer (*Gesch. der Bot.* vol. II, p. 305) proposto di correggere in questa citazione *rumicis* con *rubi*, riferisco per il significato un altro esempio concludente, tolto dal noto glossario « Alphita » (*Coll. Sal.*, vol. III, p. 311): « *Rumex, huius duo sunt genera, scilicet ferens mora, et sterilis; quando simpliciter ponitur, ferens mora vel batus intelligitur* ». Con ciò è chiaro che *ronce* proviene da *rumicem*, come *ponce* (pomice) da *pumicem*; *pouce* (pollice) da *pollicem*, ecc.

(4) *Ruta graveolens* L.

(5) *R. angustifolia* Pers o *Thalictrum flavum* L.; *T. angustifolium* L. e sp. vic. — Quest'ultimo genere conserva tuttora in francese i nomi di *pigamon*, *rue des bois*, ecc. (Vedi Gillet et Magne, *Flore fr.* p. 12). Secondo il Littré, l'etimologia di *pigamon* sarebbe sconosciuta, ma il suddetto sinonimo *ruta silvestris* ci prova che quella parola proviene semplicemente, come l'italiano *pigamo*, da una corruzione del greco *πήγμων*, *ruta*.

(6) Cfr. cap. « Armoniacum ».

408. — (fol. CXXVII). Sal communis (1).

409. — (fol. CXXVII). Sal gemma... vena terre est; dicitur sal gemma q. adeo clara est ut gemma.

Sel gemme.

410. — (fol. CXXIX). Salix (2) — *Saulx c'est ung arbre commun.*

411. — (fol. CXXVIII). Salvia... alia est domestica (3), alia silvestris (4).
 √ *Sauge... Il en est de .ii. manieres, de domestique commune et de sauvaige que l'on appelle eupatore.*

412. — * De salvinca (5).

Saliunca (saliunce, salvince), c'est une herbe que aucuns dient estre spic celtique, mais ce n'est pas vray... Elle croist au pied d'ung arbre et pourte petis peles ou espis qui sont roux en couleur, et ont saveur amere; et dit Dioscorides que quant l'en l'esrache de terre, elle se assemble en ung troquelet.

413. — (fol. CXXXII). Sambacus (6) i. q. gessominum; herba est cuius flores valde sunt orot' odore suavis odorati. √

Sambacus, c'est une herbe qui est autrement appelee gessomum, et est une herbe dont les fleurs ont tres bonne odeur.

414. — (fol. CXXIX). Sambucus (7) — *Seu et artis, c'est tout ung.*

415. — (fol. CXXXI). Sandalis (8)... alii albi, alii citrini, alii rubei.

De sandres. Sandales sont bois que l'en appelle sedres. Il en est de .iii. manieres, car il en est de rouges, de blancs, et de citrins ou jaunes... entre les sandres, le citrin flaire le plus souef.

(1) Manca al codice francese, ma non nel « Grant Herbier ».

(2) *Salix* sp.

(3) *Salvia officinalis* L.

(4) Cfr. cap. « Eupatorium ».

(5) Dalla descrizione del cod. franc. certamente la *Sanicula europaea* L. — Cfr. cap. « Spica ».

(6) *Jasminum Sambac* Wahl. o sp. vic.

(7) *Sambucus nigra* L.

(8) *Santalum* sp.

416. — (fol. CXXXI). Sanguinaria (1) idem quod galligrus; quidam dicunt pes anseris. Est enim alia ad sanguinem provocandum, alia ad sistendum.

Sanguinaire. Il en est de .ii. manieres, l'une est appelée sanguinaire pour ce qu'elle fait saignier et l'autre pour ce qu'elle estanche le sanc. De la premiere parlons cy endroit, et l'appelle l'en autrement galligrus ou pié de oison, pour ce que sa semence se espart et fourche comme le pié d'ung oison... L'autre sanguinaire qui estanche le sang est autrement appelée bourse a pastour.

fusti sanguine

417. — (fol. CXXIV). Sanguis draconis (2)... Dicunt quidam quod est succus herbe quod falsum est. Est autem gummi arboris in Persia et in India nascentis. Sanguis draconis dicitur quod similis est.

Sanc de dragon... Aucuns dient que c'est le jus d'une herbe, mais ce n'est pas vray, car c'est la gomme d'ung arbre qui croist en Inde et en Perse et l'appelle l'en sanc de dragon pour ce qu'elle ressemble a sanc de dragon.

418. — (fol. CXXVI). Sapo. Alius est sarracenicus vel spatarentus sive iudaicus q. Judei sericum lavant, alius gallicus.

De savon. — (G. H.) Savon. Il en est de trois manieres. L'un est appelé savon a Sarrazins. L'autre est appelé savon a juifz ou spatarent, pour ce que les juifz s'en lavent. L'autre est savon galique ou francois.

419. — *Saponaria* (3), *burit*, *herba fullonum*, *herbe saint Phelippe*, c'est tout ung, et aussi a elle plusieurs noms; l'en l'appelle savonnaire, et herbe a foulon, et burit. Ce livre n'en dit point les vertus (4).

(1) *Digitaria sanguinalis* Scop. — Cfr. nel Mattioli (ediz. di 1604, p. 1053): « Quella (gramigna) che produce nella sommità de i fusti quelle cinque dita, che si mettono nel naso a provocare il sangue, la quale chiamiamo noi in Toscana *Sanguinella* et altri la chiamano Capriola ». Le miniature dei nostri codici rispondono a questa descrizione. La seconda sanguinaria del nostro testo è la *Capsella Bursa pastoris* L.

(2) Succo di *Dracaena Draco* L. o resina del *Calamus Draco* Wild. ✓

(3) *Saponaria officinalis* L. — Cfr. nell' « Alphita »: « *Borith, herba saponaria, inde herba fullonis, sed carduus est aliud* ».

(4) Questo capitolo manca totalmente nel codice latino.

V. fusti sanguine

420. — (fol. CXXV). Sarcocolla (1)... gummi arboris est, in ultra maris partibus reperitur.

Sarcocole (sarcocolle)... c'est la gomme d'un arbre qui croist oultre mer.

421. — (fol. CXXV). Satirion (2), herba est que alio nomine dicitur priapiscus... alii serapias, alii orcis, alii testiculi leporis. Nascitur in montibus et in planis.

Satirion est une herbe qui est autrement appelée... serapias, et orcis, et testiculus leporis, et veme, et viam (3).

422. — (fol. CXXI). Saturegia (4).

De serriete. Satureia, c'est sarriete, une herbe assés commune, et a bonne oudeur.

423. — (fol. CXXVII). Savina (5) arbor parvus est... alii herba sabina.

De savinier. — (G. H.) Savine c'est savinier... On l'appelle autrement herbe sabine.

424. — (fol. CXXVII). Saxifraga (6)... sic dicitur quia saxum frangit.

De saxifrage (saxifraige). — (G. H.) Saxifrage est ainsi appelée pour ce qu'elle froisse la pierre. On l'appelle autrement... asperon.

425. — (fol. CXXVIII). Scabiosa (7). Quidam vocant eam gallinaciam. Sunt enim due species, sed illa que magis est pilosa et invenitur locis asperis et montuosis, illa habet maiorem efficaciam.

Scabieuse... Aucuns l'appellent gallinaire, et en est de .ii. manieres, mais celle qui est la plus pelue et qui croist en lieux secs et aspres, et en montaignes, c'est celle qui a plus grant vertu.

(1) Estratto della *Poene mucronata* L.

(2) Nome delle specie di *Orchis* con tubercoli interi, quali *O. Morio* L., *O. Simia* Lam. ecc.

(3) Il « Grant Herbier » dà *varam*. — Nell'Erbario apocrifo di Apuleio (cap. XVI) abbiamo « Herba satirion: Galli *Vra* »; e nell'opera « *Florum et coronarium... historia* » di R. Dodonaeus (ediz. di 1568, p. 214), la forma *vram* vien data anche come sinonimo di *satirion*.

(4) *Satureia hortensis* L.

(5) *Juniperus Sabina* L.

(6) Probabilmente *Saxifraga granulata* L., o *S. tridactylites* L.

(7) *Scabiosa Columbaria* L.; *Scabiosa collina* Req. o sp. vic.

426. — (fol. CXXXII). Scalognium (1) est ex natura quasi cepe.

De escalongne. Scalognium, c'est escalogne. Elle est de telle nature comme l'oignon.

427. — (fol. CXXXI). Scolopendria (2)... herba est q. Greci vocant splenion... quidam vocant herba panaia; habens folia longa unius cubiti, et stricta, signata signis rubeis. Nascitur locis aquosis et in foveis obscuris.

Scolopendre, c'est une herbe assés commune qui est appelée cerlangue. Les Grecs l'appellent splenidion... autres herbe panaie. Elle a une feule longues et estroite et merchees au dessoubz de raies rouges et croist volentiers en puis et en fossés.

428. — (fol. CXXXVI). Scordeon (3) i. allium agreste.

* *De Scordeon. — (G. H.). Scordeon: c'est ail sauvage.*

429. — *Scrofularia* (4), *scrofulaire*, c'est une herbe qui croist en lieux fermes et par especial lés, et vient en temps d'esté et de ver ou printemps, et se espart et estant sus terre.

430. — (fol. CXXXIII). Sebesten (5)... fructus sunt cuiusdam arboris quasi pruna que in ultra... maris nascuntur.

Sebesten. Ce sont fruis d'ung arbre qui croist es parties d'outremer et ressemblent assés a prunes.

431. — (fol. CXXXII). Seccacul (6) yringi, calcatrippa, cardanelli idem est.

Secacul, c'est une maniere de chardon qui a la feule large, que l'on appelle yringe Il en est dit devant.

432. — (fol. CXXXIII). Semperviva (7) herba est que sic dicitur quia semper viridis reperitur... Nascitur supra domus.

(1) *Allium Ascalonicum* L.

(2) *Scolopendrium officinale* Sm.

(3) *Allium* sp.

(4) *Scrofularia* sp. — L'articolo corrispondente manca al codice latino.

(5) Frutti della *Cordia Myxa* L.

(6) *Centaurea Calcitrapa* L.

(7) *Sempervivum tectorum* L.

Semperviva, toujours vive. C'est une herbe qui est autrement appelée joubarbe, et l'appelle l'on toujours vive pource qu'elle est toujours verte. Elle croist sur les maisons.

433. — (fol. CXXVIII). Senaciones (1)... idem est quot nasturcium aquaticum; alii vocant crescionum.

Senacions, c'est cresson, et saches que quant l'en treuve en recepte que l'en prengne senacions en plurier nombre, c'est a dire cresson, et, quant treuve senesson en singulier, c'est une autre herbe dont il sera dit apres. Et saiches aussi qu'il est .ii. manieres de cresson, c'est celui de jardin et celui de eaue, et se appellent tous .ii. nasturcium.

434. — (fol. CXXX). Sene (2) herba est que in transmaris partibus prescens, et maxime circa Babiloniam et Arabiam.

Sené est une herbe... qui croist es parties d'oultremer, et en especial vers Babiloine et Arabie.

435. — *Senechon* (3) est une herbe que aucuns appellent selechion; l'en l'appelle aussi le chardon benoit. Elle croist sus murs et les couvertures des maisons.

436. — (fol. CXXIII). Serapinum (4)... gummi est cuiusdam arboris in ultra maris partibus nascentis et in Grecia.

Serapin, c'est la gomme d'un arbre qui croist oultremer et aussi en Grece.

437. — (fol. CXXIX). Serpentaria (5), colubraria et dracuntea, idem est.

Serpentine est autrement appelée colubrine pour ce que sa tige a couleur de couleuvre, et si l'appelle l'en draguntee.

(1) *Nasturtium officinale* R. Br. — Cfr. cap. « *Nasturtium* ».

(2) *Cassia acutifolia* Delille; *C. angustifolia* Vahl. e forse già era conosciuta la *C. obovata* Coll., la quale sappiamo essere stata coltivata in Italia nel cinquecento. (Vedi A. Targioni-Tozzetti, *Cenni storici sulla introduzione di varie piante, nell'agricoltura ed orticoltura toscana*, p. 127. Firenze, 1853).

(3) *Senecio vulgaris* L.

(4) L'origine di questa sostanza non è ancora ben determinata, tuttavia alcuni ritengono che vien prodotta da qualche *Ferula*, (Vedi E. Le Maout et J. Decaisne, *op. cit.*, p. 263).

(5) *Arum Dracunculus* L.

438. — (fol. CXXXI). Serpillum (1)... idem dicitur erpetum, ab erpeto, q. super terram serpit... Est enim serpillum aliud domesticum, aliud silvestre. Domesticum ramos super terram diffundit; silvestrum crescens in longum et altum.

Serpillum, c'est une herbe que l'en appelle ainsi, pource qu'elle rampe et se espart moult contre terre... Elle ressemble a origanum en feuilles et en branches, mais les feuilles en sont plus blanches et a oudeur assés semblable a mariolaine. Il en est de deux manieres, l'ung domestique, l'autre sauvaige. Le domestique espart ses branches sus terre et le sauvaige les estent en hault et en lonc.

439. — (fol. CXXXII). Sicla (2) q. vulgus blitum appellat.

Sicla, c'est une herbe que le peuple commun appelle blitin

440. — (fol. CXXXIII). Sigillum sancte Marie (3) sive sigillum Salomonis idem herba est. Nascitur locis obscuris et in Silvis. Habet folia persicamine et flores parvos et albos, et producit semen rubee coloris, ordinate unum ante alium sicut pomiculi; radix eius alba et nodosa similis brusco.

Sigillum sancte Marie ou sigillum Salomonis, c'est une mesme herbe que l'en appelle le seau Salemon ou le seau Nostre Dame. Elle croist en lieux obscurs et en forez, et a telles feuilles comme l'erbe appelée persicaire on curraige, et a petites fleurs blanches, et si pourte semences rouges arrengiés .ii. et .ii. l'une contre l'autre ordoneement, et a racine blanche noueuse qui ressemble a racine de brusc ou fragon.

441. — (fol. CXXXII). Silfu (4) herba est que alio nomine dicitur fu agrestis. Alii vocant martagon quia similis est valeriana; similatur eciam ypericon, sed non habens folia perforata, habens enim folia intercisa et crispa, et flores habens citrinos, et multos quasi in colore sulphuris et odorem feculentem. Nascitur secus foveis.

(1) Secondo il codice latino, dovrebbe trattarsi qui, come al cap. « Herpillus », del *Thymus vulgaris* L. e del *T. Serpyllum* L. Però nella descrizione più estesa del ms. francese, mi pare di riconoscere l'*Origanum creticum* Hayne.

(2) *Beta Cycia* L. Cfr. cap. « Blotá » — Nel secolo XIII, la pianta era stata chiamata *cicula* dall'abbatessa Hildegarda. (Vedi E. Meyer, *Gesch. der Bot.* III, 527).

(3) *Polygonatum multiflorum* All.

(4) *Thalictrum foetidum* L.

Silfu, c'est une herbe que l'on appelle autrement fu ou valeriane sauvage pour ce qu'elle ressemble a valeriane, et aussi ressemble elle a ypericon, c'est l'erbe persee, mais elle n'a point les feuilles perrees, mais les a trenchees et fendues, et crespes, et pourte moult de fleurs jaunes, et ont une couleur de souffre, et aussi oudeur puante. Elle croist entour grans fossés.

442. — (fol. CXXIV). Sinapis (1) — Seneve.

443. — (fol. CXXXIV). Sinomum (2) i. petroselinum agreste... Valet ad idem ut peucedanum, eciam de ipso diximus in capitullo de petrosellino.

Sinomum, c'est persil sauvage... il vault a tout ce a quoy vault peucedanum, et aussi est il parlé de lui devant ou chappitre de persil.

444. — (fol. CXXXIV). Sisamus (3) idem est q. ginginlena... Semen eius in Cicilia, in ultra maris partibus reperitur in magna copia, quia seminant ipsam sicut milium; fit ex semine eius oleum sisaminum.

Sisame, c'est ung grain qui est autrement appelé ginginlena... Il croist en grant habundance en Cecille et es parties d'oultremer, car l'en le seme la, ainsi comme millet. De telle semence fait on oile qui est appelée oile de sisame.

445. — * Siseleos (De) (4).

Siseleos ou siler montanum, c'est surmontain (5).

446. — (fol. CXXVII). Sisimbrium (6)... aliud est domesticum, aliud silvestrum. Cum invenitur recepcio sisimbrium silvestre, calamentum debet poni, teste Constantino.

(1) *Sinapis alba* L.

(2) *Æthusa Cynapium* L., e probabilmente varie altre ombellifere (Cfr. il nome *Prezzemolo salvatico* nel *Dis. bot.* di Targioni). La parola *sinomum* (*cynomum*?) sembra formata da κύων, cane, e μήλον, meo, come *cynapium*, prezzemolo, da κύων e ἄπιον.

(3) *Sesamum orientale* L. o sp. vic.

(4) *Laserpitium Siler* L. — Nell'ediz. del « Circa instans »: « *Siseleos sive siler montanum* ».

(5) Altra forma quali « *sermontain*, *sirmontane*, si ritrovano nell'antico francese (Vedi « *Seselis* » nel *Novum Glossarium* di Diefenbach).

(6) Sotto questo nome, gli antichi autori designarono piante assai diverse fra loro, ma nel presente capitolo sembra trattarsi di specie di *Mentha* e di *Melissa*. (Cfr. i cap. « *Calamentum* » e « *Pulegium* »).

Sisimbrium... en est de .ii. manieres, l' un est sauvage, l' autre est domestique. Quant l' on treuve en recepte que l' en mette sisimbrium, c' est a entendre du calament, selon que tesmoigne Constantin.

447. — * Sistra (De) (1).

De sistre. Sistra ou sister. C' est une herbe que aucuns dient estre meu, mais ce n' est pas verité, et toutesfoiz sont elles prochaines et semblables en vertu, que l' en met l' une pour l' autre, mais encoire est sistra de plus grant vertu que meu, et ressemblent ses feuilles a une herbe appelée valdebona, et pourte petis ou peles comme fait le spic nard. Elle croist es grans montaignes.

448. — (fol. CXXIII). Solatrum rusticum (2) quot alii vocant solanum mortale. Quidem solatrum maius, alio nomine dicitur alchechengi. Fructus vel semen eius similatur serasie que fit intus quedam vesica.

Solatrum rusticum, c' est morelle mortelle; l' en l' appelle aussi la grant morelle; son droit nom est alkakenge. Le fruit qu' elle pourte ressemble a une cerise et est enclos dedens une taiete rouge.

449. — (fol. CXXXI). Soldanea (3) idem est q. herba de sodi. Nascitur locis sablosis, et proprie lictore maris, habens folia rotunda et parva. Radix longa et alba; flos eius est similis azaro.

De soldanelle. Soldanea, c' est une herbe chaude et seche qui croist en lieux sablonneux, et souvent croist en la rive de la mer, et a petites feules rondes et petite racine blanche longue. Sa fleur est semblable a la fleur appelée asara bacara.

450. — (fol. CXXXIII). Sorbastrella (4) herba est similis pimpinella, unde dicitur: pipinella pilos, sorbastella est sine pilis (5). Nascitur ad pedem moncium et in ciliariis.

(1) *Sium Sisarum* L. (?). L' articolo corrispondente manca al nostro codice.

(2) La descrizione e la miniatura nei due codici non lasciano dubbio che si tratti della *Physalis Alkekengi* L., e lo stesso si può dire del testo del « Grant Herber », al cap. « De solatro rustico »; quindi non può essere che un *lapsus calami* che fece dire ai sig. Flückiger e Hanbury (op. cit. II p. 135) di aver trovato la prima menzione dell' *Atropa Belladonna* L. in detto capitolo.

(3) *Convolvus Soldanella* L.

(4) *Sanguisorba officinalis* L., o *Poterium Sanguisorba* L. nelle miniature.

(5) Cfr. nell' « Alphita »: « *Pimpinella pilos saxifraga non habet illos* ».

De sorbastelle. Sorbastella... ressemble a pipernelle, fors que la pipernelle a petis peles contre sa tige et sorbastella non. L' on l' appelle petite saxifrage (1). Elle croist au pié des mons, et en cavernes et coulaux.

451. — (fol. CXXXIII). Sorbe... fructus sunt cuiusdam arboris (2); esui competunt.

Sorbes, ce sont fruiz d' ung arbre, et sont bans pour manger.

452. — (fol. CXXXII). Spargula (3) herba est que alio nomine dicitur rubea minor, quia folia habet sicut rubea tinctorum, sed est parvior. Spargula dicitur quia spargitur super cepibus, et in multa quantitate crescit; habens florem citrinum parvum ad modum uve.

De asprelle (4). Spargula c' est une herbe commune que l' on appelle ruelle en aucuns pais, en autres grateron. Elle ressemble a garence en feules, mais elle est moult mendre, et pour ce, ainsi comme la garence est appelée rubea maior, est ceste appelée rubea minor, et est dite spargula pour ce qu' elle se espart et estent sur terre. Elle croist partout et pourte une petite fleur jaune a maniere de grappe.

453. — (fol. CXXVI). Speragus (5)... alio nomine dicitur anasperagos.

De sperage (sparage). — (G. H). Sperage; on l' appelle autrement anasperage. Sperage a des choses tendres qui, quant on les cuyt, sont viandes delicatives.

454. — (fol. CXXII). Spica... est duplex, spica nardi (6) et spica celtica (7). Dicunt quidam q. spica nardi est flos cuiusdam arboris, sed

(1) Vedi cap. « Pimpinella ».

(2) *Sorbus domestica* L.

(3) *Galium verum* L. o sp. vic.

(4) Questo nome, che si rileva all' indice, indicherebbe invece il *Galium Aparine* L., ora chiamato *rièble* in Francia. L' origine dei vocaboli *ruelle*, *rièble*, ossia quella delle forme dialettali *reuille*, *rèle*, ecc., mi sembra dovuta a corruzioni di qualche diminutivo del latino *rubia*, per es. *rubella*, *rubecula*, *rubiola*, ecc., vocaboli medievali riferiti dal Diefenbach. Cfr. anche nel Pollini (*Flora veronese*, II, p. 482) le voci venete *rubiglio*, *rubiglie*, date come nomi del « *Pisum sativum*, flore et semine rubro ». — Il « Grand Herbier », in tal capitolo, aggiunge per la medesima pianta il nome *renoches*, il quale rammenta il vocabolo *roschnoyés* (*Spergula arvensis* L.) riferito da N. Haillant, *Flore populaire des Vosges*, p. 42. Paris, 1886.

(5) *Asparagus officinalis* L.

(6) *Valeriana Spica* Vahl.; *Nardostachys* sp. (Vedi Le Maout et Decaisne, op. cit. p. 167).

(7) *Valeriana celtica* L.

menchiuntur... Quedam mencies dicitur spicam celticam esse saliuncam. Est autem spica celtica similiter spice nardi, et in septentrionali plaga reperitur, sed tamen propter eam ponitur saliuncam.

Spic nard... Saiches qu' il est .ii. manieres de spic: l' une est spic nard, l' autre est spic celtique; et dient aucuns que le spic nard est fleur d' un arbre, mais ce n' est pas vray.... Aucuns menteurs dient aussi que spic celtique est salvince, mais spic celtique est semblable a spic nard, et croist en la partie de septentrion et est blanche, mais l' en met saliunce en lieu d' elle.

455. — (fol. CXXXII). Spina benedicta (1) sive spina marucha idem est. Est enim magna spina que in multa copia reperitur in Tussia et aliis partibus, et ex ea fiunt sepes, cuius folia sunt morbida et stricta, et longa uno digito et albidiora in viride et pingui.

De espine benoite. Spina benedicta, c' est une maniere d' espine, dont il croist grant quantité en Toscane, et aussi en autres pais, et en fait on la les haies. Ses feuilles ne sont pas droitement onnies, mais bossues, et sont gresles comme ung doy, et sont espesses et non pas droites vertes, mais blanchastres.

456. — (fol. CXXXII). Spinaca (2).

Spinarchia, c' est espinoche (espinars).

457. — (fol. CXXXVI). Spodium.. os est elephantis combustum.

Spodium c' est os de elephant brulé.

458. — (fol. CXXXIII). Spongia... fungi sunt qui in fundo maris nascens; est eius alia alba, alia subrufa... alba vero minus et dicitur vergillina.

* *De sponges. — (G. H.). Spongia, c' est une esponge. Elle s' engendre au font de la mer, et en est de deux manieres. L' une est roussette... l' autre est blanche... et est dicte vergiline.*

(1) *Lycium europaeum* L. — Fra i diversi nomi popolari di questo genere di pianta, Targioni Tozzetti (*Dis. bot. ital.*) porge *Corona di spine*, *Inchiada Cristi*, *Spino di Cristo*, *Spina da corone di crocifissi*, *Marruche*, ecc. Tuttavia il nome di *marucha*, che nel nostro testo sembrerebbe indicare l'origine africana del suddetto *Licio*, si adopera oggidì quasi esclusivamente per il *Paliurus aculeatus* Lam.

(2) *Spinacia oleracea* L.

459. — (fol. CXXV). Sponsa solis (1)... herba est que alio nomine dicitur cicorea. Alii vocant intiba et solsequium... Nascitur locis cultis et mundis et in pratis. Hec herba divina est ad cursum solis; habens stipites retrosi, et florem celestis coloris, et quando sol oritur et flos aperit, cum sol cecidit et flos clauditur.

Sponsa solis, c'est cicoree... L'en l'appelle autrement intiba, solsequium... Elle croist en lieux non labourés et en prés, et semble qu'elle ainsi que une vertu divine a suevir le soleil. Elle a les branches tortues, et est sa fleur de couleur de ciel; quant le soleil se lieve, celle fleur se euvre, et quant il resconse elle se clot.

460. — (fol. CXXXIII). Spuma maris; hoc lapis nascens super lapidem spume maris dicitur esse; enim album et habet foramina parva et spissa.

De espume de mer. Spume de mer c'est la ponce dont l'on ponce le parchemin.

461. — (fol. CXXIX). Squilla (2).

Squille; les Grecs l'appellent bulbe; l'en l'appelle scila... et cepa marina: c'est oignon ou cibole marine.

462. — (fol. CXXIV). Squinanti (3) dicitur pallea camellorum quod camelli eam comedunt... In Affrica et Arabia reperitur.

Squinant, c'est une herbe que l'en appelle paille a cameaux, pour ce que les cameaux la mangeuent... L'en le treuve en Arabie et en Anfrique.

463. — * Stafisagria (4).

De Staphisagrie. Stafisagrie, c'est la semence d'une herbe qui est ainsi appelée, et est autrement appelée pediculaire ou herbe a pouous; pour ce qu'elle les occist... l'en l'appelle aussi purgechief pour ce qu'elle purge le fleume du cerveau.

(1) *Cichorium Intybus* L.

(2) *Scilla maritima* L.

(3) *Andropogon Schoenanthus* L.

(4) *Delphinium Staphysagria* L. — Nell'ediz. del « Circa instans »: « Stafisagria que et caputpurgium dicitur ».

464. — (fol. CXXV). *Sticados arabicum* (1) herba est que nascitur locis asperis et in montibus; habens folia ut rore marino, sed sunt albidiora et parva in summitate. Producit florem pomiculum vel quasi, et habet colorem purpureum cum odore aromatico. Folia eius habent saporem sub amarum cum aromaticitate.

Sticados arabic est une herbe qui croist en lieux aspres et en montagnes, et a feules comme romarin, mais elles sont plus blanches, et une fleur a maniere de pomete, laquelle a bonne oudeur et a ung poy de amerté avec.

465. — (fol. CXXV). *Sticados citrinum* (2) que herba Iovis dicitur... tempore veris producit florem, colligitur, suspenditur (3) et per annum servatur.

Sticados citrin que l'en appelle autrement barba Jovis... et l'erbe de Hercules. Elle pourte fleur ou temps de ver, et adonc la doit on cueillir et pendre; elle se peut garder par ung an.

466. — (fol. CXXVI). *Stinci...* pisces sunt qui in fontibus, et maxime in aquis dulcibus, inveniuntur, et lacertis assimilantur.

* *De stince.* — (G. H.). *Stinces, ce sont petis poissons que on treuve en eae doulce, et en forme de lisardes; on l'en treuve en Peulles.*

467. — (fol. CXXX). *Storax, gummi arboris* (4) est.

Storax, c'est la gomme d'un arbre qui a une substance gluieuse. ✓

468. — (fol. CXXII). *Strignum* (5), *morella, solatrum* idem est.

Strignum, c'est morelle, et l'appelle l'en solatrum.

(1) *Lavandula Stoechas* L. — Cfr. cap. « *Consolida minor* ».

(2) *Helichrysum Stoechas* DC., genere di pianta riconoscibile nelle miniature dei due codici.

(3) La dessiccazione all'aria aperta ed al sole era allora l'unico metodo di conservare le piante. Bisogna giungere quasi alla metà del secolo XVI per trovare la prima menzione di una raccolta di piante disseccate entro fogli di carta, come è ormai di un uso generale presso i botanici. Tale invenzione dell'inglese Falconer, il quale visitò l'Oriente nel quinto decennio di quel secolo, sembra dovuta, come altrove l'abbiamo detto, alla ricerca di un mezzo comodo per poter trasportare le piante raccolte in viaggio. (Vedi J. Camus e O. Penzig, *Illust. dell'Erbario Estense*, p. 12. Modena, 1885, — e, per ulteriori informazioni sulla questione, consultare l'interessantissima opera del D.^e Saint-Lager, *Histoire des herbiers*. Paris, 1885).

(4) *Liquidambar orientalis* Mill. o sp. vic. ✓

(5) Forse qui abbiamo l'*Atropa Belladonna* L., almeno secondo il codice latino, nel quale la miniatura figura dei frutti neri, con foglie oblungue. (Cfr. cap. « *Solatrum* »).

469. — (fol. CXXVI). Strucium (1) i. caulus agrestis. Quidam dicunt braxica non plantata.

* *De structum.* — (G. H.). *Strucium, c'est une herbe qui croist en lieux aspres et pierreux pres de la mer. Et a fueilles blanches a maniere de cotton et de layne, et aussi le tronc... On l'appelle choul sauvage.*

470. — (fol. CXXIII). Sulphur — Souffre.

471. — (fol. CXXX). Sumac (2)... semen est fructice vel arboris q. Greci anagodam vocant.

Sumac... c'est la graine d'un petit arbrel qui est appellé en grec anagoda.

472. — (fol. CXXXIV). Tamariscus (3).

Tamariscus, c'est tamarisc (tamaric), ung petit arbre.

473. — (fol. CXXXV). Tapsia (4)... invenitur in Arabia, India, Calabria et Cicilia, et proprie circa Palormum.

Tapsia ou tapse... Celle qui croist es chaudes regions est la meilleur. L'en en trouve assés en Arabie, en Cecile, en Inde, en Calabre, en Puile.

474. — (fol. CXXXIV). Tartarum.

Tartre, c'est gravelle de vin.

475. — (fol. CXXXVI). Tassus verbassus (5), alio nomine dicitur flosmo, alii vocant bladone (6)... Herba est cuius due sunt maneries s. masculus et femina, i. maius et minus.

Tapsus barbatus, tapse barbe. C'est une herbe commune qui a les feules pelues, et pourte une branche longue dont l'on fait ung brandon

(1) *Brassica incana* Ten. o sp. vic. — Cfr. Pietro di Crescenzo (ediz. cit. lib. VI, cap. CXI): « *Stutio cioe cavolino salvatico* ».

(2) *Rhus coriaria* L. nelle due miniature.

(3) *Tamarix gallica* L. o sp. vic.

(4) *Thapsia garganica* L.

(5) *Verbascum* sp.

(6) Hildegarda, nel sec. XIII, chiamava il verbasco, *Blandonia vel Lanaria*. L'« *Alphita* » porge come sinonimi: « *Tapsus barbatus, herba luminaria, flosmus, molena, idem* ».

ardant quant l'on le gresse. Aucuns l'appellent queue de leu; l'en l'appelle flosmon et bladone... En est de .ii. manieres, le masle et la femelle. La femelle est greigneur et a plus grans feules.

476. — (fol. CXXXV). Tela aranee — Toile de yrengne.

477. — (fol. CXXXVI). Terbentina (1), gummi est sive liquorisitas que ex abiete effluit.

Terebentine (terbentine), c'est la gomme d'ung arbre nommé sappin.

478. — (fol. CXXXIV). Terra sigillata, calx est odorifera, et dicitur terra argentea vel creta sarracenica; facile ex nostra creta sophisticatur.

Terre scelle est autrement appelle terre sarrasine ou croie argentee. L'en la scelle d'une part et d'autre pour sa noblesse.

479. — (fol. CXXXVII). Terre stelle, qd. lucanium dicitur, terra est quasi lapis.

De terre estoille.

480. — (fol. CXXXV). Tetrahit (2), herba iudeyca idem est.

Tetrahit, c'est une herbe que l'en appelle judaïque.

481. — (fol. CXXXV). Titimallus (3)... habens multas species; de laureola et ezula dictus est superius; nunc de tanabula dicamus que in ultra maris tibus est, de qua fit scamonea, et de anabulla nostra.

Titimal... Il en est moult de manieres, mais il est dit devant de esule et de laureole, maintenant dirons de anabule. L'anabule qui croist es parties d'oultre mer est l'erbe dont l'on fait la scamonee, et est titimal babilonique. L'anabule de ce pais rent lait lequel l'en doit cueillir ou printemps et au commencement d'esté.

(1) Con tal nome designavasi la resina di varie conifere dei generi *Abies*, *Pinus*, ecc.

(2) *Galeopsis Tetrahit* L., pianta chiamata in Italia *erba giudaica*. — L'« Alphita » dà come sinonimo *tetrahiscus*.

(3) Questo nome era generale per le piante che hanno il succo come latte, e particolarmente per le varie specie di *Euphorbia*. Nel margine del codice latino abbiamo la parola *tanabulla*, con una cattiva miniatura nella quale si è voluto certamente rappresentare il *Ricinus communis* L. — Nel « Livre des Dedyus » (ms. cit. fol. 62) si legge: « L'erbe a couleur qui est appelee en medicine tintymale ».

482. — (fol. CXXXVII). Torbentilla (1) q. alii eptaflos vocant. Torbentilla herba est que fistularia et tagliasana dicitur; similatur pentaflon.

Tormentille, c' est une herbe que aucuns appellent fistulaire, autre tagliasaire. Elle ressemble a quinte feuille. Elle croist en montaignes et aussi en lieux caveux.

483. — (fol. CXXXVII). Tri (2) q. alii tria sive vermicelli vocant.

484. — (fol. CXXXVI). Tribuli marini (3), herba est que nascitur locis sabulosis et in marinis partibus; serpit super terram. Invenitur tempore estivo, et producit semen spinosum, unde dicitur tribuli.

De tribules. Tribulus marinus, c' est chardon marin, et est une herbe qui croist en terre sablonneuse et es parties de la mer, et rampe sus terre. L' en la treuve en temps d' esté, et pourte une semence espineuse pour laquelle l' en l' appelle chardon.

485. — (fol. CXXXVII). Trifolium acutum (4).

Trifolium, trefle (triefle), selon Dyascorides. Il en est de quatre paires: l' ung est appellé trefle a .iii. cornes que aucuns appellent poliflon; et si est le trefle qui sent bon que l' en appelle trefle agu ou trifolium fossalidum, et en latin exiflon; le quart est le trefle lagoceron (5), et les latins l' appellent trefle a lievre, et a rouge fleur et semence lee et aspre.

486. — (fol. CXXXVI). Trinitas (6), unitas, idem est; herba similis asarum, et habet tria folia in uno folio. Nascitur locis mundis et obscuris, et proprie in castanetis.

(1) *Potentilla Tormentilla* Schrnk.

(2) Il capitolo manca alla traduzione, ed anche all' indice latino. E esso si trova però nel codice di Breslavia. (Janus, loc. cit. p. 66).

(3) *Tribulus terrestris* L.

(4) Il codice latino porge soltanto una miniatura, ove si figura una pianta che potrebbe essere la *Psoralea bituminosa* L., specie alla quale vien comunemente riferito l' ὄξύ τριφυλλον di Dioscoride. Riguardo alle altre piante menzionate nel testo francese non si può fare che conietture per diverse specie di *Trifolium* (*T. repens*, *T. Lagopus*, *T. angustifolium*, ecc.).

(5) Da una confusione fra questo termine *lagoceron* ed il nome *laiteron*, mi pare essere stato formato il vocabolo *laceron* che designa il *Sonchus oleraceus* L. presso i Francesi.

(6) *Hepatica triloba* Chair.

Trinité ou unité, c'est tout ung, et est une herbe qui ressemble asara bacara, et a en chascune feuille trois feuilles. Elle croist en lieux nés, obscurs, comme en bochés ou chastenés.

487. — (fol. CXXXVII). *Triticum* (1).
Triticum, c'est forment.

488. — (fol. CXXXV). *Turbith...* herba (2) est que in ultra maris partibus reperitur.
Turbith, c'est la racine d'ung arbre.

489. — (fol. CXXXIX). *Urtica* (3).
* *De ortie.*

490. — (fol. CXL). *Uva* (4).
* *De uva, grape.*

491. — * *Valdebona* (De) (5).

492. — (fol. CXL). *Vermicularis* (6) sive *vermicularia*, herba est nascens super terram, et maxime super lapidem et maceribus, et spanditur sicut vermes, et folia parva compigua et florem citrinum.

* *De vermiculaire.* — (G. H). *Vermicularis, vermiculaire. C'est une petite herbe qui croist sur les murs et que on appelle teste de souris. Elle est moult menue, et a les fueilles moult drues comme vers, et sont petites et especes.*

(1) *Triticum vulgare* Vill.

(2) E difficile di asserire se si tratta già qui dell' *Ipomoea Turpethum* L., poichè sembrano essersi confuse altre volte piante del tutto diverse, sotto il nome di « turbith ». Così abbiamo nell' « Alphita », *Turbith radix est herbe similis trifolio, et est perforata* ; nel « Compend. aromat. » di Saladini (ediz. cit. fol. 374), « *Turbit est radix herbe cuius folia sunt sicut folia ferrule, minora tamen* » ; ecc.

(3) *Urtica dioica* L. o sp. vic.

(4) Frutti della *Vitis vinifera* L.

(5) Questo nome, menzionato all' articolo « Sistra », si trova anche all' indice del codice francese, ma il capitolo manca nei due manoscritti.

(6) *Sedum acre* L. o sp. vic. — Cfr. nell' « Alphita », *Crassula, vermicularis, et est major et minor* ».

493. — (fol. CXL). Vilubidis (1)... Sunt enim quatuor maneries vilubidis, sc. maius, minus, medius et lauac'. Maior dicitur funiculus arbor, et habet florem album et similis capana... alii sunt violenciores et acuciores et maxime illud quod habet folium ad modum lancee.

* De vilulidis. — (G. H.). *Volubilis, c' est une herbe que on appelle ainsi. Et en est de quatre manieres. C' est assavoir la grande, la petite, la moyenne et la jaune. La grande volubilis est autrement appelée funiculus arboreus: et a fleur blanche a semblance de coche (2)... les autres sont trop violentes.*

494. — (fol. CXL). Vincetoxicum (3) antiformacum idem est. Herba est que nascitur locis montuosis et lapidosis; habens folia spissa sub nigra et florem album; et producit baccas ad modum orobi (4), sed magis acutas.

* De vincetoxicon. — (G. H.). *Vicetoxicum ou antifermacum, c' est tout ung. Elle croist en lieux de montaignes et plains de pierres, et a les feuilles espesses aucunement noires, et porte blanche fleur et une semence noire en maniere de vesse, mais elle est plus ague.*

495. — (fol. CXXXVIII). Viola (5).

De violiers. — Viola, ce sont les violettes (violetes) de mars. v

496. — (fol. CXXXIX). Viperina (6) herba est q. alii vocant urticam mortuam. Nascitur circa flumina vel in bladis, et habet folia morbida et saporem amarum... Debet eadem legi mense aprilis.

* De viperine. — (G. H.). *Viperina, viperine. C' est une herbe qu' on appelle urtie morte. Elle croist environ les fleuves et es ysles. On la doit cueillir au mois d' avril.*

(1) *Convolvulus sepium* L.; *C. arvensis* L., e sp. vic. — Quello dalle foglie a modo di lancia, è certamente il *C. Scammoneia* L.; quindi l'abbreviazione *lauac'*, tradotta da *jaune* deve essere stata scritta per errore, invece di *glauc'*, e si riferisce alla corolla, che in quest'ultima specie è tinta di colore giallo pallido, verdognolo all'interno.

(2) Errore di stampa per *cloche*.

(3) *Vincetoxicum officinale* Moench.

(4) *Orobis* sp. o forse *Vicia* sp. (Cfr. *Orobis* nella Sinonimia dell'appendice).

(5) *Viola odorata* L. o sp. vic., nelle miniature. }

(6) *Lanum* sp. o *Stachys* sp. Però la miniatura del codice latino figura piuttosto una *Scrofularia*.

497. — (fol. CXXXVIII). *Virga pastoris* (1), herba est frondes et ramos habens super terram expansos, virides in estate, et in hieme florem habet album subtilem ut calamum.

De verge a pasteur. Virga pastoris, c'est une herbe ainsi appelée et pourte ung tel chardon au bout comme est le chardon (2) dont l'en lave draps, excepté qu'il n'est point reichu (3), et pour ce l'appellent aucuns chardon sauvaige.

498. — (fol. CXXXVIII). *Viticella* (4) herba est que alio nomine tannum.

* *De viticelle. — (G. H.). Viticella, viticelle. C'est une herbe qui est semblable a brioyne et rampe contre les hayes, mais elle porte ung grain rouge; on l'appelle autrement tanum.*

499. — (fol. CXLI). *Vitis alba* (5) herba est... que expanditur supra sepes; magna quantitate crescit.

Vitis alba, c'est une herbe qui se espart sus haies en grant quantilé.

500. — (fol. CXXXVIII). *Vitrum* fit ex herba et sablone excoctione ignis in fornace artificiose.

Le voirre est fait de herbe et aussi de sablon par force de feu en fournaise et par grant artifice.

501. — (fol. CXLI). *Xilocorata* (6), modicum habet dulcedinis multum stipticitatis q. substancia est grossa et lignea.

Xilocrates, ce sont fruis qui ne croissent fors que en Surie, et ont saveur qui participe de doulceur avec reecheté ou stipticité, et est leur substance dure a maniere de bois.

(1) In questo capitolo, i testi non concordano ed è difficile se i due manoscritti trattano della medesima pianta. In ogni modo è chiaro che essa, nel codice francese, è il *Dipsacus pilosus* L.

(2) *Dipsacus Fullonum* Mill.

(3) Nel « Grant Herbier »: *creuchu*.

(4) *Tamus communis* L., pianta riconoscibile nella miniatura.

(5) Vedi cap. « Brionia ».

(6) Frutti della *Ceratonia Siliqua* L. — Cfr. nell' « Alphita » « *Xilocructa, id est lignum scriptum, qui et iam vaginella dicitur, sive siliqua* ». — Gr. *Ευλοκίρατα*, carrube.

502. — (fol. LXXIX). Ypoquistidos (1) fungus est qui reperitur circa radicem rose canine (2).

Ipoquistidos est une maniere de champignon qui croist environ le pié d' une herbe appelée rose canine ou rose a chien.

503. — (fol. LXXIV). Ysopus (3)... cuius due sunt species... maius et minus... Alii vocant sicca ysopus.

Ysope... en est .ii. manieres, la grande ysope et la petite... Les autres l'appellent seche ysope a la difference de la gresse que l'on prent en la laine des brebis que l'on appelle ysope moite.

504. — (fol. CXLII). Zedoaria (4).

Zedoar, c'est la racine d' une herbe... le domestique a la couleur jaune et taint les mains comme safran.

505. — (fol. CXLII). Zibulle, grossus est cibus.

Zipules, ce sont frictures faites de farine avec oile (5). C' est moult grosse viande.

506. — (fol. CXLI). Zingiber (6)... quidam dicunt ipsum esse radix arbor; alii ramiculos arboris, sed ipsum vera est radix herbe crescens ultra maris partibus, et in montibus Clavonie.

Zixinber, gingembre. Aucuns dient que c' est la racine d' ung arbre: aucuns que ce en est le boys, mais la verité est que ce est la racine d' une herbe qui croist en Esclavonie.

507. — (fol. CXLII). Zizania (7) herba est. Nascitur inter triticum, siccis corruptisque partibus.

(1) *Cytinus Hypocistis* L.

(2) *Cistus salvieifolius* L.

(3) *Hyssopus officinalis* L.

(4) *Curcuma longa* L. o sp. vic.

(5) Henschel nel *Janus* (p. 67) spiegava la parola *zipulle*, rilevata nel codice di Breslavia, con *Zwiebeln* (cipolle!).

(6) *Zingiber officinale* Roxb.

(7) Questo nome si adoperava, non soltanto per graminacee come oggi, ma in generale per le piante nocive alla coltivazione dei campi. Così mentre il manoscritto francese rappresenta nella miniatura un *Lolium*, o qualche pianta di genere affine, il cod. lat. figura la *Centaurea Cyanus* L. Altri, come il Crescenzi, menzionano sotto il suddetto nome, l' *Agrostemma Githago* L. ecc.

Zizania c'est gasse. C'est une herbe qui croist es fromens mauvais et secs et corrumpus.

508. — (fol. CXLII). Zuccara (1)... Zuccarum fit de cannemelle in transmarinis partibus et in Cicilia et in Spania; fit versus beati Johannis Baptiste.

Zuccara, c'est succe... Le succe est fait de une canne en maniere de roseau qui est plaine d'une mouelle douce, et l'appelle l'en la canne de miel. Elle croist outre mer et en Cecile, et en Espagne, et fait on le succe environ la feste de la Saint Jehan Baptiste.

Come innanzi venne detto, il nostro codice latino della R. Biblioteca Estense porge in appendice al *Tractatus herbarum* ossia al *Circa instans*, una ricca "Sinonimia" scritta dalla mano dello stesso copista "Le petit Pelous".

Questa opera anonima, di carte 25, principia con "Arthemisia i. matricaria, mater herbarum", e comprende oltre a quattro mila articoli consimili, i quali sono aggruppati secondo la loro lettera iniziale, ma non ripartiti con schietto ordine alfabetico. I sinonimi in essa contenuti sono voci arabe, greche e latine che si riferiscono generalmente a piante medicinali, e più di rado a semplici d'origine animale o minerale; quà e là però si trovano immischiati certi articoli che non hanno che fare colla medicina, per es. *Elgebel i. mons*; *Faras i. equus*; *Yena i. bestiola quedam*; *Yris i. arcus celi*; ecc. Le descrizioni di piante, come anche gli usi dei medicamenti, vi fanno quasi totalmente difetto, e sotto quest'ultimo riguardo, l'opera differisce assai dall'*Alphita*, noto glossario del secolo XIII, scoperto da Carlo Daremberg nella Biblioteca Mazarina di Parigi.

Molto probabile è che la "Sinonimia" dell'Estense sia una compilazione di altre opere del medesimo genere, composte nei secoli anteriori al quattrocento. Infatti la storia della medicina ricorda parecchi simili glossari, dei quali alcuni sono per-

(1) Sostanza nota estratta dal *Saccharum officinale* L. — Cfr. cap. « Canna ».

venuti fino a noi. Così il De Renzi (*Storia documentata...* p. 62) notò l'esistenza, in un codice cassinese del sec. XI, di "una specie di Sinonimia col titolo *Vocabula herbarum*, come *Asphaltu id est bitumen*, nella quale si citano voci greche, ebre, latine ed egiziane „. In fine del *Pantegni*, prezioso codice del secolo XIII conservato nella R. Biblioteca di Napoli e analizzato dal suddetto storico (*Storia documentata...* p. 221), trovasi un altro scritto analogo, forse di origine comune colle *Glosas herbarum et specierum* di Costantino. Inoltre devo avvertire che nel R. Archivio di Stato in Modena, fra varie carte provenienti da antichi codici di medicina e gentilmente segnalatemi dal Prof. Cesare Foucard, riscontrai in due fogli staccati, con caratteri del sec. XIII, il principio di un'altra Sinonimia i cui articoli, con lievi varianti, si ritrovano per la maggior parte nella nostra.

Non mi consta che la Sinonimia dell'Estense sia mai stata pubblicata per intero, ma credo di riconoscerne una parte, cioè circa un migliaio di articoli, in quella che venna stampata a Venezia, già nel 1479, nel libro *Universa opera Joannis Mesue*, e poi ristampata, col titolo di *Liber sinonimum*, nell'edizione di Mesue data dal Mondini, nel 1508.

Il glossario che forma l'appendice del *Tractatus herbarum* meriterebbe di certo uno studio particolare, a cagione dei vantaggi che se ne ricaverrebbe per spiegare molte denominazioni di senso oscuro, le quali s'incontrano negli scritti medievali di medicina, e segnalatamente in quelli che furono compilati su opere di autori arabi; ma, per varie ragioni, devo limitarmi ora a presentarne pochi estratti colla scelta degli articoli seguenti:

Aconitus i. herba lupparia. — Acorus dixinia i. gladiolus. Et nota quod quatuor sunt herbe valde similes, et differencia versibus notantur:

« *Yris purpureum florem gerit, yreos album,*
« *Gladiolus croceum sed spatula fetida nullum* (1) ».

(1) Versi del poema salernitano « *Flos medicinae* » riportati anche nell'« *Alphita* ».

— Angulus i. citrolus. — Angurii i. cucumeris. — Appium emoroydarum i. appium fluviatile. — Appius montanus i. zizania. — Archangelica i. urtica mortua. — Armeal' (1) i. garioflata. — Armoracia i. rapistra. — Arnoglossa vel centum nervia i. lingua agni sive plantago maior aut lingua Bernardi. — Arthritica i. herba sancti Pauli. — Asanhase i. raphanus gallicus. — Astragalis i. pes porcinus. — Athanacetum vel athanasia i. matricaria media. — Aurigea i. paradella. — Avanciana, garioflata vel sanamunda, sive pes leporinus aut herba benedicta. — Bisce i. ysopus de Ispana. — Bismalva i. ungarica alba vel malva. — Bresil i. corallus. — Cacreos i. semen ferule. — Cahua (2) i. vinum album et debile. — Camel-leunta i. cardus benedictus. — Canavid i. caulus imperialis. — Candreos i. triticum romanum. — Cardus benedictus i. virga pastoris. — Carieta i. pastinaca domestica. — Cassia absoluta i. cassia lignea (3). — Cassia siringa i. cassia fistula. — Cauda lupina i. cerfolium acutum. — Cesim i. semen ferule. — Cicinus i. cere. — Cicion i. cicuta. — Conium i, semen

(1) Probabilmente *armelia* per *armeria*, vocabolo che diede nel francese antico *armerie*, *armoirie*, ecc. nomi di varie specie di *Dianthus*. Il sinonimo *gariofilata* sembrerebbe indicare particolarmente il *Dianthus Caryophyllus* L., pianta molto pregiata nei secoli XV e XVI, il cui fiore venne scolpito e dipinto in parecchi monumenti ferraresi di quel tempo. Infatti il duca d'Este Ercole I lo scelse per la sua impresa, nel 1471, ed un poco più tardi, il pittore Tisi Benvenuto, nato a Garofolo presso Ferrara, lo univa alla firma di alcuni suoi quadri. D'altronde quel medesimo fiore si coltivava nei giardini di Ferrara, sin dal 1460, come apparisce da un documento di quell'anno, conservato nel R. Archivio di Modena (Camera ducale), il « *Zornale de uscita per conto de Octaviano de Novello* », ove si menziona, a fol. 35, una spesa fatta da Mees. Ant. Serzanela « *in chomprare cisti e cestuni per mandare roxoni e garofalli e altri furi* ».

(2) L'Erbario, raccolto da Rauwolf nel secolo XVI ed ora conservato a Leida, contiene già è vero la *Coffea arabica* L., colla menzione « *Cahua Arabum* »; ma, come lo sappiamo da vari storici, all'epoca nella quale fu scritto il « *Tractatus herbarum* », l'uso del caffè era quasi sconosciuto presso gli Arabi, e quindi è molto probabile che il termine *Cahua*, adoperato nel codice dell'Estense, designi una bevanda proveniente da altra pianta. Riguardo a tal vocabolo, ecco quel che Galland, il celebre traduttore delle « *Mille ed una notte* », scrisse nel suo trattarello « *De l'origine et du progres du café. Sur un Manuscrit Arabe de la Bibliothèque du Roy* » (p. p. 7 e 9. — Caen, 1699): « *Le mot (turc) de Cahveh, est le même que Cahouah, ou Cahoueh, parmi les Arabes, qui n'expriment pas l'o consonne comme les Turcs, ny comme nous; mais, comme les Italiens prononcent leur u voyelle... Du mot Cahouah, qui d'abord a signifié seulement le vin en particulier, les Arabes en ont fait un terme generique, pour signifier toutes sortes de boissons. C'est pourquoy il ne signifie ny l'arbre, ny les bayes, ou les fèves de cet arbre, que nous appellons Caté; mais seulement la boisson que l'on en fait* ».

(3) Aggiungere al cap. 111: « *Saiches qu'il est deux manieres de casse; l'une est casse fistule, l'autre est casse ligne (casse lignee)... Quant l'on trouve en recepte casse simplement, il est a entendre de casse ligne* ».

cicute. — Corbelle i. fructus cormale. — Cornapodium i. pes corvinus. — Corona regia vel paractellum i. mellilotum. — Crassula i. cardus benedictus. — Crisomila i. antipersica. — Crocus affricanus i. ortensis. — Cucube (1) i. fructus nere. — Darsem i. cinamomy subtilis. — Darumathen i. herba que reticulatur super quercus (2). — Dauch i. semen baucie silvestris. — Digiti citrini i. palma Christi. — Ditea i. herba baccina i. appollinaris. — Edera nigra i. edera arborea. — Edera terrestris i. frigura (3). — Elesne i. lanugo arboris. — Eliops. i. avena sterilis. — Embuch i. spina alba florem faciens citrinum. — Erba Marie i. athanasia. — Erba rustica i. rosa silvatica vel papaver rubeum. — Erigmon i. cicer erraticus. — Faba lupina i. egipciana vel marsilia. — Felomequi i. calamentum fluviale. — Filis i. galgema. — Flosmus i. taxus barbatus. — Flos orni i. ros siriacus. — Fulfolinom i. osmum montanum. — Fustoch i. fustici. — Gelena i. cucurbita alexandrina. — Geranio i. herba muscaria. — Gilbenec i. nux vomica. — Glicerida i. liquiricia. — Gliquiricia i. radix pontica. — Guarnufar i. gariofli. — Hen i. alcanna. — Herba anacerna i. lenticula aquatica. — Herba belleris i. nepita vel herba gattarum (4). — Herba bionda i. galdula (5). — Herba catholica i. laureola. — Herba lucernaria i. flosmus. — Herba pagana i. osmundi. — Heu i. meleghete. — Holus (6) iamenicis i. blitus. — Holus iudaicus i. altea. — Iacintus i. flos rubeus. — Iccopa, regia idem est. — Ierobulbum i. bulbum agrestis. — Ipoquistidos i. fungus qui nascitur ad pedem rose canine (7). — Iris illirica i. gladiolus i. liliun celeste (8). — Kacreos i. ros marinus. — Karube i. xillocarata. — Kamelleunta alba i.

(1) Vedi la nota al cap. 130.

(2) Probabilmente *Lobaria pulmonaria* DC.

(3) Dalla voce *frigura* proviene certamente il francese *frigoule*, uno dei nomi del *Thymus vulgaris* L., riferito dal Littré senza etimologia. Però nel nostro ms. il sinonimo *Edera terrestris* indicherebbe piuttosto la *Glechoma hederacea* L.

(4) *Nepeta Cataria* L. — Cfr. nell'« Alphita »: *Nepta est herba de qua Cattae solent impregnari*.

(5) *Reseda Luteola* L. ital. *guadella*, franc. *gaude*.

(6) Nel frammento della Sinonimia conservato nel R. Archivio di Modena, leggo « *holus iameic' i. bli'* ». Ora rilevando nel Diefenbach (Nov. Gloss.) « *Bolus, bete* » (così scritto forse per confusione con *Bolus armenicus*), non sarei lungi dal credere che l'espressione moderna *Bonus Henricus* (*Chenopodium*) sia il risultato di una corruzione delle denominazioni primitive suddette, dovuta in parte alla falsa lettura delle abbreviazioni di certi manoscritti. — Nell'« Agregator Jacobi Dondi Patavini » (fol. 208. Venetiis, 1543) si ha invece: « *Holus iamenun* Serap. 226, Avic. *dicat olus aliamenum. Berlitus* ».

(7) *Cistus salviaefolius* L.

(8) *Iris germanica* L.

cardus bene olens. — Kamelleunta nigra i. cardus asininus. — Kardus coagulatus i. camelleunta alba — Kekingi solatrum mortale vel herba cocta. — Kerua (1) i. palma Christi. — Kilex i. salix de torrente. — Kute (2) montane i. arthemisia. — Lambrusca i. vitis silvestra et nigra. — Lapidus calcis i. battitura eris. — Lappa caprina i. asinina idem est. — Lappacioli i. lappa asinina. — Leucogion i. viola alba. — Lingua humana i. salvia. — Lingua hyrcina i. meretricaria. — Luf i. herba serpentaria. — Luppinus i. faba egipciana. — Lutum armenicum i. bolus. — Macis i. foliculus que sunt circa nuce muscata. — Mahamua i. scamonea in arabico nomine. — Malacer i. cortex celci. — Marubium subitaneum i. eupatorium. — Masadica vel masadiga i. candelaria. — Matricaria minor i. amarella. — Mellilotum i. fenugrecum agrestis. — Miliun solis i. cauda porcina vel grana solis. — Millefolium i. centofolium. — Mnicion i. grassula media. — Naphita i. petroleum album. — Nardostachium i. spica nardi. — Nere grana i. cerasi silvestris. — Nux indica i. nux Pharaonis. — Nux miristica i. nux muscata. — Nux vomica i. castaneola indi (3). — Orobum i. album cicer. — Osimum citrinum i. basilicon maius. — Osimum fluviale i. balsamita aquatica. — Pelitumin (4) i. trifolium acutum. — Pimpinella i. sanguisorbula vel sorbastella. — Pistacee fructus sunt que inveniuntur Damasco. — Pociona, patella idem est. — Polipodium i. feliciola. — Pomelida i. arbor sorbe. — Ponfilgon, molena i. flosmus. — Quirion i. radix iunci triangularis. — Ramicedri (5) i. iuniperi lignum. — Rampus i. spina alba. — Raphanum agreste i. herba rodalda. — Ribes i. flos salicis de torrente. Alia acedula, et verum est quia vidi quando vendebatur marchioccia, et clamabat ille qui vendebat ribes. Ribes (6) habet enim folia similia quasi lapacio rotundo, et non tantum longa et costa folii trahit ad

(1) Nome arabo del *Ricinus communis* L. — Cfr. nella « *Practica* » di J. Serapione (*ediz. cit.* fol. 127): « *Cherua i. pentadactilibus et cataputia maior... ex semine eius fit oleum quod dicitur oleum kichas* ».

(2) Fra i vari capitoli del codice di Breslavia, Henschel annoverava quello di « *De cuto* » facendo seguire tale parola da un *quid* interrogativo; ma mi pare probabile dovervisi leggere invece « *De cute* », cioè il nome di qualche specie di *Artemisia*.

(3) *Datura Metel* L. — Cfr. num. 386, in nota.

(4) Forse *Psoralea bituminosa* L.

(5) Titolo di un altro capitolo del codice di Breslavia, mancante al nostro.

(6) Qui si tratta senza dubbio del *Rivas* dei Persiani, cioè del *Rheum Ribes* Gron. (Vedi H. Baillon, *Traité de bot. méd.* fasc. II, p. 1340). — In un libricino assai raro, stampato a Venezia, nel 1545, « Di Carlo Stefano, *Le herbe, fiori, stirpi che si piantano ne gli horti* », si legge a pag. 40: « *Molochia detta dai Mauritani atriplice marino, è un'herba simile à l'halimo, le sue foglie si euocino in cibi, et usano gli habitatori sopra mare di portarne in*

rubedinem et habet saporem acetosum. — Riquiricia i. radix dulcis. — Sabar i. aloe. — Salvicula i. herba sancti Laurencii vel herba venti. — Sandara vel sandaro i. vernix. — Sandaraca i. caustica. — Sesabram i. basilicum minutum. — Siliqua i. xillocarata i. carube. — Smirne basilicen i. mirta. — Solatrum medianum i. herba cocta. — Solatrum mortiferum i. alkekangi. — Sticados i. pollium marinum. — Strignus i. uva luppina (1) vel solatrum. — Sulla i. arthetica. — Sunesi i. viscus quercinus. — Suss (2) i. liquiricia. — Tamar i. dactili. — Tapsia i. ferula minor. — Tarassacon i. endivia. — Tarcon i. radix piretri sine dubio. — Terebintus i. arbor unde fit terebentina. — Tetrabit i. barba hircina. — Tetrabit i. herba iudaica. — Timbra i. saturegia. — Torquata i. herba sancti Laurencii. — Trifolium i. caudina vulpina. — Turbith i. similis galange. — Ungarica alba i. malva agrestis. — Unguella i. ungula caballina. — Urisnee (3) i. lanugo que est in arboribus et in parietibus. — Veronica i. betonica. — Verrucaria i. elyotropia. — Vistrigo i. urtica mortem similis. — Ximacon i. cortex celsi. — Xisimbrium i. balsamita. — Ygia i. storax liquida. — Ysopus humida i. sudor lane sub ventre. — Ysos (4) i. viscus quercinus. — Zizania i. lolium. — Zufra i. rutha silvestris. — Zurus i. paliurus (5).

fascetti a vendere per le città e terre al mare vicine » A tale passo fa riscontro quello dell'opera citata di Mutono (fol. 38): « *De Halimo. Atriplex marinum vocitatur. Frutexque venalis apud Aegyptios habetur, vendentesque per Urbem clamitabant Molochia, Molochia* ». Benchè vi sia qualche somiglianza fra il suddetto passo della nostra *Sinenimia* e queste due citazioni, però è chiaro che in quest'ultime non si tratta del *Rheum Ribes*, ma piuttosto del *Corchorus olitorius* L., pianta che Rauwolf raccolse in Egitto, verso il 1574, e che egli ci ha conservato nel suo prezioso Erbario colla menzione « *Moluchi Arabum* ». (Vedi Dott. Saint-Lager, *Histoire des herbiers*, p. 79).

(1) *Atropa Belladonna* L.

(2) Curiosa è la coincidenza di tal vocabolo arabo *suss* col tedesco *Sussholz* nel designare la liquirizia.

(3) *Usnea barbata* L. (?) — Cfr. nel « *Compendium aromatariorum Saladini* » stampato assieme alle opere di Mesue (Venetiis, 1508), fol. 378: « *Usnea id est herba valde minuta in tectio domorum* ».

(4) Alla parola *ysos* corrisponde il greco moderno ἰζός, nome del *Loranthus europaeus* L.

(5) Forse il *Paliurus aculeatus* L., pianta che P. Crescenzo (*ed. cit.* V, cap. 57) chiamava *Spina giudaica*, dicendo che « *è migliore di tutte le spine per siepi perche in ciascheduna foglia ha due spine, una diritta grande et acutissima et un'altra picchola et ritorta* », e che i frutti sono « *siccome piccole avellane in una tonica o vero guscio ritondo a modo d'un danaio* ».

ELENCO

dei generi di piante in uso nella medicina verso la fine del medio evo
secondo i testi del TRACTATUS HERBARUM
e del SECRÈS DE SALERNE

COMPOSITÆ			COMPOSITÆ		
		num.			num.
<i>Achillea</i>	22, 98,	315	<i>Tanacetum</i>	48, 231,	311
<i>Anacyclus</i>		373	<i>Taraxacum</i>		252
<i>Anthemis</i>	47,	144	<i>Tussilago</i>	252,	263
<i>Artemisia</i>	1, 46,	91	<i>Xanthium</i>		263
<i>Bellis</i>		140			
<i>Calendula</i>		91	DIPSACEÆ		
<i>Carlina</i>	93, 94,	228	<i>Dipsacus</i>		497
<i>Carthamus</i>		151	<i>Scabiosa</i>	320,	425
<i>Centaurea</i>	119, 431,	507			
<i>Cichorium</i>	169, 173,	459	VALERIANEÆ		
<i>Crepis</i>		364	<i>Nardostachys</i>		454
<i>Doronicum</i>		161	<i>Valeriana</i>	202,	454
<i>Eupatorium</i>	22, 99,	181			
<i>Filago</i>		147	CAPRIFOLIACEÆ		
<i>Haplotaxis</i>		145	<i>Lonicera</i>	106,	304
<i>Helichrysum</i>		465	<i>Sambucus</i>	166,	414
<i>Hieracium</i>		368	<i>Viburnum</i>		294
<i>Inula</i>		174			
<i>Lactuca</i>	251,	254	RUBIACEÆ		
<i>Lappa</i>		60	<i>Asperula</i>		232
<i>Leontodon</i>		253	<i>Galium</i>	83, 404,	452
<i>Matricaria</i>		97	<i>Rubia</i>		404
<i>Pulicaria</i>	239,	379			
<i>Senecio</i>		435			
<i>Silybum</i>		62			
<i>Sonchus</i>		252			

LOGANIACEÆ		SOLANEÆ	
<i>Strychnos</i>	num. 336	<i>Atropa</i>	num. 468
		<i>Datura</i>	299, 336
APOCYNÆ		<i>Hyoscyamus</i>	247
<i>Nerium</i>	337	<i>Lycium</i>	455
<i>Vinca</i>	388	<i>Mandragora</i>	299
		<i>Physalis</i>	448
		<i>Solanum</i>	186, 308
ASCLEPIADEÆ		VERBASCEÆ	
<i>Vincetoxicum</i>	494	<i>Verbascum</i>	475
GENTIANEÆ		SCROFULARINÆ	
<i>Erythraea</i>	120	<i>Euphrasia</i>	180
<i>Gentiana</i>	214	<i>Gratiola</i>	220
CONVOLVULACEÆ		<i>Linaria</i>	277
<i>Convolvulus</i>	165, 449, 493	<i>Scrofularia</i>	429
<i>Ipomea</i>	488	SESAMEÆ	
CUSCUTEÆ		<i>Sesamum</i>	444
<i>Cuscuta</i>	157, 176	ACANTHACEÆ	
BORRAGINEÆ		<i>Acanthus</i>	3
<i>Alkanna</i>	83	LABIATÆ	
<i>Anchusa</i>	13, 83	<i>Ajuga</i>	248
<i>Borrago</i>	77	<i>Betonica</i>	71
<i>Cerinthe</i>	239	<i>Brunella</i>	140
<i>Cynoglossum</i>	280	<i>Calamintha</i>	87
<i>Echium</i>	281	<i>Galeopsis</i>	480
<i>Heliotropium</i>	83, 230, 393	<i>Glechoma</i>	Sinonimia, pag. 134
<i>Lithospermum</i>	233	<i>Hyssopus</i>	503
<i>Onosma</i>	83, 239	<i>Lamium</i>	496
<i>Pulmonaria</i>	392	<i>Lavandula</i>	219, 464
<i>Symphytum</i>	138, 139	<i>Marrubium</i>	302
CORDIACEÆ		<i>Melissa</i>	307, 446
<i>Cordia</i>	430	<i>Mentha</i>	310, 312, 391

LABIATÆ

<i>Nepeta</i>	Sinonimia, pag. 134	nam.
<i>Ocimum</i>		349
<i>Origanum</i>	291, 438	
<i>Preslia</i>		391
<i>Rosmarinus</i>		403
<i>Salvia</i>	181, 211, 411	
<i>Satureia</i>		422
<i>Stachys</i>		496
<i>Teucrium</i>	93, 96, 380	
<i>Thymus</i>	235, 438	

CELASTRINEÆ

<i>Evonymus</i>	nam.
	205

AMPELIDEÆ

<i>Vitis</i>	238, 490
------------------------	----------

RHAMNEÆ

<i>Paliurus</i>	Sinonimia, pag. 136
<i>Zizyphus</i>	244

VERBENACEÆ

<i>Verbena</i>	67
<i>Vitex</i>	10

URTICULARIÆ

<i>Pinguicula</i>	224
-----------------------------	-----

PLANTAGINEÆ

<i>Plantago</i>	143, 255, 376, 390
---------------------------	--------------------

PRIMULACEÆ

<i>Cyclamen</i>	128
<i>Primula</i>	387

OLEINEÆ

<i>Fraxinus</i>	200, 279
<i>Olea</i>	340
<i>Ornus</i>	200

JASMINEÆ

<i>Jasminum</i>	413
---------------------------	-----

ERICINEÆ

<i>Arbutus</i>	16
--------------------------	----

UMBELLIFERÆ

<i>Æthusa</i>	443
<i>Anmi.</i>	23, 81
<i>Anethum</i>	30
<i>Anthriscus</i>	125
<i>Apium</i>	37
<i>Athamanta</i>	160, 290
<i>Carum</i>	109
<i>Conium</i>	40, 129
<i>Coriandrum</i>	135
<i>Crithmum</i>	149
<i>Cuminum</i>	131
<i>Daucus</i>	160
<i>Dorema</i>	45
<i>Ferula</i>	51, 192, 207, 436
<i>Fœniculum</i>	189
<i>Heracleum</i>	3, 78
<i>Laserpitium</i>	445
<i>Levisticum</i>	273
<i>Meum</i>	233, 313
<i>Enanthe</i>	39
<i>Opoponax</i>	342
<i>Pastinaca</i>	61
<i>Petroselinum</i>	366
<i>Peucedanum</i>	367
<i>Pimpinella</i>	31, 369
<i>Sanicula</i>	412
<i>Sison</i>	23, 27
<i>Sium</i>	447

UMBELLIFERÆ		ROSINÆ	
	NUM.		NUM.
<i>Thapsia</i>	473	<i>Agrimonia</i>	11
<i>Trinia</i>	369	<i>Alchemilla</i>	271
ARALIACEÆ		<i>Amygdalus</i>	24, 26
		<i>Armeniaca</i>	225
<i>Hedera</i>	167	<i>Cerasus</i>	122
CORNEÆ		<i>Cydonia</i>	293
		<i>Fragaria</i>	199
<i>Cornus</i>	205	<i>Geum</i>	211
SAXIFRAGEÆ		<i>Mespilus</i>	329
		<i>Persica</i>	361
<i>Saxifraga</i>	424	<i>Potentilla</i>	278, 359
CRASSULACEÆ		<i>Poterium</i>	369, 450
		<i>Prunus</i>	2, 389
<i>Sedum</i>	185, 492	<i>Pyrus</i>	294, 372
<i>Sempervivum</i>	432	<i>Rosa</i>	62, 402
<i>Umbilicus</i>	141	<i>Rubus</i>	319, 405
HALORAGEÆ		<i>Sanguisorba</i>	450
		<i>Sorbus</i>	451
<i>Hippuris</i>	242	<i>Spiræa</i>	196
COMBRETACEÆ		<i>Tormentilla</i>	197, 482
<i>Terminalia</i>	316	LEGUMINOSÆ	
LYTHRARIÆ		<i>Abrus</i>	355
		<i>Acacia</i>	227, 250
<i>Lawsonia</i>	13	<i>Astragalus</i>	163, 284, 355
MYRTACEÆ		<i>Cæsalpinia</i>	79
		<i>Cassia</i>	110, 434
<i>Eugenia</i>	212	<i>Ceratonia</i>	501
<i>Myrtus</i>	318	<i>Cicer</i>	127
GRANATEÆ		<i>Faba</i>	184
		<i>Galega</i>	105
<i>Punica</i>	58, 295	<i>Genista</i>	216
		<i>Glycyrrhiza</i>	284
		<i>Hippocrepis</i>	306
		<i>Lathyrus</i>	128, 400
		<i>Lens</i>	268
		<i>Lotus</i>	306
		<i>Lupinus</i>	287
		<i>Mellilotus</i>	306
		<i>Orobus</i>	494

LEGUMINOSÆ

	num.
<i>Phaseolus</i>	188
<i>Pisum</i>	127
<i>Psoralea</i>	485
<i>Pterocarpus</i>	79
<i>Sarothamnus</i>	216
<i>Tamarindus</i>	348
<i>Trifolium</i>	485
<i>Trigonella</i>	190
<i>Vicia</i>	494

TEREBINTHACEÆ

<i>Amyris</i>	59
<i>Anacardium</i>	29
<i>Balsamodendron</i>	63, 317
<i>Boswellia</i>	226, 339
<i>Pistacia</i>	270, 303, 374
<i>Rhus</i>	471

AURANTIACEÆ

<i>Citrus</i>	384
-------------------------	-----

HYPERICINEÆ

<i>Hypericum</i>	241
----------------------------	-----

MALVACEÆ

<i>Althaea</i>	19, 297
<i>Gossypium</i>	75
<i>Lavatera</i>	298
<i>Malva</i>	296

GERANIACEÆ

<i>Erodium</i>	323
<i>Geranium</i>	323, 363

LINEÆ

<i>Linum</i>	283
------------------------	-----

OXALIDEÆ

	num.
<i>Oxalis</i>	14

ZYGOPHYLLÆ

<i>Tribulus</i>	484
---------------------------	-----

RUTACEÆ

<i>Dictamnus</i>	162
<i>Ruta</i>	406

BERBERIDEÆ

<i>Berberis</i>	68, 274
---------------------------	---------

MYRISTICEÆ

<i>Myristica</i>	289, 334
----------------------------	----------

RANUNCULACEÆ

<i>Aconitum</i>	35
<i>Clematis</i>	198
<i>Delphinium</i>	463
<i>Ficaria</i>	364
<i>Helleborus</i>	116, 170
<i>Hepatica</i>	486
<i>Nigella</i>	217, 330
<i>Pæonia</i>	360
<i>Ranunculus</i>	40
<i>Thalictrum</i>	406, 441

NYMPHÆACEÆ

<i>Nelumbium</i>	328
<i>Nuphar</i>	328
<i>Nymphæa</i>	328

PAPAVERACEÆ

<i>Chelidonium</i>	116
<i>Glaucium</i>	118
<i>Papaver</i>	354

FUMARIACEÆ		PORTULACEÆ	
<i>Fumaria</i>	203	<i>Portulaca</i>	386
CRUCIFERÆ		CHENOPODEÆ	
<i>Brassica</i>	115, 397, 469	<i>Atriplex</i>	53
<i>Capsella</i>	84, 416	<i>Beta</i>	73, 439
<i>Cochlearia</i>	395	<i>Camphorosma</i>	98
<i>Eruca</i>	177	<i>Spinacia</i>	456
<i>Isatis</i>	240		
<i>Lepidium</i>	326	AMARANTACEÆ	
<i>Nasturtium</i>	326, 433	<i>Amarantus</i>	213
<i>Raphanus</i>	394		
<i>Rapistrum</i>	396	POLYGONEÆ	
<i>Roripa</i>	401	<i>Poligonum</i>	71, 362, 382
<i>Senebiera</i>	143	<i>Rheum</i>	398
<i>Sinapis</i>	442	<i>Rumex</i>	4, 264
<i>Sisymbrium</i>	327		
CAPPARIDEÆ		LAURINEÆ	
<i>Capparis</i>	104	<i>Cinnamomum</i>	111, 130, 292
RESEDACEÆ		<i>Laurus</i>	98, 267
<i>Reseda</i>	240	THYMELEÆ	
CISTINEÆ		<i>Daphne</i>	266
<i>Cistus</i>	265, 502	<i>Penæa</i>	420
VIOLARIEÆ		LORANTHACEÆ	
<i>Viola</i>	495	<i>Loranthus</i>	Sinonimia, pag. 136
TAMARISCINEÆ		SANTALACEÆ	
<i>Tamarix</i>	300, 472	<i>Osyris</i>	215
CARYOPHYLLEÆ		<i>Santalum</i>	415
<i>Agrostemma</i>	217, 330	ARISTOLOCHIEÆ	
<i>Dianthus</i>	Sinonimia, pag. 133	<i>Aristolochia</i>	43, 44
<i>Lychnis</i>	146	<i>Asarum</i>	49
<i>Saponaria</i>	419		

RAFFLESACEÆ		MOREÆ	
<i>Cytinus</i>	num. 502	<i>Ficus</i>	num. 193
		<i>Morus</i>	319
CUCURBITACEÆ		BALSAMIFLUÆ	
<i>Bryonia</i>	80	<i>Liquidambar</i>	467
<i>Citrullus</i>	137, 309		
<i>Cucumis</i>	134, 153, 309		
<i>Cucurbita</i>	309		
<i>Ecballium</i>	168		
<i>Lagenaria</i>	154		
EUPHORBIACEÆ		SALICINEÆ	
<i>Euphorbia</i>	114, 178, 182	<i>Salix</i>	410
<i>Excoecaria</i>	17		
<i>Mercurialis</i>	282		
<i>Phyllanthus</i>	172, 316		
<i>Ricinus</i>	481		
BUXINEÆ		JUGLANDEÆ	
<i>Buxus</i>	86	<i>Juglans</i>	332
PIPERACEÆ		CUPULIFERÆ	
<i>Cubeba</i>	152	<i>Castanea</i>	112
<i>Piper</i>	371	<i>Quercus</i>	218
CANNABINEÆ		CORYLACEÆ	
<i>Cannabis</i>	99	<i>Corylus</i>	54, 371
<i>Humulus</i>	288		
URTICEÆ		CONIFERÆ	
<i>Parietaria</i>	356	<i>Abies</i>	375, 477
<i>Urtica</i>	489	<i>Callitris</i>	69
CELTIDEÆ		<i>Cupressus</i>	133
<i>Celtis</i>	130	<i>Juniperus</i>	246, 423
		<i>Pinus</i>	136, 370, 477
		ORCHIDEÆ	
		<i>Orchis</i>	352, 421
		ZINGIBERACEÆ	
		<i>Alpinia</i>	107, 206
		<i>Amomum</i>	335
		<i>Curcuma</i>	156, 504
		<i>Zingiber</i>	506

MUSACEÆ		GRAMINEÆ	
	num.		num.
<i>Musa</i>	322	<i>Agropyrum</i>	222
		<i>Andropogon</i>	462
		<i>Arundo</i>	102
		<i>Avena</i>	57
		<i>Cynodon</i>	222
		<i>Digitaria</i>	416
		<i>Hordeum</i>	351
		<i>Lolium</i>	286, 507
		<i>Oryza</i>	399
		<i>Panicum</i>	314
		<i>Phragmites</i>	102
		<i>Saccharum</i>	102, 508
		<i>Setaria</i>	353
		<i>Triticum</i>	487
AMARYLLIDEÆ			
<i>Narcissus</i>	325		
IRIDEÆ			
<i>Crocus</i>	150, 234		
<i>Gladiolus</i>	243		
<i>Hermodactylus</i>	234		
<i>Iris</i>	6, 183, 243		
DIOSCOREÆ			
<i>Tamus</i>	498		
MELANTHACEÆ		PALMÆ	
<i>Colchicum</i>	234	<i>Calamus</i>	417
<i>Veratrum</i>	170	<i>Cocos</i>	333
		<i>Phœnix</i>	159
SMILACEÆ		AROIDEÆ	
<i>Polygonatum</i>	440	<i>Acorus</i>	88
<i>Ruscus</i>	82	<i>Arum</i>	326, 437
		<i>Colocasia</i>	155
ASPARAGEÆ		LEMNACEÆ	
<i>Asparagus</i>	350, 453	<i>Lemna</i>	269
<i>Dracena</i>	417		
LILIACEÆ		POTAMEÆ	
<i>Allium</i>	15, 121, 245, 385, 426, 428	<i>Potamogeton</i>	187
<i>Aloe</i>	18		
<i>Asphodelus</i>	8, 52	FILICES	
<i>Lilium</i>	275	<i>Adiantum</i>	103
<i>Scilla</i>	461	<i>Asplenium</i>	7, 383
CYPERACEÆ		<i>Ceterach</i>	126
<i>Cyperus</i>	132	<i>Polypodium</i>	381

FILICES

	num.
<i>Polystichum</i>	195
<i>Pteris</i>	194
<i>Scolopendrium</i>	427

LICHENES

	num.
<i>Lobaria</i>	392
<i>Usnea</i>	Sinonimia, pag. 136

FUNGI

EQUISETACEÆ

<i>Equisetum</i>	242	<i>Agaricus</i>	9
		<i>Polyporus</i>	9

HEPATICÆ

<i>Marchantia</i>	175
-----------------------------	-----

NOMI VOLGARI

di piante e di medicine vegetali adoperati nella traduzione francese

del CIRCA INSTANS

	num.		num.
Acace, achace, achacie.	2	Amandiers	361
Ache commune	37	Amarenes	122
» de emorroydes	39	Amourouque	144
» de raynes	269	Anabule	28, 481
» de ris.	40	Anacars	29
» domestique	290	Anasperage	453
» ranin	39	Ancens, encens	239, 339
Actoire	35	Ancens masle	226
Affodille, affrodille	8	Anet	30
Agaric femelle	9	Anis	31
» masle	9	Appollinaire	41
Agrimoine	11	Arbre des limons	384
Agrion canabin	99	Aristologe longue	44
Agriotes	122	» ronde	43
Aiche	37	Aristologie, aristologue	43
Ail domestique	15	Armoise (grant)	46
» sauvaige	15, 428	» moienne	48
Alain	403	» moindre	47
Alkacange, alkakenge	186, 448	Armoniac	45
Aloen cabalin	18	Arnoglosse	376
» cicotrin	18	Arroche	53
» epatic	18	Arthetique	229, 350
Aloes (ling)	17	Ase puant, — puante	51, 341
Altee aute	19	Asperon	424
Aluine, aluisne, aluyne	1	Asprelle	83, 452
Amandes (amendes) ameres	24, 338	Aul	15
» douces	26	Aurosne	91

	num.		num.
Avellaines	56, 289	Candelieri	101
Avellainier	371	Canelle	101, 130
Avene	57	Canesson	144
Balaustie	58	Caniculaire	356
Barbe Aaron	256	Canne de miel	102, 508
Bardane	60, 263	Capragine	105
Basilicon citrin, — citron	349	Carices	193
» girofle	349	Carvi	23, 109
Basme, baulme, baume	59	Casse fistre, — fistule	110
Baucie	61	Casse ligne, — lignee	111
Bec d'oye	278	Catapuce, cathapice, cathapuce	114, 168
Bedegard	85	Celidoine commune	116
Berbeine	67	» de Inde	116
Bete	73, 115	» masle	118
Betoine, betoigne	70	Cent nous	382
Bimaube, bismaulve, bismaube	296, 297	Centoire	120
Bistorte, bixtorte	71	Cerfueil	125
Bladone	475	Cerises	122
Blette	213	Cerlangue	127
Blitin	439	Ceterac	126
Bolet, Boulé	9, 200	Champignon	204
Borraiche sauvaige	83	Chanvre	99
Boux	86	» sauvaige	46, 99
Bourraiche, bourraige	77	Chardon	431
Bourse a pasteur, — a pastour	84, 416	» benoist	435
Branche (brance) ursine	78	» marin	484
Bresil	79	» sauvaige	497
Bran (bren) de froment	100	Chastaignes	112
Brionie blanche	80	Chermiere	97
» noire	80	Chesne	3, 381
Brioyne	498	Chevaunqueue	242
Brust, Brust	82, 215	Cheue	129
Buglosse	83, 281	Chiches blanches, — noires	127
Bulbe	461	» rouges	400
Burit	419	Chievrefeul	106
Cafflor	150	Choul sauvaige	469
Calament	87, 446	Chous	240
» montain	87	Choux d'iver ou hyemaulx	115
Camelean	95	» d'esté ou estivaux	115
Cameleonte blanche	94	Cibole	121
Cameleunte noire	94	» marine	461
Camomille	97, 144	Ciche	355
Camfre, camphre, la canfre	98	Cicoree	169, 252, 459

	num.		num.
Cinbalaire	141	Diptam, diptan	162
Cinoglosse	280	Doque	4, 264
Ciprès	133	» ague	264
Citron	349, 384	» domestique ou priver	264
Citrules	119, 134, 322	» la ronde	264
Clous de girofle	212	Dragagant, dragagan	163
Colloquintide	137	Draguntee	437
Colofoine	136	Dyagrede	165
Colubrine	437	Eaune	174
Commin, comin	131	» (de) champaigne	174, 322
» doulz	31	Elactere	168
Consoude la grant	138	Elacterides	168
» mendre	140	Eleboire (elleboire) blanc, — noir	170
» moienne	139, 239	Emblies, embliques	172
» petite	404	Encensaire, incensaire	239
Coq	231	Endive, endivie	173
Cost, coste	145, 231	Epithime	176
Coriandre	7, 135	Epatique	175
Corne de cerf	143	Eruque priver	62, 177
Coronaire, la grande	146	» petite	84
» , meindre	147	Escaloigne, escalongne	325, 426
Corrigiole	382	Esclaire	116
Coton, cotton, couton	75, 469	Escope a roy	241
Coucordes, coucourdes	134, 153	Esdre noir	167
Coudre	371	Espic celtique	117
Courge	154	Espinars	456
» de Alexandrie	137	Espine benoite	455
» sauvaige	80	» blanche	62
Couronne le roy, — royal	306	Espinette vinette	67
Cresson de eaue	326, 433	Espinoche	456
» de jardin	143, 326	Espurge	114
» sauvaige	327	Esule	178, 481
Crete (croite) marine	149	Euforbe	182
Crisomiles, grisomiles	225	Eufrase	180
Cubebe	152	Eupatoire, eupatore	181, 411
Cucumeres	153	Fagiolane	393
Curaige, curraige, curraige	362, 440	Faseolaire	230
Cuscute	157, 176	Faseoles	188, 230
Damascenes	389	Favas	184
Dame de toutes herbes	70	Fenoil, fenoul	189, 350
Dates	159	» a pourceaux	367
» indes	348	Fenugrec	190
Deronice	156, 161	Ferule	192, 342

	num.		num.
Festuces, festus	374	Gomme (gosme) arabic	227
Fève enverse	186	» elenni, de lomee	226
» commune	184, 400	» sarrasine	227
» grasse	185	Grace Dieu	220
Fiel de terre	120	Grain de (du) soleil	223
Figues	193	Grains de pins	370
» de karesme	357	Gramine, graminee	222
Filipendule	196	Grape	490
Fistulaire	197, 482	Grateron	452
Flosmon	475	Granade, grenade, grenate	58
Forment, fourment	221, 399	Gremil, grumil	223
Formiculaire	315	Guaide	240
Fouchiere, fougier	194, 195	Hache sauvaige	39
» masle	195	Hanebane	247
Fragon	215, 350	Hauberon	288
Frasier	199	Heccine	228
Freses	199	Herbe (erbe) a charpentier	315
Fresne	162, 200	» a foulon	419
Froment, fromens	487, 507	» a paralisie	387
Fume terre	203	» a pououx	463
Fusain	107, 205	» a squinace	233
Galbane	207	» a verres	356
Gallinaire	425	» basilique	355
Gallitric	210	» d'ancens	233
Garence	404, 452	» de citre, — de citraire	307
Garingal	206	» de Hercules	465
Gariofile	211	» de musc	323
Gasse	507	» de vent	356
Gaude	240	» de vigne	232
Gelesie	213	» judaïque	480
Genciane	214	» muscate	323
Genest, geneste	216	» panaie	427
Genestelle, genestule	215	» paralisie	229
Germandree	93	» persee, — pertusee	241, 441
Gingembre	506	» rabieuse	230
» de jardin	162	» sabine	423
Girofle, giroflee	211, 212, 349	» saint Jehan	241
Glaieul	243	» sainte Marie	231
Glans	112	» saint Phelippe	419
Glay, glays	183, 243	» saint Pierre	387
» de eaue	6	» vaccine	41
Gleteron	60, 263	Hermodates	234
Glu	265	Herpille	233

	num.		num.
Ieribulle, ierubule	237	Listrage	355
If	423	Liviesche.	273
Indace	240	Luminelle	180
Iris	243	Lupins	187
Isope la grande	503	Lupule	288
» la petite	503	Macianes	294
Ive, yve	248	Macidoine	290
Jenievre	246	Macis	289
Jonc	88	Malabatre	292
» a trois costes	132	Mandrangoire, mandragore	299
Joubarbe	432	Manne	300
Jujubes	244	Majoraine	197
Jumole blanc	245	Mariolaine	291
Jusquame	247	Maroquin, marquin	302
Kalendule	91	Marrob	302
Lacce	250	Mastic	303
Lactue, laitue	3, 251	Matrisilve	304
» a lievre	252	Maulve de jardin	298
» sauvaige	253, 254	» domestique ou privee	296
Lambrusce	238	» (haute)	19
Lancelee	255, 377	» sauvaige	296
Langue de beuf	83	Melisse	307
» de bouc	281	Mellilot	306
» de chien	280	Melonges	308
» de moisson	146, 382	Melons longs, — rons	309
» de oyseau, d'oyssel	279	» palestins, — sarrasins	309
» de passeret	382	Mentastre	310, 312
Lapaciale	263	Mente domestique, de jardin	310
Lape, la grant	60, 263	» romaine	311
» la mendre	263	» sarrazine	310
Lapdane, laudane	265	» sauvaige	312
Laureole	266	Mercure	282
Laurier	267	Mere des herbes	46
» terrestre	266	Meseron	266
Lentilles	268	Mesles	329
» de eaue	269	Meu	233, 313
Lentisc, lentisce	270, 303	Meures domestiques	319
Limon	226, 384	» sauvaiges	319
Lin	283, 277	Meurier (franc)	319
Linaire	277	» (sec)	319
Liquirice	284	Mierre, mirre	317
Lis domestique ou privé	275	Mil (millet) de soleil	223
» sauvaige	275	Milet	314

	num.		num.
Millefeul	315	Pain a coqu	14
Mirabolains, mirabolans (belleri- ques, — citrins, — embliques, — indes, — kebules)	316	» a porc	128
Mirte	318	Palais du (au) lievre	350
Mirtilles	318	Panaie domestique	61
Morelle	186, 468	» sauvaige	61
» mortelle	448	Panic	353
Morgelline	356	Paracelle, paratelle	355
Mors au diable	320	Parelle ague	264
Murale	356	Paritaire	356
Muses	102, 322	Passules	357
Narcisce, narscis	325	Pastourelle	84
Navet	397	Pavot (blanc, noir, rouge) .	341, 354
Nefles	329	» sauvaige ou des champs . .	354
Nenufar, nenuphar	328	Peches, pesches	225, 361
Nepite	87	Pechier	362
Noiele, noyelle	217, 330	Pediculaire	463
Noier	332	Pelluete	368
Noix (nois, noiz) communes .	332	Peoine	360
» de Inde, indique	323	» romaine	360
» muguete	289, 334	Persicaire	362, 440
» sciarce, siacre	335	Persil alexandrin	290
» vomique	336	» domestique	122, 396
Œil luisant	274	» macidoine	290
Oignon privé et commun	121	» sauvaige	366, 443
Oile de olive	338	Pervence	388
Oleandre	337	Picule	375
Olibane	339	Pié de coulou	322, 363
Olive domestique	340	» de lievre	364
» sauvaige	340	» de lion	271
Opium thebaic	341	» de oison	416
Oppoponac, oppopona	342	» de veau	236
Orengé	384	Pignons	370
Orge	343	Pilloselle	368
Origane domestique	344	Pimpenelle, pimpinelle, pinpernel- le	369, 450
» sauvaige	344	Pins	370, 374
Oriolain	106	Piretre	373
Ortie	489	Pistacee	374
Ourmél	63	Plantain (grant).	376
Oxifenice	348	» petit	377
Paille a cameaux	462	Podagre de lin	157
Paille, palee	351	Poires (pooires) domestiques .	372
		» sauvaiges	372

	num.		num.
Poivre (blanc, long, noir)	371	Raisin	107
Poix liquide au clere	375	» de quaresme	357
Politric	383	Ramette	315
Poliet	391	Ranoullee	269
Polipode	381	Rapistre	396
Pollicaire (grande, moyenne, petite)	379	Rave	397
Pommes citrines	384	» sauvaige	396
» de coing	293	Regalice, rigalice, rigolice	284, 355
» de granade, de grenate	57, 295	Renochee	452
» de paradis	322	Reu	398
» de pin	370	Reubarbe	398
» de terre	128	Reupontic	398
» d'orange	384	Ris	399
» sauvaiges	294	Robellie	400
Pommetes	10	Rodalde	401
Pommier de granade	58	Ronce	319, 405
Poree	53	Rose, rouse	328, 402
Poreau, poriaux	8, 385	» a chien, — canine	502
Poreaulx, porreaue	230	Roseau	102
Porreau sauvaiges	385	Rosier	62
Poulieul cervin	391	Romarin	403
» masle — femelle	391	Rousee de mer	403
Poupons	309	Rue domestique	406
Pourcelaine	386	» sauvaige	406
Pourpié	386	Ruelle	452
Poy roisine	375	Safran	504
Poys navale	375	Saffran de jardin	150
Primerole, primerolle	387	Saffren d'orient	150
Primule de printemps	387	Saliunca, salvince	412, 454
Psidie	58	Sanc de dragon	417
Prunelles sauvaiges	2	Sandres	415
Prunes de Damas	389	Sanemunde	211
» noires, — rouges	389, 430	Sanguinaire	84, 416
Pulmonaire	392	Sappin	9, 477
Purgechief	463	Sarcocole, sarcocolle	420
Quercule, grant	95	Sarriete, serriete	422
» meindre	93	Satirion	352, 421
Queue de leu	475	Sauge domestique	411
Quinte feuille	359	» sauvaige	161, 411
Rabieuse	393	Saulx	410
Rafane	395	Savine, savinier	423
Raffe	395	Savonnaire	419
Rais	394	Saxifrage, saxifraige	424

	num.		num.
Saxifrage (petite)	450	Tapse	473
Scabiense	425	» barbe femelle	475
Scamonee	481	» masle	475
Scariole	173	Terebentine	477
Scolopendre	427	Teste de souris	492
Scrofulaire	429	Tetrahit	480
Seau (de) Salemon	185, 440	Tiriacle a villains	15
» Nostre Dame	440	Titimal, titimaulx	165, 481
Sedres	415	» babilonique	481
Selechion, senechon	435	Thim	176
Senacions	433	Tormentille	482
Senesson	433	Toujours vive	432
Seneve	442	Trefle, trieffle	485
Serapin	436	» agu	485
Serpentine	236, 437	» a lievre	485
Serpille	235	» a trois cornes	485
Seu	414	» lagoceron	485
Sisame	444	Tribules	484
Sistre	447	Trimuau	328
Soldanelle	449	Trinité	486
Sorbastelle	450	Turbith	488
Sorbes	451	Ungle de cheval	252, 263
Soucicle, soussicle	91	Unité	486
Sourcil de la terre	383	Urtie morte	496
Sparage, sperage	350, 453	Uves passés	357
Spatule puante	243	Valeriane	202
Spic celtique	454	» sauvaige	441
» nard	454	Veme, viam	421
Squinant	462	Verge a pasteur	497
Squille	461	Vermiculaire	492
Stafisagrie, staphisagrie	463	Vernis, vernix, veronice	249
Staticere	38	Vervaine	66
Sticados arabic	464	Vesse	494
» citrin	465	Vigne blanche	288
Storax	467	» sauvaige	238
Succuse	320	Vincetoxicon	494
Sucre, sucre	102, 508	Violiers	495
Sumac	471	Violete (violette) de mars	495
Surmontain	445	Viperine	496
Tagliasaire	482	Viticelle	498
Tamaric, tamarisc	472	Vitreole	356
Tamarins	348	Volubilis	493

	num.		num.
Vran	38	Yris	243
Xilocrates	501	Ysope seche	503
Yeble	166	Yvraie	286
Yringe	431	Zedoar	504

LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below.

APR 12 1938

May 11/38

APR 10/47

~~APR 10 1947~~

NOV 19 1990

RS
81
C21
1886
LANE
HIST

